


河北藥材

河北省衛生廳
商業廳醫藥局 編



河北人民出版社







66.91
312

河北藥材

河北省衛生廳編
商業廳醫葯局

河北人民出版社



中科院植物所图书馆



S0022918

河 北 药 材

河北省卫生厅
商业厅医药局 编

河北人民出版社出版（保定市裕华东路）河北省书刊出版业营业许可证第三号
河北人民出版社印刷厂印刷 河北省新华书店发行

850×1168 $\frac{1}{32}$ ·13 $\frac{5}{8}$ 印张·200,000字 印数：1—17,500册 1959年6月第一版
1959年6月第一次印刷 统一书号：T14086·52 定价：(8)1.37元

序

藥物學是祖國醫學的重要組成部分。我國藥物的特點，主要是採用植物、動物和礦物的入藥部分，尤其是採用植物性的天然藥物，品種最多。所以中國藥物學稱為“本草學”。

河北省是祖先活動最早的地區之一。從周口店中國猿人、山頂洞人的骨骸化石推測，遠在石器時代，河北省西北部地區就有祖先的活動。蘇聯生理學家巴甫洛夫說：“有了人類就有醫療的活動……。”由此可見，河北省地區的人民醫療活動，有深遠的歷史。

人民的醫療活動，是和藥物的利用分不開的。隨着人類生產勞動的進化，物質文化生活的不斷提高，對自然藥物的利用範圍，也不斷地擴大，品種也不斷地增多。很多植物性的藥物，由野生變為人工栽種，藥用野禽、野獸、昆蟲，變為家養。這些天然藥物的利用，是我國勞動人民在生產生活鬥爭中防治疾病的經驗總結；是我國人民文化科學史上燦爛的一頁。但是國民黨反動統治階級，醉心歐美資產階級文化，提倡全盤西化，取締中醫，因而中藥也受到極大摧殘。解放後，黨提出了團結中西醫政策，繼承和發揚祖國醫學遺產，從而扭轉了對中醫輕視、歧視、排斥的現象，鼓舞了中醫情緒，充分地發揮了中醫的積極作用，因而，中藥也隨之得到發展。

由於人民公社的建成，人民生活的提高，以及中醫政策的具體執行。人民對中醫的醫療保健要求，也隨之提高。藥材生產量與人民醫療需要量，已不相適應，許多藥材脫銷。為此，河北省衛生廳、商業廳醫藥局對本省生產的藥材作了初步調查，將現已生產的主要藥材三百多種，編成“河北藥材”，供醫藥技術人員學習參考。

河北省衛生廳副廳長 盧曉

1959年3月



前 言

中藥材是我國勞動人民幾千年來同疾病作鬥爭的經驗積累。對維護我國民族的生存與發展有着極大的貢獻，是祖國文化科學遺產的重要部分。

我省處於華北平原，幅員遼闊，北與內蒙高原毗連，南臨黃河與河南接壤，東濱渤海，西鄰山西。省內不僅有河流、水淀和廣闊的平原，也有山巒縱橫、丘陵起伏的山地，是一個山區、平原和水區並兼的省份。氣候適中，雨量充沛，適合各種動、植物藥材生長。品種多，分布廣，蘊藏量極為豐富。僅據初步調查，藥材蘊藏量約有4億1千餘萬斤，已採集生產者即達330餘種。資源無限，潛力無窮，很多品種是取之不尽、用之不竭的天然藥源。

幾年來我省藥材生產量隨着黨的中醫中藥政策的正確貫徹，農村多種經濟的開展，已有了飛躍的增長。在1949年生產藥材55種，年產量200萬斤的基礎上，到1958年已增加收購品種達300餘種，年產量增加到5,700餘萬斤。藥材生產的發展，在我省農村，特別是山區已成了開展多種經濟、增加群眾副業生產收入的重要來源。通過藥材生產的發展，對貫徹黨的中醫政策，滿足醫療用藥、保證人強馬壯促進工農業生產、建設社會主義發揮了一定作用。

為進一步發展我省藥材生產，正確貫徹黨的中醫中藥政策，認真執行國務院關於發展中藥材生產問題的指示，依靠群眾大搞藥材生產、採集運動，在兩三年內基本上實現我省中藥材生產自給自足的規劃，我們編輯了“河北藥材”一書，來反映我省所產的主要藥材面貌。其目的是為了幫助各地人民公社的藥材生產、採集人員、收購人員與各地區的醫、藥工作者，

全面了解我省药源，提高识别药物的能力，熟悉收购技术，掌握生产种植方法，以及对药材性能的了解。从而有助于广泛开展宣传，组织技术传授，启发群众生产积极性。“人人尝百草、个个当神农”，积极挖掘药材资源，扩大药材培植，以便将我省药材生产种植、采集、收购工作推向一个新的高潮。

本书的内容，系根据我省现已生产的主要药材，分动、植、矿物三类进行编写的，共计327种。对于某些新发现的野生药材，如轮叶王孙、翠雀、毛茛、草石蚕等近百种品种及引种、试种省外药材，如女贞子，功劳叶、佛手、黄连、当归等数十种品种，由于尚缺乏成熟的采集、培植经验，均未编入，留待今后再行补充。

本书的编写，除参考张家口、承德、保定等专区编印的“药材收购手册”外，并参考“中国药学大辞典”“现代实用中药”“中国药用植物志”“生药学”“辽宁药材”等书，结合我省所产药材实物标本，而编写成的。初稿写成后，为达内容切合实际，召开了各专区药材经营部门生产、收购专业人员会议，进行了较为系统的审订。其次，为帮助读者认识各种药材的形态，我们参照药材实物标本，绘制了动、植、矿物药材插图279幅，借以帮助读者具体地认识原药物的生长形态。

书中所列品种，每篇内容大体上包括别名、土名、来源与形态、产地、产季、采集与加工、包装与保管、性能等几项，最后并附有部分药材的种植方法。为便于农村广大社员阅读起见，在编写时，文字力求简单明确，尽量避免使用药学术语。但由于我们业务水平和能力所限，再加时间仓促，缺点和错误在所难免，深望读者及时给予批评和指正，以便再版时修正，使本书内容逐步达到正确、完整。

編者

1959年3月

目 录

植 物 类

山药.....	1	丹参.....	40
山人参.....	4	月季花.....	42
山豆根.....	5	天仙子.....	43
山楂片.....	7	附：萹蓄叶	
大黄.....	8	水红花子.....	45
大青叶.....	11	甘草.....	46
附：青黛		生地.....	48
大薊.....	13	附：熟地	
土贝母.....	14	白芷.....	51
土三七.....	17	白头翁.....	54
小茴香.....	18	白花菜子.....	56
小薊.....	20	白毛根.....	58
川山柳.....	21	白藓皮.....	59
牛膝.....	23	白果.....	61
牛蒡子.....	26	白朮.....	62
五味子.....	27	白苏子.....	64
五加皮.....	29	白曼陀罗.....	66
元胡.....	30	白藜草.....	68
升麻.....	32	白芥子.....	70
木贼.....	33	附：黄芥子	
瓦松.....	35	白薇.....	71
凤仙花.....	36	白扁豆.....	73
附：急性子		白屈菜.....	74
王不留.....	37	瓜蒌.....	76
火麻仁.....	39	附：瓜蒌皮、瓜蒌仁、天花粉	

- 半夏.....79 附：車前草
- 玉竹.....80 何首烏.....119
- 玉蜀黍須.....82 杏仁.....120
- 玉簪花.....84 防风.....122
- 石花.....85 远志.....123
- 石葦.....86 附：小草
- 石榴皮.....88 麦芽.....126
- 仙鶴草.....89 麦角.....127
- 刘寄奴.....90 麦冬.....129
- 冬瓜子.....92 旱蓮草.....130
- 附：冬瓜皮 草决明.....132
- 龙葵.....93 青木香.....134
- 地榆.....95 青蒿.....136
- 地骨皮.....96 青椒.....137
- 地肤子.....98 知母.....139
- 百合.....99 附：知母肉
- 老鸛草.....101 枸杞果.....141
- 艾叶.....102 附：地骨皮
- 西瓜皮.....104 板蓝根.....144
- 間荆.....105 附：大青叶
- 南蛇藤.....106 板栗.....147
- 血見愁.....107 金銀花.....149
- 列当.....108 金櫻子.....151
- 沙参.....108 芫花.....152
- 赤芍.....112 玫瑰花.....154
- 皂角.....113 芡实.....155
- 附：皂角刺 抽葫蘆.....157
- 谷芽.....115 蘆根.....158
- 佛手参.....116 松节.....160
- 車前子.....117 附子.....161

- 鬼兒傘163
 南星164
 紅花168
 郁李仁171
 香附子172
 香鈴子174
 香薷175
 苦參178
 苦丁香179
 附：甜瓜子
 獨活181
 獨角蓮182
 茄根184
 威靈仙185
 胡麻子187
 穿山龍188
 薺菜189
 枳實191
 前胡192
 卷柏193
 柿蒂195
 附：柿霜
 芭藤子196
 韭菜籽197
 附：野韭菜籽
 桔梗199
 荊芥200
 附：芥穗
 黨參203
 秦艽205
 秦皮207
 柴胡208
 胡桃仁210
 附：分心木
 桃仁211
 臭蕪荑212
 夏枯草213
 徐長卿214
 陳皮216
 馬蘭子217
 附：馬蘭花
 馬鞭草218
 馬兜鈴220
 附：天仙藤
 馬齒莧222
 馬勃223
 桑白皮224
 附：桑枝、桑葉、桑椹
 桑寄生226
 茯苓228
 草烏229
 茜草230
 益母草232
 附：菴玉子
 浮萍草233
 鬼箭羽234
 茵陳236
 狼毒237
 透骨草239
 黃蓍241

- 黄芩243
 黄精245
 黄柏247
 黄瓜皮248
 附：黄瓜子
 商陆249
 商麻子251
 旋复花253
 梓实254
 败酱草256
 盘龙参257
 澤兰259
 蛇床子260
 貫仲262
 側柏叶263
 附：柏子仁
 麻黄265
 附：麻黄根
 牵牛子266
 紫苑267
 紫草270
 紫苏272
 附：苏梗、苏叶、苏子
 紫花地丁275
 紫参277
 菊花278
 款冬花281
 菖蒲282
 黑芝麻284
 莱菔子286
 蓖麻子288
 楮实子289
 菟絲子290
 絲瓜絡292
 葶藶子293
 葎草295
 鷄冠花297
 附：青葙子
 篇蓄299
 蜀葵花300
 萱草根301
 鈴兰303
 葛根304
 附：葛花
 椿根皮306
 附：鳳眼草
 酸枣仁307
 蒼朮309
 蒼耳子311
 漏蘆312
 蒲公英314
 蒲黄315
 豨薟草317
 薯草319
 槐花320
 附：槐米、槐角
 蒺藜321
 蓮322
 附：藕节、荷叶、荷梗、
 荷花、蓮須、蓮子

猪苓	326	翻白草	339
猫眼草	327	瞿麦	341
鴨跖草	328	蕺本	343
錦灯笼	330	藜蘆	344
樺树皮	331	悬构子	345
薄荷	332	藿香	347
薏米	335	續随子	348
薤白	337	纈草	350

动物类

人中白	352	地龙	372
人中黄	352	牡蠣	373
刁骨	352	夜明砂	374
附：刁头、刁爪		刺猬皮	375
大將軍	354	阿胶	376
土元	354	狗宝	378
山羊血	355	紅娘	379
牛黄	357	虻虫	380
牛胆汁	358	馬宝	381
胆星	359	海螺	381
五谷虫	360	海藥蛸	382
水蛭	360	海馬	383
五灵脂	362	豹骨	384
瓦楞子	363	烏鷄	386
白丁香	364	桑螵蛸	386
龙骨	365	蚕沙	388
附：龙牙		附：僵虫	
全蝎	366	鹿茸	389
血余炭	369	附：鹿角、鹿筋、鹿鞭、 鹿尾、野鹿胎	
羊头虫	371		

蛇退皮	392	蝸牛	402
望月砂	393	螻蛄	403
紫河車	394	蟋蟀	404
蛤壳	395	蝉退	405
斑毛	395	蟹壳	407
蜂蜜	396	附：蟹爪	
附：黄蜡		蟾酥	408
蜂房	398	鱗魚	410
鷄內金	399	附：鱔魚血	
附：鳳凰衣		鱉甲	411
駱三件	401	附：鱉头	
蜘蛛	401		

矿物类

代赭石	413	花蕊石	418
白石英	414	禹粮石	419
附：紫石英		云母石	420
自然銅	415	滑石	421
阳起石	416	活磁石	421
芒硝	417	礞石	422

植 物 類

山 藥

別名：土薯、山芋、山薯。

土名：白山藥、架山藥、淺山藥、白薯。

来源与形态：屬薯蕷科，为多年生宿根蔓生草本植物。我省有野生、家种两种，安国已有数十年的种植习惯。春初生新芽，茎细长，纏繞它物上升。叶对生，有长柄，呈心脏形而略长，头尖锐。夏季由叶腋間生白色小花，呈穗状花序；另由叶腋間生球形灰褐色的零余子（俗称山藥豆），可作种子，亦可食用。其根长1至3尺，粗1至2寸，外皮黄褐，有細毛根及小疙瘩。断面色洁白，性脆易断，粉質大。

主要产地：家种产于安国、易县、阜平和平山县，以及承德市；野生产于迁安、遵化、邢台和青龙县，以及秦皇島市。

产季：在霜降至立冬間。

采集与加工：藥用其根。刨采时，先将茎蔓去掉，順畦挖一深沟，深浅随山藥长短而定，然后向山藥根部刨，并注意勿使山藥折断。刨出后稍晾一会，去淨泥土，进行加工，一般在冬季加工較好。夜晚将山藥放在院里稍冻一下，第二天使其化冻，刮去外皮，晒至半干，用搓板輕搓成直条，再晒至八成干，进行第二次搓制，一直搓到圓滑光亮如圓柱形即可。并将两头切齐（一般为七、八寸长），晒至十成干，再用硫磺熏制，以保色澤，即为光条。毛条仅刮去外皮，用硫磺熏制即得。

規格質量：身干，条粗直，質坚实，色洁白光潤，圓柱形，两头整齐者佳。

包装与保管：用箱或筐装，封閉严密。因夏季容易生虫，可用硫磺熏制，并防止受潮。

性能：性温平，味甘。健脾胃、止痢涩精，为滋养强壮药；还可供副食用。



1.带零余子的莖叶 2.块根 3.果实

附：种植方法

一、选地与整地：山药喜沙质土壤，适宜在重茬或有水源条件的地方播种。在秋收后进行整地深翻，深度3至4尺。3尺以下铺草木灰一层，以使根茎粗壮。翌年化冻后复耕一次，

深約 5 至 6 寸，随施基肥（土糞）万斤以上，并翻入土內，耙平作畦。

二、播种：山藥有零余子和种根繁殖两种。但零余子繁殖比种根晚一年收获，因此，目前我省多用种根繁殖。在清明、谷雨間进行播种，畦內开沟，沟距 1.5 尺左右，深 4 至 5 寸，寬 5 至 6 寸。把沟底整平后，随将种根单摆沟內，株距 4 至 5 寸，种根的头部分順沟外側成直綫形，然后复土寸許，輕踩一遍，摟平即可。播种后不澆水，約半月发芽出土。

零余子适于大面积的种植，于清明左右在整好的畦內挖穴沟，株距 4 至 5 寸，每穴播种 2 至 3 粒，复土寸許，約半月发芽出土；立冬左右刨出，其第一年生根很短（一般約长 5 至 8 寸），因此应进行选种（凡短粗、錐形或畸形者都不宜作种根），以备来年播种用。其方法与种根相同。

三、田間管理：当苗出齐后澆第一次透水，以后进行浅鋤，干旱即澆水，但不要过大或过勤，以經常保持土壤湿润即可。入伏后施肥，在离植株 2 至 3 寸处开沟，沟深 2 至 3 寸，寬 3 至 4 寸，将餅肥或化肥施入沟內摟平（每亩施餅肥 60 到 100 斤），施肥后澆水，并注意中耕和除草。因其茎蔓需纏繞它物上升，所以在苗高 5 至 6 寸时，搭成 × 字形的架（架杆可用高粱秆），以便引蔓上架，同时并将地面底叶去掉，任其自由生长。

四、收获：山藥的收获期，一般在霜降至立冬間。其采集或加工方法与前相同。

五、种根的儲藏：在山藥收获后，将根的上部（接近地面长 4 至 5 寸处）切下，放在阳光下晒一晒伤口，使其愈合，作为来年种根。种根选好后，挖 2 至 3 尺深的坑，长、寬可根据种根多少而定。坑如干燥，可洒些淨水，但不可过湿，然后将种根、头对牆面放于坑內。放一层种根，盖一层土，土的厚度以盖住种根为宜。放滿坑以后，坑面复土 7 至 8 寸（严寒地区可厚些），以冻不着为原则。来年春化冻后挖出，晒一晒，即可播种。但在选坑址时，为防止坑內发热，以背阴处为宜。

山 人 参

别名：人参、人衙、鬼盖。

土名：野人参、野山参。

来源与形态：属五加科，为多年生草本植物，自生于大山阴坡潮湿地带或椴树、樺树林中。秋季茎高达2尺左右，主根肥壮，黄白色，略呈纺锤形，末端常分枝两股，多成人字形；


侧根细弱而长（称为参须），上有许多疙瘩点（称珍珠须）。

根茎粗短、渐细、直立或略弯曲。生在根顶端的称为蘆头，上面有许多窝状茎痕，称为参碗。

每年从蘆头长一细弱小茎，茎端（生长四年以上者）分四枝叶柄，上生小叶五片，呈掌状复叶。

小叶卵圆形或倒卵圆形，叶端略尖，其中间三叶较大，两旁者较小，有短柄，边缘有小锯齿或大锯齿。

腋生花梗，细长（约4至5寸），开伞形花序，花小，由淡绿色渐



1. 植物外形 2. 根茎 3. 花 4. 果实

变为粉红色，最后呈红色，花瓣五枚。花后结肾形种子，淡黄色，质坚硬。在5至6月间开花，8至9月间结果实。

主要产地：青龙和兴隆县。

产季：秋分至结冻为刨采期。

采集与加工：药用其根茎及根须。采集时，用镐在参茎周围1至2尺处挖坑，然后用骨针拨土，以免全参折断。刨出后去茎叶，刷净泥土，晒干即可。但要防止曝晒，以免损失精液。

规格质量：全参（带须），身干，色黄白，质坚实。

包装与保管：用长方形木箱装。内垫白纸，按顺序靠紧装平（盖头朝外、参须放当中；并将各空隙用软纸塞严）。夏季可用硫磺熏制，然后把箱口封闭严密，以免生虫、返油或变质。

性能：味甘，性微寒。为强壮兴奋药。治精神衰弱、虚劳内伤或贫血等症有效。

注：本品是我省1957年新发现品种，产量还不大。

山豆根

土名：关东裸秧、红心草、山豌豆根子。

来源与形态：为一年生落叶缠绕藤本植物，自生于山坡地带。单叶互生，心脏形；呈掌状浅裂，叶端渐尖，全缘。嫩叶两面有毛茸，老时叶面光滑，灰绿色，有长叶柄。腋生圆锥状花序，黄绿色。花落后结果，呈肾形，生时青色，熟时紫黑色。其根茎粗壮或细瘦，条光滑、须根少、外皮黑褐色，断面黄白色。

主要产地：滦源、易县、薊县、邢台、青龙、兴隆、蔚县、龙关和迁安县，以及承德市。


产季：在春、秋两季产新（春季化冻至苗高寸许止；秋季叶枯死后至封冻止，这时产品质实、精液足、药效高）。

采集与加工：药用其根。用镐将根刨出，去净泥土和毛须，晒干即可。

規格質量：身干，質實，不帶毛須，色黑黃，無雜質，粗1分以上者佳。

包裝與保管：扎捆，外面用席包裹。保存時宜放乾燥的地方，夏季應經常晾曬，防止發霉或蟲蛀。

性能：性寒，味苦。清熱、解毒、消腫去肺火，為解咽喉腫痛要藥。



1.帶花的枝 2.果枝 3.種子 4.生藥外形

山楂片

别名：山里果、山果子、山查子、木桃子。

土名：山里红。

来源与形态：属蔷薇科，为落叶乔木或灌木。生长于干燥多砂的山野，也有栽于园田的。树高丈许，树皮暗灰色，叶广



1.带果实的枝叶 2.果实剖开的药用部分

卵形或长圆形，呈浅裂或深裂，边缘有锯齿。叶柄较长，树枝间有刺。春季幼枝顶端生五瓣白色花，作伞房花序。花落后结球形果，微扁，有果柄，外皮暗红色，肉黄白色，味酸略甜。

主要产地：涿县、兴隆、青龙、薊县、怀来和遵化县，以及秦皇島市。

产季：在秋分至霜降产新。

采集与加工：药用其果实。当成熟皮稍青时摘下，用刀切成五至七片，晒干或烘干即可（烘干者色红质佳）。

规格质量：片大，子少，皮红，肉黄白色。

包装与保管：用麻袋或席包装。本品易于返潮、虫蛀，夏季应经常晾晒，以防发霉变质。

性能：味甘酸，性寒。破气、散瘀、消内积、化痰涎，用于消化不良；又为收敛药及止血药。

大 黄

别名：黄良、将军。

土名：香大黄。

来源与形态：属蓼科，为多年生草本植物。我省有野生和培植两种。初春自宿根茎抽生新叶，叶形随品种的不同而有所差异。培植的叶大，为心脏形呈掌状浅裂（图一）；野产的叶也大，呈掌状深裂（图二），均有长叶柄。春夏或夏秋之间，由茎梢和叶腋间长出圆锥形花序，上生许多绿白色小花，花落后结瘦果。其根茎多为粗壮圆柱形或圆锥形的块状，有许多粗细不等的须根。

主要产地：野生的产于蔚县、围场和丰宁县；培植的产于平泉和青龙县，以及承德市。

产季：春季刨采（由移秧栽种约三年产新）。

采集与加工：药用其根茎。当成熟期，将根茎用镰刨出，去掉茎叶和外皮，切成1至2寸的圆块，晒干即可。

规格质量：根块身干，质坚实，外红褐色，断面粉红色，

带朱砂点者佳；黑色者不能入药。

包装与保管：用筐或麻袋包装。保管时放干燥通风的地方，防止受潮。

性能：味芳香，微苦，性寒。为泻下药，并有健胃作用。对腹痛便秘、黄疸、瘀血或肿毒等症有效。



图一 植物全形



图二 植物全形

大青叶 附：青黛

别名：蓝青、靛青、蓝靛、蓼蓝。

土名：靛叶。

来源与形态：屬蓼科，为一年生草本植物。我省已有数十年的种植习惯，以安国种植历史最长。茎高1至2尺，叶互生，椭圆形或卵圆形，叶柄基部有膜状托，包茎而生。夏季茎顶叶腋间抽出长梗，开淡红色小花，作穗状花序。花落后结赤褐色的小果，有光泽。

主要产地：安国、唐县、藁县、青龙和平泉县。

产季：在夏、秋两季产新。

采集与加工：药用全草。青叶除药用外，多加工成青黛（也供药用和颜料用），因此分两茬收割。第一茬在小暑前后；第二茬在白露前后。但采集季节性很强，过早无靛；过晚靛含量减少。药用青叶割下后，去掉老梗，阴干即可。

规格质量：叶片厚，整齐不碎，身干无杂质，不霉无老梗。

青黛的加工方法：将大青叶割下，晒至柔软，装入甕中（容量二百斤左右），注满清水（水高出青叶4至5寸）浸至茎脱皮、枝脱节时（一般约浸2至3天）捞出，去净茎枝，然后加石灰（每百斤青叶加石灰8至9斤）。但石灰加得过多则泡沫减少，青黛产量降低；加得太少不易沉淀，也能减少产量。所以在加石灰时如果呈青绿色，则灰少，需增加；呈灰白色则灰多，需迅速加水；呈红土色最为适宜。加灰时，先将石灰放另一甕中，注清水，用木棍搅动，除去灰渣及杂质后，再倒入青叶甕中，随即用木棒上下翻捣，促使其发酵。浮起的泡沫应及时地捞出，并立即曝晒（如不及时曝晒，会变坏为青绿水），干燥后即为青黛。水下面的沉淀物即是青靛。

包装与保管：青叶扎捆，外用席包裹；青黛、青靛可用箱装或桶装。保管时要防止受潮，以免发霉变质。

性能：味微苦，性寒。为清热、解毒药。治热毒热痢、喉



花莖叶

痹、喉风；外用于大热口疮等症有效。

附：种植方法

一、选地与整地：大青叶适于肥沃土壤种植。在惊蛰整地深翻，深尺许，施基肥（土粪）万斤以上，并翻入土内，耙平

作畦。一般多与大蒜套作。

二、播种：在谷雨前后进行播种（忌晚播，否则减产）。首先将留种地浇水溼透，开沟撒种，行距8寸、株距6寸（每亩用种子1至1.5斤），播种后复土约1寸厚，七日后苗即可出齐。

三、田间管理：苗高2寸时，进行追肥，每亩施人粪或肥田粉50到60斤（将肥埋于株距中间），并随之浇水。以后可根据干旱情况适时浇水，以经常保持土壤湿润为宜，并注意中耕除草。

四、收获：共收割两次。苗高8至9寸（芒种前后）即可割第一茬，割后每亩追饼肥50到100斤，或硫酸15至20斤，以利植株生长。立秋割第二茬，此时可将茎叶全部割掉，每亩一般可收300到400斤。

收割时应注意留种，并要继续管理。秋分开花，霜降即可收籽。收集的种子要储藏于通风干燥处，防止烟熏，以免影响种子发芽率。

大 薊

别名：刺薊、虎薊、山牛蒡、馬薊。

土名：刺兒菜、扎扎嘴、刺菜。

来源与形态：屬菊科，为草本植物，自生于田野。茎直立，高尺许，上部分枝，有毛茸。茎生叶，无柄，长圆披针形，呈羽状浅裂，先端尖，边缘有长短不一的刺，叶面深绿色，有毛茸，背面白绿色。花紫红色，单生于枝梢，呈头状花序，有球形总苞包围，苞片成复瓦状，紧密排列。果实为瘦果，椭圆形而微扁。

产地：全省各地均产。

产季：在春、夏季間。

采集与加工：药用全草。在花未开放前，用镰刀紧靠地面割其全株，阴至八成干，捆成小捆，再晒干即可。

規格質量：全草，身干不碎，无老梗，色灰綠，不霉无雜質。

包裝与保管：用席包裝。保管时放通风干燥处，并防止受潮。

性能：性溫，味甘。凉血、散瘀，并可用作止血及水肿藥。



1.带花的莖叶 2.果实

土 貝 母

别名：大貝母。

来源与形态：屬葫蘆科，为多年生草本。我省有野生、家种两种，目前多为移种。莖細长，約3至5尺，匍匐生长。叶



1. 茎叶 2. 根块

互生，呈心脏形，先端尖，两侧有对称深浅不等的缺刻，叶柄长。叶腋间生长卷须。地下根茎由许多肉鳞片组成，为圆块形，色白，下侧并有许多细长的须根。

主要产地：安国、邢台、藁县、怀来和武清县。

产季：在7至8月间为刨采时期。

采集与加工：药用其鳞片状的根块。用镐刨出后，去净毛须及泥土。当二成干时，装入麻袋撞去老皮，晒干即可。

规格质量：身干，色黄白，质坚实肥壮，无碎瓣者佳。

包装与保管：用箱或筐装，内垫油纸，封闭严密。储藏于通风干燥处，防止受潮。

性能：味苦，性微寒。为除风湿、化脓毒、利痰、行滞、收斂疮口药。并能消痈疽、恶毒或痰核瘰癧。

附：种植方法

一、选地与整地：土贝母适宜在水源充足、肥沃的土壤中生长。秋耕后进行整地深翻，来年春解冻后，随即浅耕、耙平、作畦。

二、播种：春分前即可播种。先在整平的畦内挖坑，深约2寸，行距1尺，株距7至8寸。坑挖好后，将预选的种根剥成瓣，栽于坑内。每穴下种根一块，复土寸许，并浇蒙头水一次，以后要经常保持土壤湿润。栽后12至15天可出全苗。

三、田间管理：幼苗期可浅锄一次，以后有草用手拔掉，以免伤根。苗高3至4寸时施粪肥万斤左右，施肥后及时浇水。如遇暴雨时，雨后再浇一次井水，以防将贝母根块沤烂。

四、收获：土贝母在寒露即可成熟。刨时用三齿镐随刨随用手拣其根块（似小蒜珠），去掉毛须，即可进行加工（加工方法与前同）。

五、留种与储藏：采刨时，选根部生育发达的留作种用。在储藏种子前可稍经晾晒，然后刨坑埋好，防寒过冬；第二年春刨出剥瓣栽种。

土三七

别名：三七草、三七、天青地红、叶下红。

土名：水三七。

来源与形态：属菊科，为多年生草本。野生或盆栽供观赏。茎高3尺，直立，成长后多分枝，表面光滑无毛。叶互



1.带花的枝 2.叶 3.筒状花冠 4.生药外形

生，形大，羽状分裂，边缘又浅裂，顶端尖。秋末茎稍分枝开花，花黄色，头状花序。果实为瘦果，细小，表面有棱，褐色。

主要产地：平泉、隆化、易县和安国县。

产季：秋末春初采刨。

采集与加工：药用其根块。用镢刨出后，去茎、叶及泥土，晒干即可。

规格质量：根块大，整齐，外皮黄褐色，断面黄白色，身干无土者佳。

包装与保管：用筐包装。宜放于干燥处，并防虫蛀、受潮发霉。

性能：性温，味甘，微苦。内服止血、愈疮；榨汁外用于毒虫刺伤。

小茴香

别名：慈谋勒。

土名：茴香子。

来源与形态：属伞形科，为多年生草本。茎直立，高4至5尺，上部分枝，乳绿色。早春叶由宿根丛生，有长柄，叶柄由下而上渐短，近基部呈鞘状，宽大而抱茎。叶片大，三至四回，呈羽状分裂，裂片很多，似线形，靠近上端的裂片细如丝状。夏季（六月）枝梢抽生花轴，开金黄色或白色小花，呈复伞形花序，结两瓣合成的果实，略弯曲、圆柱形，两端微尖，表面有棱线隆起，成熟后分离为二个果片，味香甚浓。

主要产地：安国和蔚县。

产季：秋分为采集期。

采集与加工：药用其果实。当果实成熟后，将小茴香全株割下，趁湿捆成小捆，晒至七、八成干。然后将种子摔下或用手搓下，再用风车搨去杂质，晒干即可。

规格质量：籽粒成实，黄绿色，身干无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。储藏于通风干燥处，防止受潮发霉。

性能：味芬香，性温。为健胃，祛寒药。



1.带果序枝叶的一部分 2.花 3.果实

小 薊

別名：馬薊、虎薊、刺薊、鷄項草。

土名：苣荳菜、曲菜。

來源與形態：屬菊科，草本植物，自生于田野間。莖直



1. 根莖葉 2 花序

立、平滑，折断或破裂有白色乳汁流出。叶互生，无柄，广披针形或长圆状的披针形，先端盾尖。茎顶端开头状花序，花片呈舌状，紫红色。

产地：全省各地均产。

产季：在春、夏季间产新。

采集与加工：药用全草。当花未开放前，用镰刀将其全株割下，阴干即可。但在采集时，应注意过嫩或已开花者，都不适于药用。

规格质量：身干不碎，灰绿色，不带根，无杂质。

包装与保管：用席包装。保管时放干燥通风处，防止受潮。

性能：性温，味苦。为止血药。治暴下血、血崩、金疮出血或呕血等症。

川山柳

别名：赤柳、赤杨、河柳。

土名：山川柳、红荆条。

来源与形态：属柳科，为灌木或小乔木，多生于砂地和碱地。茎高10至15尺，枝绿色较密，小枝常下垂。叶小，色深绿呈披针形。六至十月开粉红色小花，作总状花序，花柱棒状。花落后结蒴果，种子小而多。

主要产地：黄骅、巨鹿、衡水、束鹿、安国、乐亭、迁安和怀来县，以及承德市。

产季：在夏、秋两季产新。

采集与加工：药用当年生的嫩枝叶。采集时，用剪刀或镰刀将树枝上的嫩枝叶割下，阴干（保持色泽）即可。但在阴晾过程中，要经常翻动，防止发霉变质。

规格质量：净嫩枝叶，色青绿，无老梗，身干不霉，无杂质。

包装与保管：用席包装。储藏于通风干燥处，防止受潮。

性能：味苦，性温。为利尿、解毒药。治关节风湿痛，又为透发麻疹之药；外用洗皮肤可治癣。



1.带花的枝叶 2.药用部分

牛 膝

别名：牛茎、山萹菜。

土名：祁牛夕。

来源与形态：屬萹科，为二年生草本，自生于田野道旁。我省安国县已有种植。茎直立，有縱淺沟，高 2 至 3 尺，方形，青紫色，有膨大之节，如牛的膝盖，故名牛膝。茎有向上分枝；叶对生，卵圆形或长椭圆形，全緣，两面有細毛。夏季頂生或腋生穗状花序，小花綠色，紧貼于花梗，頂部尖，有光澤。其根細长，約 1 至 3 尺，多肉質，外皮黃褐色。

主要产地：平泉和安国县，以及秦皇島市。

产季：立冬至小雪。

采集与加工：药用其干燥根。当茎叶枯萎后（过早未成熟，过晚发柴性），用鋤鏟在畦的一边挖沟，寬 1 至 2 尺，深度按牛膝根的长短而定（注意切勿切断）。刨出后，去掉土及須根，晒至八、九成干，用硫磺熏制，随后按規格分等，分別捆成直徑 1 至 5 寸的小把，再晒至足干即可。

規格質量：条粗而长，皮色黃亮，无阴条（即返油条）者佳。

包装与保管：用箱或筐包装，內垫紙，装好后封閉严密。夏季易被虫蛀，有条件的可儲于冷藏室或用沙土埋藏。

性能：味苦，微酸，性平。补肝肾、强足膝、散恶血、治痿痹，为治骨节疼痛及淋病药。

附：种植方法

一、选地：牛膝适宜于高地、水位低、沙質土壤或沙黃土地上种植；不适于重茬、碱地及前茬蔓菁或蘿萹地种植。

二、整地：牛膝系深根植物 适于深耕。第一年秋耕后，来年春季再深翻 2 至 4 尺。播种前十天，每隔 3 尺远用耢子开沟进行浇水，过几天等水渗透后再松土，随之亩施混合肥 3,000



植物形状

到4,000斤或餅肥200斤作基肥。然后用鉄耙整平作畦，畦的长、寬可根据地形情况而定，一般畦寬2.5尺、长30尺。

三、播种：用种子繁殖。在小滿前五天播种，过早过晚均不适宜。过早根部分杈多；过晚产量低。一般有两种方法：

(一) 干播：在整好的畦里，用鉄筲划成五分深的沟，将

选好的种子均匀撒布沟内，用铁耙轻轻复土搂平，盖严种子，然后用脚轻踩一遍，三天后种子发芽，八天后苗可出齐。播种后一般不浇水，如特别干旱可进行浇水。

(二) 催芽：在播种前三天，将种子倒入凉水内浸12小时后捞出，放瓦盆内，并盖上湿布，一天洒二、三次水，保持一定湿润。三天后长出小白芽，即可播种。方法与干播相同，但播后不宜轧或踩，应及时浇水，六天后即可出苗。播种时应在晴天的下午3至4点钟为宜；阴雨天均不适宜，否则伤芽不易出土。此法适宜干旱地区采用。

无论干播或催芽播种，每亩播种量不能少于3至4斤。

四、田间管理：苗高1至1.5寸时进行定苗，行距6寸；苗高2至3寸时中耕松土，但不宜过深，划破地皮即可，以后有草即除；苗高4至5寸时进行追肥，每亩施硫酸铵10至15斤；苗高7至8寸抽苔时，随即摘掉，促使根部发育粗壮。

(一) 幼苗期：宜浇大水，促使叶子繁茂，根下扎。立秋是发育期，宜浇大水，使根膨大。在浇水时一般应掌握先浇小水，后浇大水，天旱多浇，雨多则少浇或不浇，追肥后必浇的原则。生长期如遇暴雨，应速将雨水排出并及时浇井水或河水（因雨水温度较高，影响根部发育或将根沤烂）。

(二) 病虫害防治：牛膝在幼苗期病害轻微，虫害以香虫及肉虫为害其苗叶，发现时用手捕捉或用50%可湿性滴滴涕喷洒。此类害虫在打顶前发生最多。

五、留种及选种：选种是繁殖的关键问题。因此，在刨采时选健壮、根长、光滑均匀、须根少的植株，截取下部作药用，上端根茎部分作种根，及时移栽于原畦或种畦地里，假植越冬。第二年清明节前，将种根刨出移栽到没种过牛膝的畦地里，霜降后种子成熟时，割其全株，晒干，用木杈打下种子，除尽杂质，将种子装布袋内，放于通风干燥处，并防止烟熏或油浸，以备来年播种用。

牛蒡子

别名：恶实、大力子、鼠粘。

土名：牛子。

来源与形态：属菊科，为二年生草本，自生于山野或栽培于园圃。形粗大，茎高3至4尺，多分枝，根出叶丛生，茎



1.带花的枝 2.管状花 3.苞片 4.生药外形

上叶互生。叶大长尺許，广卵形或心脏形，表面深綠色，光滑，背面密生灰白色細絨毛，頂端鈍圓形，邊緣有細鋸齒和微帶波状；有长叶柄，生于基部的叶多呈心脏形，茎上部的叶逐漸变小。初夏开紫色花，呈头状花序，每一个头状花序下有一球形总苞，苞片基部密接，頂端延长而成針状，末端鈎曲。果实为瘦果，呈略弯曲的长橢圓形，灰黑色，外表有数条不明显的棱綫。

主要产地：安国、易县、涞源、隆化、兴隆、平山、正定、迁安、灤平、张北、蔚县、怀来和龙关县，以及承德市。

产季：秋末产新。

采集与加工：药用其种子。果实成熟后，将全株割下，晒干，摔下种子，除去杂质再晒干即可。

規格質量：籽粒成实飽滿，外皮灰黑或黄褐色，无杂质和砂土。

包装与保管：用麻袋包装。牛蒡子易遭虫蛀，夏季須經常曝晒，并放干燥通风处儲藏。

性能：味苦辛，性平，无毒。宣肺散結，清热解毒。治麻疹或疮瘍痲肿。

五味子

土名：北山五味。

来源与形态：屬木兰科，为落叶蔓生藤本植物，自生于山林沟边的灌木丛中。茎似葡萄秧，扭曲。叶互生，有长柄，叶片呈寬橢圓形、卵圓形或倒卵形，邊緣有細鋸齒，叶腋間开紅白色小花，多下垂。花落后結浆果串如葡萄，成熟时呈紅色，晒干后呈紫褐色，現皺紋，內包种子两枚，腎形，光滑，呈黄褐色。

主要产地：易县、蔚县、涿鹿、龙关、青龙、兴隆、灤平、丰宁和隆化县，以及秦皇島、承德市。


产季：在白露至秋分間产新。

采集与加工：药用其干燥果实。成熟时，用手一串串摘下，摊在席、石板或木板上晾晒，晒至七、八成干摘去果柄，再晒至不粘手即可。

规格质量：籽粒成实，色紫红有油性，无虫口碎粒，无枝梗杂质，身干不霉者佳。

包装与保管：用麻袋包装。宜放干燥处保管，并须勤检查，防止受热变色。

性能：酸性很强，稍带甘，性温。为滋补强壮药，并可作收敛性镇咳药。



1.带果实的枝叶 2.雌花 3.雄花(去花皮)
4.药用外形(果实)

五加皮

土名：老虎獠。

来源与形态：屬五加科，为落叶灌木，自生于山野。高6至7尺，枝干生少数刺，五出掌状复叶，有长叶柄，边缘有锯齿。夏季叶腋生黄绿色五瓣小花，呈伞生花序，花落后结黑色球状果实。

主要产地：阜平、易县、涞源、唐县、青龙、兴隆、隆



1. 植物形状 2. 药用部分

化、迁安、怀来和蔚县，以及承德市。

产季：夏季产新。

采集与加工：药用其根皮。用鐮将根刨出后，去淨苗蘆，趁湿用木棒砸之，使皮离骨，剥根皮，去骨，晒干即可。

规格质量：肉厚整齐，去淨須根及硬心，外皮黑黄，内碴灰白，皮半卷如筒状，味香，无杂质。

包装与保管：用席包装。保管时防止受潮发霉。

性能：味辛，性温。为强壮药。祛风湿、壮筋骨，治阴痿、筋骨痛或疝气腹痛等症。

元 胡

别名：延胡索、玄胡、元胡索。

来源与形态：屬罂粟科，为多年生草本，自生于山野阴湿之地。茎高3至6寸，叶为二回三出复叶，小叶卵形，又作不规则的一至二浅裂，有长叶柄，四、五月間于茎頂开紫色唇形花，作总状花序。果实为蒴果，长圆形。其地下块茎呈扁圆球形，似半夏，表面黄褐色。

主要产地：兴隆、灤平、内丘、邢台和涉县。

产季：在5至6月間产新。

采集与加工：药用其根茎。用鐮将根刨出后，除掉須根，趁湿或經水洗过后，用手搓去浮皮，以水漂淨，然后按大小粒分別用开水煮，煮至里面变成黄色为止。但注意不要煮的太嫩或太老，太嫩，里面呈白色粉碴不合规格；太老，外皮出現皺紋，亦会降低质量。煮好后摊席上晒干，如遇阴雨天可用炭火烘干（烘干的颜色质量不如日晒好）。

规格质量：外皮黄褐色，内碴黄色，质量充实，外表光滑，整齐不碎。

包装与保管：用麻袋包装。宜放干燥处保管，防止受潮。

性能：味微苦，性温。利气止痛，活血散瘀。治妇人月經不調，腹中結块，崩中淋露，产后諸血病，以及血量等症有效。



1. 植物形状 2. 块茎 3. 药用部分

升 麻

土名：苦菜秧、苦力芽、苦壮菜。

来源与形态：屬毛茛科，为多年生草本，自生于山野阴坡。秧高3尺左右，根茎粗大，生有許多須根。叶为二回三出复叶，小叶呈卵形，有二至三浅裂，边缘有鋸齿，头端尖銳，秋季頂生白色小花，呈穗状花序。

主要产地：围場、丰宁、隆化、平山、正定、薊县、迁



1.枝叶 2.花序 3.药用部分

安、遵化、蔚县、怀来和龙关县。

产季：在春、秋两季，以春季产者質量較好。

采集与加工：药用其根茎。用鐮将升麻刨出后，去茎、叶及泥土，晒至一、二成干，使其須根稍干再用火燎去須根。方法是在地下挖坑，两边砌墙，上鋪鉄条，鉄条上放升麻，坑下烧火（注意掌握火候，火大升麻容易烤焦，火小須根不掉），边燎边翻动，燎完后再用筐撞去黑渣，晒干即可。

規格質量：个大整齐，无須根，外表呈古銅色发亮，内渣青白色，不霉烂，无杂质身干者佳。

包装与保管：用筐包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：甘苦，性平。升清降浊，散风解毒。治疮瘍、肿毒或喉痛口疮。

木 賊

土名：剝草。

来源与形态：屬木賊科，为多年生常綠草本，自生于山野。茎丛生，单一，不分枝，細长而中空，有节。表面粗糙有縱沟，叶鱗片状連成硬鞘，包于茎节上。茎頂生椭圆形子囊穗，如笔头状，初綠褐色，后渐变黄色。

主要产地：围場、丰宁、易县、蔚县和怀来县。

产季：秋季为采收期。

采集与加工：药用其全草。用鐮刀将全草割下，去掉杂草晒干即可。

規格質量：青綠色，身干无杂质。

包装与保管：用席包装，保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味甘，微苦。为发汗利湿、退翳膜及目疾药；又是利尿、止痢药。



植物全形

瓦 松

别名：柞叶荷草。

土名：猫头草、瓦塔。

来源与形态：属景天科，为二年生草本，自生于向阳而干燥的老瓦房上或岩石上，山区尤多。茎高4寸至1尺左右，全

株粉白，密生紫红色小点，叶厚细长而无柄，顶端尖锐。花密生于茎顶，排列成圆锥形总状花序，花瓣呈白色。

产地：全省各地均产。

产季：在7至8月间采集。

采集与加工：药用其全草。当瓦松在半花半籽时用镰刀割下，曝日晒干。

规格质量：全草去根，色灰紫，整齐无杂质，身干不霉。

包装与保管：用席包装。宜放通风干燥处，防止受潮。

性能：味酸，性平。治水疝、血痢、止血，又用于通经。



1. 植物全形 2. 花

鳳仙花 附：急性子

土名：指甲花、海蓮花。

来源与形态：屬凤仙花科，为一年生草本。茎高尺余，叶长椭圆形，边缘有細鋸齒。夏季分枝开紫紅色或白色花，花冠不整齐，状如飞鳥。果实为蒴果，果皮的弹力很强，成熟后裂



1. 植物外形 2. 种子

开甚烈，借以散播种子，故名“急性子”。种子圆球形，黄褐色或赤褐色。其花色红鲜艳，小孩多用其染指甲，故又名“染指甲花”。

产地：全省各地均产。

产季：6至7月间为采花期，8至9月间采收种子。

采集与加工：药用其花及种子。于开花期，将畦内扫净，每日下午收集其掉落花朵，拣去杂质、晾干。果实成熟期，用手捋下种子，晒干即可。

规格质量：籽：籽粒饱满，赤褐色，无杂质；花：花净无杂质，颜色鲜艳。

包装与保管：籽用麻袋装，花用席包装。保管时宜放干燥处，防止受潮。

性能：籽：性温，味苦。消积块、下骨哽，有通经作用。

花：性温，味甘。活血消积，治腰胁痛及毒蛇咬伤。

王不留

别名：王不留行。

土名：不留子、麦加菜。

来源与形态：属石竹科，为一年或越年生草本。茎直立，平滑无毛，表面呈乳白色，圆柱形，高1至2尺，节部略膨大，上部多分二杈状，枝越向上越细。叶对生为卵圆形，至披针形，淡绿色，无叶柄，全缘，顶端渐尖。夏季于枝端开淡红色小花，花落后结蒴果，卵形或近于球形，外表有五条棱线，内包许多种子，初期为绿色，成熟后变黑色或黑红色。

主要产地 安国、元氏、巨鹿、邢台、南宫、涿鹿和蔚县。

产季：芒种前后采集。

采集与加工 药用其种子。果实成熟后用镰刀割其全株，晒干，将种子收集起来，并去净茎叶和杂质。

规格质量：籽粒充实饱满，色黑红，身干无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味苦，甘辛，性平。有止血、镇痛及催乳作用；外用治刀创伤。



1.带果实花序的茎叶 2.种子

火麻仁

别名：火麻、黄麻、大麻。

土名：綫麻子。

来源与形态：屬大麻科，为一年生草本。茎直立，高3尺至



1.枝叶 2.雄花序 3.雄花 4.雌花 5.药用部分

丈許，有分枝，密生細絨毛。其下部叶对生，有长柄；上部叶互生，有短柄，均为掌状复叶。小叶披針形，两端漸尖，邊緣有粗鋸齒，表面深綠色，有短毛，背面密生灰白色絨毛。夏季于叶腋間开黃綠色小花，呈圓錐花序。果实为蒴果，扁卵形，表面光滑。

主要产地：围場、隆化、丰宁、滦源、易县、蔚县、邢台和平山县。

产季：秋季为采收期。

采集与加工：药用其种子。当种子成熟后，采收去淨杂质，鋪石磨上（将磨臍稍垫高些），輕輕將皮碾开（注意不要將仁磨碎），然后用风車搗去外皮即可。

規格質量：籽粒飽滿，身干，色黃白，无外皮或杂质。

包装与保管：用麻袋包装。夏季易遭虫蛀、返油，熏制后放通风干燥处。

性能：味甘，性平。为滋养、潤燥、鎮咳、鎮痛药。并可用于衰弱患者及老人小兒、产妇，或大便干燥不下者。

丹 参

别名：赤参、紫丹参。

土名：大紅袍、山苏子、状元紅。

来源与形态：屬唇形科，为多年生草本，自生于山野。根較粗，外皮色赤褐，內皮色紅。茎方形，高1尺左右，全体密生軟毛。叶对生，为奇数羽状复叶，小叶3至5枚，卵圓形，邊緣有圓波形鋸齒，上面毛少，背面密生細毛，茎頂与叶腋間开藍紫色唇形小花，呈总状花序，果实为小坚果。

主要产地：青龙、灤平、平山、易县、阜平、滦源、薊县、迁安、內丘、涉县、玉田、乐亭、怀安和蔚县。

产季：分春、秋两季。春季自化冻起到苗高4至5寸止；秋季由处暑起到地冻止。

采集与加工：药用其根。用鐮刨出根后，去尽苗蘆、

須根及泥土，晒至七、八成干，捆成一斤左右的小把，然后架起再晒，晒至足干即可。

規格質量：个条整齐，質量成实，皮細色紅，不带茎叶杂质。

包装与保管：用筐装或扎捆后外面裹席。保管时防止受潮。

性能：味苦涩，性微寒。去瘀生新，活血通經。治心腹痛，骨节疼痛，妇人崩中带下及一切恶疮肿毒等症。



1.花枝 2.药用外形

月季花

别名：月月紅、四季花、胜春、斗雪紅。

来源与形态：屬蔷薇科，为蔓草类灌木，多在宅边院落培种，多供观赏。茎高4至5尺，有刺。叶为复叶，其小叶三片至五片不等，披針形，边缘有細鋸齿，先端尖，表面平滑而有光澤，托叶很狭。开淡紅色花，多为重瓣，逐月开放而很少結子。

主要产地：滄县以及天津、保定和唐山市。

产季：在夏、秋两季采集。

采集与加工：药用其花。当花苞未全开放时，摘下摊于通风干燥处，阴干即可。



1.带花的枝 2.叶

規格質量：花淨身干，不霉不碎，无雜質。

包裝與保管：用箱或筐包裝。保管時防止受潮、發霉。

性能：味甘，性溫。為活血、消腫、止痛藥。

天仙子 附：莨菪葉

土名：鬼翻棵子、要命桃子、莨菪草。

來源與形態：屬茄科，為二年生草本。全體密被粘性細毛，手觸之有粘性感覺，並有一種濃厚的臭味。莖高1至2尺，一年生的莖極短，不明显。根出葉近地面叢生，卵圓形，頂端尖銳，邊緣羽狀淺裂；次年春生莖伸長而分枝，莖葉互生，呈長卵形，兩側有二至五個淺裂片。花由腋生，多在莖的上部，通常偏于一側，花萼筒狀，花冠漏斗狀，呈黃色並帶紫色斑紋。果實為蒴果，長卵圓形，成熟時上端周裂，內有許多種子，扁平，呈淡黃棕色。

主要產地：邢台、張北、青龍、興隆、龍關、豐寧、灤平、平泉和安國縣。

產季：夏季採葉，秋季收籽。

採集與加工：藥用其葉及種子。夏季將採收的葉片放通風處陰干即可；秋季果實成熟後，將其摘下晒干，用淨鞋底搓下種子，去淨雜質即可。

規格質量：籽：黃褐色，籽粒飽滿，身干无雜質。葉：色綠无梗，身干，不霉。

包裝與保管：籽用布袋或麻袋裝；葉用席包裝。保存時防止受潮。

性能：味苦，性寒，有劇毒。破症結，治癲癩癧癧。

注：天仙子有劇毒，生產時，不要用手揉眼，以免瞳孔擴大，影響視力，同時吃飯前必須洗手。

附：種植方法

一、選地與整地：天仙子適于沙質土壤或粘質土壤種植。



1.花枝 2.果实 3.种子

麦收后进行整地深翻，同时施基肥（土肥）万斤左右，并翻入土中，耙平做畦。

二、播种：用种子繁殖，分春播（谷雨）和夏播（夏至）两种。一般多为夏播，播种后发芽极慢（约20至30天），如想使种子提前发芽，可在播种前将种子用凉水浸泡1至2天，捞出晾晒至七、八成干。在播种前按1.5尺的行距用锄划3至5分深的浅沟，然后将种子均匀撒于沟内，复土，用脚轻轻踩一下。

三、田间管理：天仙子是越冬植物，当年不结子。苗出2寸高时，进行间苗，株距1尺左右，并结合追肥、浇水进行浅锄松土。每亩追施饼肥80至100斤，或硫酸铵15斤。追肥时，须离根1至2寸远，以免烧伤幼苗，并视土壤干燥情况，及时浇

水,以后适当中耕除草2至3次。霜降后叶子干萎,可复盖馬粪2寸以上进行防寒;来年化冻后,揭开馬粪幼苗开始出土,地温較高时再浇水。四月間抽苔、开花結籽,这时可分期采收叶片。旧叶摘去,新叶再生时,每亩追施餅肥100斤以上或硫鉍15至20斤。四月下旬至五月上旬摘除頂尖,促进籽、叶的生长。

四、收获:秋季果实成熟时收籽。其收获方法与前面相同。

水紅花子

別名: 葳草。

土名: 水萍花子、狗尾巴花。



1.带花序的枝 2.花序 3.生药外形

来源与形态：屬蓼科，为湿草类一年生草本。茎高5至6尺，全体密生細毛，茎有节，分枝較多。叶互生呈卵圓形，全緣，頂端长尖，有长叶柄。秋季茎頂与叶腋間开淡紅色小花，作穗状花序，多下垂。花落后結瘦果，象心脏形，扁圓，外皮赤黑色，有光澤。

产地：全省各地均产。

产季：秋季采收。

采集与加工：药用其种子。果实成熟后，剪下果穗，晒干，将种子搓下，用簸箕簸去杂质，晒干即可。

規格質量：籽扁圓呈心脏形，色赤黑，有光澤，內渣白色，身干无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。宜放干燥处，并防止受潮。

性能：味咸，性微寒。治消渴、祛热、明目、益气。

甘 草

别名：国老、灵草、蜜草。

土名：甜草、甜甘草。

来源与形态：屬豆科，为多年生草本植物。春初由宿根生茎，高1至3尺。叶互生，奇数羽状复叶，与山槐叶相似，小叶多至十余片，椭圆形，全緣，先端尖，茎叶有白茸毛。夏秋季在叶腋間开淡紫色蝶形花，作总状花序。花落后长圓荚果，种子坚实呈扁形。其根肥大且长，呈圓柱状，略弯曲。外皮紅棕色，易脫落，有縱沟紋，須根很多。味甘，折断时有粉末，故有蜜草、粉草之称。

主要产地：涿鹿、蔚县、张北、怀来、宣化、龙关、围場和丰宁县。

产季：由春季化冻起至冬季結冻止，均可刨采。但其質量各季有所不同，以秋季产質量最好。

采集与加工：药用其根。发现草秧后，不論秧子大小，用鋤鏟掉，随向下挖至两鋤深，看須根稀、密，如碼密即有好



1. 帶花的枝 2. 果實 3. 生藥外形

草，可繼續下挖；如碼稀可另找草秧，不需再挖。挖時要緊靠甘草一邊往下挖，注意不要折斷。挖出後趁濕把兩頭切齊，去掉須根，曬至七、八成干捆成小把（約10斤左右）；然後再曬至足干，捆成大捆即可（等外草只晒干不捆小把）。

規格質量：根據歷來收、售習慣及生長的土質、季節不同，一般要求是：

一等（大條）：長1尺以上，直徑在5分以上；

二等（中条）：长1尺以上，直径在4分以上；

三等（小条）：长1尺以上，粗细不限；

四等（皮草）：即横生支根（草心有白点），长、粗度不限；

等外（草头）：即主根与支根连接的地方，长、粗度不限。

根据以上所分等级，不论属于那一等，外皮均呈紫褐色，断面呈黄白色，粉多，皮细而紧，有菊花心，身干不霉，无杂草。但一、二、三等为主根，四等为支根，两端新茬整齐。

包装与保管：根据品质好坏，用木箱、席包或绳捆。但它含甜性，夏季易于生虫，并蔓延很快，不易熏治。因此宜储藏冷室或极干燥的低温处，封闭严密，不透空气为宜。

性能：味甘，性平。为镇咳、祛痰药。治干咳嗽、咽喉燥痛等症，又为解毒药。可调和诸药，能解百毒；并为制酱油、纸烟原料之一。

注：甘草用途很广，又是出口产品之一。如只靠野生已不能满足需要，急需由野生为家种。因此，根据以往刨采经验，提供一点试种甘草土壤线索。黄沙土地生长的甘草，上下粗细相等，皮细、粉多、筋少；而黑碱土地生长的甘草，粗细不等，皮粗、枝杈多、粉性少。因之在黄沙土地上培种甘草为佳。

生 地 附：熟地

别名：阳精、地髓。

土名：地黄。

来源与形态：属玄参科，为多年生草本，自生于山野。1957年我省试种怀生地成功，现已大量生产。茎高1至2尺，全身密生灰白色的软毛。叶通常丛生于茎的基部，倒卵形至长椭圆形，顶端钝，边缘有不整齐锯齿。叶面有皱纹，基部渐狭成长叶柄。茎单一或由基部分生数杈，上部生有小叶片。夏季顶端开总状花序，花为紫红色，带梗呈筒形。根茎肉质肥壮，鲜时皮黄白色，断面浅黄白色。

主要产地：家种产于静海、安国、玉田、磁县、邢台、宝坻和平泉县，以及石家庄、秦皇岛市。野生产于全省各地。

产季：家种在白露至秋分間，叶枯死后即可刨采；野生从春季化冻开始至抽茎止；秋季由霜降至封冻止，分两期刨采。

采集与加工：药用其根块。成熟后用鐮刨出，去淨泥土、晒干或烘干均可。但在刨采时要防止破皮（地干时可預先浇水溼透），以免腐烂或影响熟地加工。

熟地是用生地加工而成。先将干生地反复用水洗去泥土、晒干，每百斤加黄酒7至8斤（酒愈多愈好），搅拌均匀，然后用鍋蒸制。每隔一、二点鐘，取出晒一晒，一直蒸到断面无生心、色黑如漆为止。

規格質量：家种生地，体肥大，有油性，表面黄白色，身干无泥土；野生地，身干，条粗1.5分以上，粉紅色，不带毛須；熟地，色黑，无生心，油性大者为佳。

包装与保管：生地与熟地均用筐或箱包装。保存时放在干燥的地方，防止受潮。（鮮生地的保管方法見种植方法一节）。

性能：生地味甘苦，性寒。解諸热、通月水、利水道；干生地疗五劳七伤，久服延年；熟地味甘苦，性溫。滋腎、补血、益髓。

附：种植方法

一、选地与整地：生地适于在沙質土壤并有水源条件的地种植；盐碱地或粘土地不宜栽种。切忌重茬需輪作，前茬忌棉花、芝麻、大豆和邻近瓜田；喜谷子、玉米、高粱作物的前茬地。在秋收后，将留作生地的土地，进行深翻，深約1至2尺，并施土粪万斤以上，作为基肥翻入土內。清明作畦打埂，埂的距离一般在1.2至1.5尺，以备栽种。

二、育苗：生地栽植前須进行育苗，一般多在大暑至立秋間。将刨出春栽的生地，选无杈、有芽嘴、粗如手指大的根茎，截成小节（1寸左右），作为种秧，种植于田地里，浅沟



植物全形

播入（深寸許），然后复土浇水，五天后苗可出齐，約20天进行施肥（每亩施过磷酸鈣20斤左右）。封冻前每亩盖土糞6,000到7,000斤，以保安全越冬。

来年惊蛰将种秧刨出后，儲藏在預先挖好的深坑內，鋪5寸黄土，放3寸厚的种秧（层层依以类推），最上面盖4至5寸厚的土，以使芽子保持休眠状态。清明前刨出，即可栽植。

但在选坑址时，不要选放过生地、牲口粪或淋过石灰的地方，以免发生虫害或腐烂。

三、栽植：在清明节前栽种，最晚不得迟于芒种。栽种方法是：将种秧每隔5至6寸远，用手栽在畦埂上，深约1至1.5寸，严防过深。栽后要及时浇水，以保持秧苗正常生长。

四、田间管理：生地栽种后，要根据杂草生长情况进行中耕除草。幼苗期，宜浅耕；根长好后可用手拔草，不必耕锄，以免伤根块。

五、浇水：生地喜地湿润，但不喜水过大。平畦的浇水1至2寸深，作埂的浇半沟即可。浇水时应掌握三浇三不浇的原则，三浇即追肥以后浇、地旱浇、暴雨以后浇（以免暴雨沤烂根块）；三不浇即地皮不太干燥不浇，下午、阴天不浇，中午太热不浇。

六、治虫：生地易生红蜘蛛，发现后，应及时用5%可湿性六六六粉液喷杀。

七、收获：在白露至秋分间收获。其具体方法与前相同。刚刨出的鲜生地最容易腐烂，因此，应储藏于地窖中。下面先铺一层细砂土，然后每放一层鲜生地，撒一层砂土，最后用砂土盖严，这样鲜生地能长时间保存。

白芷

别名：泽芬、芳香。

来源与形态：属伞形科，为多年生草本植物。我省安国县已有数十年的种植习惯，其它各县均有少量种植。叶丛生，有长柄，二回羽状复叶，茎上叶互生，多三出复叶，小叶椭圆形或广卵形，偶有不规则的浅裂，边缘有细锯齿，叶面平滑，叶柄基部膨大成鞘状。夏季枝梢开五瓣淡黄或白色小花，作大形复伞形花序。花落后结果，里面包有种子，呈椭圆形，平扁。其根长7至8寸，粗5分至1寸，呈纺锤形，外面色淡灰褐，有纵沟纹，折断面色灰白，粉性大。



1. 茎叶花序 2. 花序放大

主要产地：安国县。

产季：秋播来年白露产新。

采集与加工：药用其根。刨采前将地上的秧苗去掉，然后用镢在畦的一边挖1尺深的沟，再向根部慢慢的刨，严防伤其根。刨出后，放场上晾晒（单株摆开），并要勤翻动；不要堆

成大堆，以免发霉及走油。

規格質量：身圓體肥，獨根，色白粉足，無虫蛀者為最好。

包裝與保管：用箱或筐包裝。夏季容易生虫，一般多用埋藏方法保管。其方法是將白芷放在乾燥的屋裡，地面墊起尺許，上鋪席，然後放一層麥糠，擺一層白芷，最上層蓋麥糠尺許，再將門窗封閉嚴密（勿使空氣侵入），可防生虫，並能長時間儲藏。另一種方法是將干透的白芷立着擺在大缸裡，擺好一層倒入干砂子一層，擺滿後在缸頂上再壓蓋3至4寸厚的干砂子。這樣可儲存1至2年之久，不但不變質，也不遭受虫蛀。

性能：味辛，性溫。為發汗鎮痛藥。治感冒、頭痛、婦女經血不調等症。

附：種植方法

一、選地與整地：白芷適于在肥沃沙黃質土壤生長，並有水源條件；對前茬作物選擇不甚嚴格，玉米、麥茬均可種植。在播種前須整地深翻（越深白芷主根生長的越好），隨施基肥（土糞）萬斤以上，並翻入土內，耙平做畦。一般畦寬3尺左右，長短可按地形來決定。

二、播種：白芷多採用撒播法，分春播、秋播兩種。安國縣採用秋播，在處暑節進行播種。播種時先在畦面上鋤溝，深半寸，將種子撒入溝內，復土澆水，15天左右苗可出土（每畝用種子2.5至3斤）。

三、田間管理：苗高2至3寸時進行鋤草、松土，畦面較干時，進行澆水，以保持土壤經常濕潤。當封凍時，澆凍水一次，水越大越好。大雪後待白芷葉片枯死，可在畦內鋪圈糞一層，以保溫防凍。

來年驚蟄將畦糞攪平，地干時可澆一次水（一般多在春分、清明澆頭水）。新苗長到2至3寸時，進行間苗、定苗工作，將過密的幼苗挖掉，株距2寸即可，隨之鋤草松土，宜淺鋤，以免傷其根部。定苗後進行追肥（畝施餅肥200到250斤，其他

肥亦可)，首先开浅沟，然后将肥料施入沟内埋好，并立即浇水，以加速分解。过伏天以后因雨水较多，不再追肥、防止主根畸形生长。

四、治虫：白芷在初夏多生蚜虫、火蜘蛛，为害严重。应经常检查，发现后立即用5%可湿性六六六粉液除治。

五、收获：秋播在第二年处暑以后，叶片发黄，到白露选择晴朗的天气开始刨收，其具体方法与前相同。每亩可收获600到1,000斤左右。

六、留种：采集的种子需单独培植。在刨收白芷时，可选择生长健壮，没有病虫害的做为留种植株，挂上标记，留在原地，并追肥一次。秋后当其它作物播种时，将留种刨出，剪掉一部分茎叶，随即栽到已准备好的留种地里，或将根埋藏于地窖里越冬，待来年化冻后再栽在地里。立夏以后抽苔，芒种以后开花，立秋后种子成熟。但由于种子成熟期不一致，应随熟随收。收集时将小穗剪下后捆成小把，放在干燥通风处，俟播种时再脱粒，并防止烟熏或受潮。

白头翁

别名：野丈人、奈何草。

土名：菊菊苗、菊花、老婆花。

来源与形态：属毛茛科，为多年生草本。春季自根部丛生数叶，有长柄，全体密布白色长绒毛，叶片为三出叶，每小叶深裂，裂片为不规则的浅裂。4至5月由叶丛中抽茎，长3寸余，茎上叶对生或轮生，呈总苞状。花单一顶生，萼片六枚花瓣状，排列成内外两层，表面有毛，里面平滑，深紫色，有许多雌蕊，花柱有白棉花，聚集成头状，形似老翁白头，故名“白头翁”。其根为圆锥形，呈棕黄色或灰黄色。

主要产地：唐县、易县、涞源、阜平、青龙、兴隆、蓟县、迁安、遵化、平山、蔚县和怀来县，以及石家庄、张家口、承德、秦皇岛市。

产季：在春、秋两季产新。

采集与加工：药用其根。春季由化冻开始至苗高1至2寸为采集期；秋季由叶枯死开始至封冻为采集期，以春季质量为好。用镐刨出后，去茎叶、泥土和须根，晒干即可。



1. 植物全形 2. 果实 (尚未成熟) 3. 药用部分

規格質量：身干，条整齐，皮黄褐色，头部有白絨毛，无杂质者为最好。

包装与保管：用筐或席包装。宜放干燥通风处保存，并防止受潮。

性能：性温，味苦。清热、凉血、疗腸风、治热痢。

白花菜子

别名：羊角菜子。

来源与形态：屬白花菜科，为一年生草本。茎高 2 至 3 尺，基部木質化，分枝很多；上部茎柔軟，全身有粘毛，嗅之有味。叶互生，有长柄，呈掌状复叶，一枝叶片五枚，倒卵形或卵形，先端短尖，全緣或有微鋸齿。夏季枝头开白色小花，呈总状花序。花落后結細长圓柱形的莢果，里面有許多种子，腎脏形；外面有粗糙紋，黑褐色而細小。

主要产地：安国县。

产季：白花菜子分春播、夏播两种。春播在夏季末成熟；夏播在白露前成熟。

采集与加工：药用其子。由于白花菜子成熟期不一致，須分批采收，晒干后搓下种子，再簸去杂质即可。


規格質量：籽粒成实，黑褐色，身干无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。保管时放干燥阴凉处，防止虫蛀、发霉。

性能：味苦，有微毒。煎水洗痔疮，搗敷风湿痹痛，搗酒飲治瘡。

附：种植方法

一、选地与整地，白花菜子对土質要求不严格，沙質土壤或粘土地均可种植。播种前須将地进行深耕（6 至 7 寸），随施基肥（土粪）万斤以上，并翻入土內，耙平做畦。畦寬、长可根据地形而定，以浇水便利为宜。



植物形状

二、播种：春播在清明节前后开始播种；夏播在立夏播种。安国多采用春播，其方法是在做好的畦内，用锄开沟，深3至5分，行距1尺，进行撒种（每亩播种量5至6两）。播好后，搂平沟面，立即浇水，三、五天后即可发芽出土。

三、田間管理：苗高3寸左右进行間苗、除草，宜浅鋤破土即可，以防伤其根部。間苗时，注意每隔1寸远留苗一株。苗高1尺左右进行追肥，每亩追餅肥70至100斤。在离植株3寸远处挖沟，深3寸左右，寬3至4寸，然后将肥料施入沟內，复土埋严，并随即澆水，使其加速分解。以后有草則除，干旱則澆，以保持土壤湿润。

四、治虫：在生长期，最容易发生蚜虫为害，影响植物生长。因此要及时检查，发现后，立即用5%可湿性六六六液噴杀。

五、收获：白花菜子开花期較长，籽粒成熟极不一致。当苗高5寸左右时，即开花結果，所以要随熟随摘，以免裂荚落粒。

种子收获后，要儲藏在干燥通风处，防止烟熏，以备来年种植。

白茅根

别名：茹根、地筋根、兰根。

土名：芽子草根、坚草根、甜草根、毛子草根。

来源与形态：屬禾本科，为多年生草本植物。叶丛生，茎高1至2尺。茎叶上生长毛，叶鞘平滑；茎端生白花穗，呈圓柱状有长白毛。其根茎較长，色白柔韌而有节，节生毛須，横生于地下。

产地：全省各地均产。

产季：在春、秋两季产新，以秋季質量最好。

采集与加工：药用其根。用鐮刨出后，去淨泥土及梗叶，晒干即可。刨采时，春季在苗高1至2寸时止；秋季在叶枯死后开始生产为宜。

規格質量：身干，肥壯，色白，条整齐，不帶毛須。

包装与保管：用席包装。儲藏时注意防潮。

性能：味甘，性寒。为涼血、消瘀、泻火、止血、利尿药。治一切吐血、衄血、血崩、血痢及黄疸、水肿等症。



1. 植物全形 2. 根 (药用部分)

白蘼皮

别名：白羊蘼、地羊蘼、白羶。

土名：好汉子拔。

来源与形态：属芸香科，为多年生草本，自生于山野地



1.带花的枝 2.根 3.蒴果 4.种子 5.雄蕊

带。茎高1至3尺，下部呈灌木状，上部分枝很多，全身有異味。叶互生，奇数羽状复叶，卵形至椭圆形，先端有短尖，边缘有細鋸齿。夏季頂生总状花序，花白色或淡紅色。花落后結蒴果五裂，内含种子2至3粒，色黑，近球形，有光澤。

主要产地：蔚县、龙关、兴隆、灤平和丰宁县，以及承德市。

产季：在夏、秋两季产新。

采集与加工：药用其根皮。刨出后去须根、泥土，用刀或破碗片刮净黑皮，然后用木棒砸皮离骨，抽出木心，将皮晒干即可。但要防止水洗，以免发霉变质。

规格质量：身干，条整齐，肉厚体肥，不带木心，无杂质。

包装与保管：用筐包装。储藏时放干燥通风处，防止受潮。

性能：味苦，性寒。治恶疮、疥癬，疗四肢不安等症。

白 果

来源与形态：属公孙科，为落叶乔木。高数丈，直立，分枝较多。叶扁圆作鸭脚形，通常分二裂，叶、脉平行，有长柄。夏季开淡绿色的小花，结杏状果实，成熟后呈淡黄色，果核有二棱或三棱，中有黄白色肉仁。秋末叶变色而脱落，霜降后果实成熟。

主要产地：易县、薊县、内丘、邢台和遵化县。

产季：在霜降产新。

采集与加工：药用其果仁。当成熟时，用长杆将果实打下，装入缸内，漚去肉质，再洗核果，晒干即可。

规格质量：个大，色白，外壳干，果仁成实，不霉烂。

包装与保管：用麻袋包装。宜放通风干燥处保存，防止返潮、发霉。

性能：味甘苦，性平。治痰喘、头晕、耳鸣、慢性淋浊及妇人带下。




1.枝叶 2.带花序的枝 3.果实 4.未展开的二花粉囊 5.雄蕊 6.药用外形

白 朮

别名：山藟、山姜、山连。

来源与形态：属菊科，为多年生草本植物。我省于1958年进行培种。茎直立，高尺许，根茎上部分枝很多。叶互生，呈广圆形或披针形，边缘有锯齿，尖锐如针，顶端生头状花序，花



1.花枝 2.筒状花 3.根茎外形

紫色或白色。其根茎成块状凹凸不平，表面淡黄色或暗黄色，新鲜根块断面呈乳白色，多汁液；干燥后表面皱缩，呈暗棕色或褐色。

主要产地：安国和新乐县。

产季：在霜降产新。

采集与加工：药用其根块。当白朮叶枯黄时，应选晴天并且土质稍干时（以根块不易带土）进行采收。刨出后剪去根块茎叶，晒干或炕干即可（如炕干注意炕一天后，必须间歇一天）。

规格质量：个大体肥，黄褐色，断面色白，有香味，身干无杂质。

包装与保管：用麻袋或筐包装。储藏于通风干燥处，夏季可用硫磺熏制，以防虫蛀。

性能：味微苦，性温。健脾利湿，补中益气。治浮肿，心腹胀满，止泻利，消足脛湿肿。

白苏子

来源与形态：属唇形科，为一年生草本。有香味，茎直立，高3至4尺，色绿，分枝很多。叶对生，有长柄，卵圆形，顶端略尖，边缘有粗锯齿。除基部外，遍体密生白毛。夏季开白色或微紫色的小花，呈总状花序，花苞无柄，卵形，基部宽圆形，花冠筒状，密生白毛。花落后结果，坚实，倒卵形，褐色或灰褐色，有网状皱纹。

主要产地：安国、定县、藁县、平山、宝坻、迁安和遵化县，以及秦皇岛市。

产季：在霜降产新。


采集与加工：药用其子。当种子成熟后，用镰刀割下，晒干打下种子即可。

规格质量：籽粒饱满，身干，无杂质，无虫蛀。

包装与保管：用麻袋包装。储藏于通风干燥处，防止受潮和虫蛀。

性能：味辛，性温。药用与紫苏相同。

注：白苏与紫苏的区别：此两种我省均有种植。白苏密生白毛而长；紫苏则茎叶仅有细毛，有时其茎近似无毛。白苏叶色绿，紫苏叶呈紫色。紫苏开红花，白苏多开白色花，也有的与紫苏同色。我省药用的白苏多是子，其叶、梗尚不习惯用，对紫苏则多用叶、梗。其种植方法与紫苏相同。



1.根 2.带花的枝 3.小坚果 4.种子

白曼陀罗

别名：曼陀罗、风茄子、山茄子。

土名：洋金花、重瓣洋金花、老鼠愁。

来源与形态：屬茄科，为一年生草本植物，自生在山野或培种。我省有白曼陀罗和毛曼陀罗两种。白曼陀罗茎圓直立，高3至5尺，基部木質化，表面光滑而带灰白色，上部灰綠色，多呈二歧分枝，幼枝短。叶互生，卵形至广卵形，先端尖，基部两侧不对称，边全緣，表面乳綠色，背面淡綠色，有叶柄。花单生于枝的分杈間或叶腋間，直立或斜，花柄圓柱形。花萼长圓筒状，黄綠色，花冠白色，开放呈喇叭状。花落后結蒴果，扁圓形多刺，內含有許多种子，淡褐色（图一）。毛曼陀罗基本与白曼陀罗相同，所不同的是毛曼陀罗全株密被短軟毛（图二）。

主要产地：易县、唐县、安国、青龙、兴隆、龙关、蔚县、涉县和邢台县，以及承德市。

产季：在6至10月間产新。

采集与加工：药用其花。清晨在花开放时，摘其花冠或連蒂摘下，曝晒八成干，捆成小把，再晒至足干。但最好当日晒干，以免发霉变质。

规格質量：身干不碎，色黄白，不霉，无杂质者較好。

包装与保管：用筐或箱包装。宜放干燥处保管，防止受潮。


性能：味辛，性温，有毒。为麻醉性鎮咳、鎮痛药。

附：种植方法

一、选地：白曼陀罗种植很简单，不占用好地，多在閑散空地或地边、宅旁种植，但喜潮湿。

二、播种：在春季化冻后，刨坑，深2寸，坑与坑相距4至5尺，每坑撒种子2至3粒，随即复土，并留一圓池，以便

浇水。苗高尺許，进行間苗(一穴一株)，适当追施糞肥 1 至 2 次，并經常保持土壤湿润，任其生长。开花后，要及时采下，供药用；否則即会結子。但应适当留种，以备繼續种植。



图一 1.带花的枝 2.蒴果



图二 1.带花的枝 2.蒴果

白 蕨 草

别名：白草、白根、猫儿卵。

土名：白葡萄蔓根、耗子枕头、山地瓜。

来源与形态：属葡萄科，为藤本植物。春季由宿根生茎，高3至4尺，茎枝平滑，叶有柄，互生，色青绿，三至五小叶，为羽状分裂，先端尖，边缘有粗锯齿。夏季叶柄边生出花梗，



1.带花的枝 2.生药外形

开五瓣淡黄色小花，作伞形花序，与叶对生。花落后结珠形浆果。其根部肥大，呈椭圆形或长椭圆形块状。

主要产地：易县、薊县、玉田、遵化、迁安、青龙、兴隆和灤平县，以及承德市。

产季：在春、秋季产新。

采集与加工：药用根块。因其根入地很深，須用鏟深刨，刨面要大些，以防伤根。刨出后去掉泥土，用刀刮去外皮，切成三、四片，晒干即可。

規格質量：身干，片整齐，粉白无杂质。

包装与保管：用筐或麻袋包装。夏季容易被虫蛀，应经常检查、晾晒，并防止受潮。

性能：味苦，性平。为止痛消肿药。治疗疮及妇女赤白带下等症。

白芥子 附：黄芥子

别名：胡芥子、蜀芥子。

土名：芥末子。

来源与形态：属十字花科，为一年生草本。茎高1至3尺，叶丛生有长柄，微呈羽状分裂，长椭圆或披针形，略带粗毛，有短柄，全缘或有缺刻。初夏茎顶开淡黄色的四瓣小花，作总状花序，花落后结2至3寸长的荚果、细瘦，内有种子约20余粒，色白或黄白色，大如小米粒，有光泽。黄芥子的形状比白芥子略小。

主要产地：安国、围场、丰宁、龙关、兴隆、蔚县、邢台和内丘县。

产季：在夏季产新。

采集与加工：药用其种子。成熟后，用镰刀割下全株晒干，然后用木棒打或用手搓出种子，去净杂质、砂土即可。

規格質量：籽粒饱满，色白或黄白色，无杂质，身干者佳。

包装与保管：用麻袋包装。储藏时放干燥通风处，防止受潮。

性能：味辛，性温。为利气、祛痰、通经络、散风止痛药，中毒后服之催吐。治风痛、消散痈肿或瘀血等症。




1.带花的枝 2.果实 3.叶子 4.生药外形

白 薇

别名：春草、薇草。

土名：山烟。

来源与形态：属蘿藦科，为多年生草本植物，自生于山野



1. 带果实的茎叶。 2. 生药外形

地带。茎直立，叶对生，呈卵状椭圆形，有短叶柄，茎叶有灰白或白色毛茸。夏季由茎顶端或叶腋间开紫黑色的五瓣小花，为穗状花序。花落后结锥形果实，内含有种子。其根细长而多，呈黄褐色。

主要产地：易县、蔚县、迁安、薊县、遵化、青龙、兴

隆和灤平县，以及承德、秦皇島市。

产季：在春、秋两季产新。

采集与加工：药用其根。用鐮将根刨出后，去掉蘆头及泥土，晒干即可。

規格質量：黄白色，身干，根条整齐，坚实，无杂质者佳。

包装与保管：用筐或席包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味苦，性平。为解热利尿药，治四肢浮肿、肺热、咳嗽等症。

白扁豆

别名：蛾眉豆、沿篱豆。

土名：小白鞋。

来源与形态：屬豆科，为一年生草本植物。茎蔓互生，长丈许。叶互生，为三出复叶，小叶卵圆形，先端短尖。夏季在叶腋间抽出花梗，开白色或淡紫色的蝶形小花，呈总状花序。花落后结扁平的荚果，如镰刀状，内含种子数枚，扁椭圆形，黄白色。

主要产地：平山、正定、邢台、涉县、内丘和平泉县，以及承德、石家庄市。

产季：在寒露至霜降产新。

采集与加工：药用其种子。成熟后，用镰刀割下茎蔓，晒干，将种子打下去皮即可。

規格質量：籽粒饱满，色白，无土，无杂质及虫蛀者佳。

包装与保管：用麻袋包装。保管时放干燥通风处，夏季须经常晾晒，防止虫蚀。

性能：味甘，性平。健脾化湿。治食物中毒、霍乱吐泻。




1.带花的枝 2.果实 3.种子 (药用部分)

白 屈 菜

别名：地黄连、牛金花。

来源与形态：属罂粟科，为多年生草本，自生于山野。茎直立，高2至3尺，分枝很多，嫩紫色，全株有白色细长软毛，质脆，折断后有黄色汁液。叶互生，一至二回羽状分裂，小叶近似对生，上叶比下叶大，顶端小叶广卵圆形，裂片呈钝锯齿，基部相连，叶表面绿色无毛，背面粉白色有软毛，但老叶较少。夏季茎顶或叶腋间开黄色小花，呈伞状花序。花落后



植物的上部形状

結綫狀圓柱形蒴果。

主要产地：蔚县、易县、涞源、邢台、内丘、迁安、青龙、

平泉、隆化和灤平县，以及承德、秦皇島市。

产季：在5至7月間产新。

采集与加工：药用其全草。用镰刀靠地面将全株割下，阴干即可。

规格質量：全草身干，色青綠，不霉无杂草。

包装与保管：扎捆后外面包席。儲藏于干燥通风处，并防止受潮发霉。

性能：味苦，有毒。为鎮痛药。治腸胃疼痛，外用治疥癬、消肿毒。

瓜 萹

附：瓜萹皮、瓜萹仁、天花粉


别名：天瓜、地萹、萹根。

来源与形态：屬葫蘆科，为多年生蔓性草本。春季由根部生出蔓茎，一年生分枝长数丈。叶互生，呈心脏形，为三至五掌状深裂，先端尖，色綠，生有細絨毛，叶腋間生卷須，借以纏繞它物。花分雌雄，7月間由叶腋开花，有长柄，密布軟毛，花冠白色，花落后結卵圓或广橢圓形的果实。幼时色青如瓜，成熟后呈黃褐色，光滑。果内肉質，有許多种子，长橢圓形，扁平，淡黄色至黃白色，边缘，全身光滑，就是药用“瓜萹仁”。多年的根，經年久长成块状，色白，有粉質，就是药用“天花粉”。干燥的果皮就是药用“瓜萹皮”。

主要产地：安国、定县、唐县、易县、邢台、內丘、涉县、南宮、大名、永年、宝坻、薊县和吳桥县，以及石家庄、承德市。

产季：全瓜萹在霜降后采收；天花粉在春、冬两季刨采。

采集与加工：全瓜萹在霜降后皮变成紅黄色即已成熟，可摘收；霜降后未成熟的也应摘下，均挂在墙上或房檐下，晾干，并要經常翻动，以防变质。至第二年春季干燥后，供药



1.带果实的枝 2.生药外形

用。摘收时，如有破瓜萼，应随时用剪刀剪为两瓣，掏出瓢子和种子，然后用水把种子洗出，晒干即为瓜萼仁。去掉瓢和子的瓜皮，晒干后即为瓜萼皮。其秧根成熟后（约3至4年），用鎬深刨，取出肥壮、色白、粉足的根块，截成3至4寸长，去皮切成三、四瓣的片状，晒干（防止冻坏）即为药用天花粉。

规格质量：全瓜萼，个大不破，色红黄，有糖质，身干，无瓜柄。瓜萼仁，籽粒成实，色灰褐，身干无杂质及秕仁。天花粉，身干，色白，肉厚，粉质大。

包装与保管：全瓜蒌，用筐装。但因其含糖質易受虫蛀，夏季应多晾晒，并将破裂果皮拣出，防止虫害蔓延。瓜蒌皮，用筐或席包装。夏季应經常晾晒，以免受潮。瓜蒌仁，用麻袋包装。宜放通风干燥处保管，并防止受潮。天花粉，用麻袋包装。因其易受虫蛀，夏季应多曝晒。

性能：全瓜蒌味甘苦，性寒。潤肺、降火、利大腸，治咳嗽、消痛肿；瓜蒌仁泻火、潤肺，又为祛痰、鎮靜药；瓜蒌皮寬胸、祛痰、止咳、祛风热；天花粉性寒，味苦。泻火潤燥，生津止渴，亦为排脓、生肌、消肿药。

附：种植方法

一、选地：瓜蒌对土壤要求不严格，一般多在地边、宅旁、树旁和院落培种；不适合硷地生长。

二、栽植：瓜蒌多用种根栽植，将第一年播种的根仍留在原地越冬。翌年清明左右选择墙根或树旁挖坑，深1尺左右，施入基肥，然后将越冬的根茎刨出（长1至2尺），切成4至5寸的小节栽在坑内，复土2寸厚，随即浇水，約一个月后即发芽出土。

三、管理：瓜蒌是爬蔓植物，多纏繞它物上升。苗高1尺左右时，搭架或立杆引蔓至树上或墙上，以便使其生长，并及时浇水，尤其結果后应多浇水、除草。苗高2尺左右追肥，在离根部2寸的地方，挖一圓形沟，深3至4寸，然后将肥施入沟内盖土埋好，随即浇水，促使其分解。瓜蒌第一年只开花不結果实，第二年才开始結果，三、四年后才能刨根块，为“天花粉”。

四、收获：在霜降前后摘收，其具体方法与前相同。

注：瓜蒌多用种根栽种，因此，必須注意种根的繁殖。春季整地深翻2尺左右，适当施粪肥并翻入土内，作为基肥，然后把畦整平，将种子撒播畦内，复土浇水。当苗高1尺左右，为使根部发育，即剪掉秧苗，这样連續一年，第二年刨根栽种即可。

半夏

别名：守田、水玉、和姑。

土名：捉嘴豆子、地巴豆。

来源与形态：属天南星科，为多年生草本植物，自生于山野或栽植于园地里。

我省已进行种植。春季由宿根生叶，为三出复叶，小叶卵圆形，全缘，叶端尖，有长叶柄。叶柄下部内侧生珠芽或小块茎（俗称肉芽）。夏初由叶腋间抽出花柄，上部为肉状花序，外生黄绿色佛焰苞，花序顶端细长，呈鼠尾，伸出苞外，果实为浆果。其地下根块呈球形或扁球形，褐色，去皮后，色白，有粉状。

主要产地：安国、涞源、易县、唐县、阜平、青龙、昌黎、迁安、平山、正定、邢台、内丘和涉县，以及石家庄、唐山市。

产季：在春、秋两季产新，以春产质



1. 植物全形 2. 生药外形

量好。

采集与加工：药用其根块。用鐮刨出后，去掉上部残茎及下部須根，洗净泥土，装于条筐内浸水中，以竹扫帚头擦去外皮，或撞去外皮，至色白为止，然后晒干，用硫磺熏制。但半夏有毒，加工时应带手套和口罩。如有中毒现象，可用甘草水洗，即解其毒。

规格质量：身干、质坚实，色白，无老皮者佳。

包装与保管：用麻袋包装。放通风干燥处，防止受潮。

性能：味辛，性平，有毒。为燥湿化痰，降逆止呕药。治咳嗽上气，头痛不眠等症。生用外敷治痈肿。

玉 竹

别名：女萎、烏女、烏萎。

土名：白鷄。

来源与形态：属百合科，为多年生草本植物，自生于山野阴湿地方。根茎横生，須根很多。春季由根抽茎，直立，高1至2尺。叶互生，淡绿色，长椭圆形，先端尖，全缘无锯齿。夏初在叶腋间开绿白色钟状小花，下垂如铃铛。花落后结球形小浆果，成熟时暗紫色。

主要产地：灤平、青龙、丰宁、洮源、易县、唐县、阜平、兴隆、遵化、薊县、龙关、蔚县、内丘、涉县、平山、新乐、正定和邢台县，以及承德、秦皇島市。

产季：在春、秋两季产新。春季从化冻起至谷雨止。秋季由立秋开始至秋分止。

采集与加工：药用其根茎。用鐮刨出后，去净須根，晒至倒浆，用筐（筐棹向外，里面光滑）溜一遍，溜去毛土即可。溜时宜轻，以免撞伤出浆。然后分别等级，晾在席上，用手搓。头遍要轻，避免破皮或折断，搓完再晒，这样反复搓晒，一遍比一遍加重，搓到没有硬心时止。晒干后再用筐溜一遍，待外皮发白透明时，即可分别包装。



1.果枝 2.根 3.生药外形

規格質量：一等長1寸5分以上，粗（直徑）1寸5分以上；二等粗（直徑）1寸5分以下，長度不限。

以上均為身干整齊，肥壯漿足，色黃白、透明光亮，無干疤，不返油。

包裝與保管：用筐包裝。儲藏于干燥通風處，并經常檢查，以免受潮。發現回潮，要及時晾曬；曬後須再用筐撞一遍，重新裝筐。

性能：味甘，性平。潤燥、補氣血、祛風濕。為治風濕性腰痛藥；又可制酒、造糖。

玉蜀黍須

別名：玉米須。

土名：棒子毛。

來源與形態：屬禾本科，為谷類一年生草本植物。莖高7至8尺，葉長而大，互生，披針形。夏季由莖頂生雄花序，由葉腋間生雌花序，花軸多肉，呈穗狀，有許多苞片包被。花柱如長毛，吐出苞外，色綠白、粉白或紫紅色，細長如須。

產地：全省各地均產。

產季：在夏、秋季間產新。

採集與加工：藥用玉蜀黍須。一般在玉米上漿時，將吐出的毛須採下，曬干即可。

規格質量：身干，色黃白至黃褐，無雜質者佳。

包裝與保管：用席包裝。保管時宜放干燥通風處，并防止受潮。

性能：味甘，性平。為利尿藥。治腎臟疾患，水腫性腳氣，浮腫性疾病。蘇聯用其作利胆劑。



1.带雄花序及雌花序的茎叶 2.果实 3.药用部分

玉簪花

别名：白鹤仙。

土名：白玉簪、白玉针、玉针棒。

来源与形态：属百合科，为多年生草本。一般多在庭院栽植，



1.根叶 2.花莖 3.花冠

供观赏。茎高1至2尺。春初叶由根丛生，叶大有光泽，色绿、卵圆形，有长柄。夏季叶间抽圆茎，茎上部开白色或淡紫色的花，呈总状花序，花冠漏斗状，其味颇香。

产地：全省各地均产。

产季：在6至8月间采集。

采集与加工：药用其花。当其花欲开放时采下，晒至五、六成干，捆成小把，再晒至足干即可。但玉簪花有毒，严防用口尝。

规格质量：花干，色白，纯净，完整不碎。

包装与保管：用筐包装。储藏时宜放干燥通风处，防止受潮或发霉。

性能：味甘，性寒，有毒。绝胎妊、散肿毒。但作汤剂不可沾牙，以免损齿。

石 花

来源与形态：属藓苔科，附生于岩石上。鲜的翠绿色，全身为平展的薄片状，成多数不规则杈状分裂。晒干后上面呈棕黑色，背面呈白色。

产地：全省山区均产。

产季：一年四季均可采收。

采集与加工：药用其全身。石花由于附生于岩石上，可用铁锤将其锤下，去净泥土、杂质，晒干即可。

规格质量：身干，整齐不碎，灰绿色或灰白色，无泥土及杂质。

包装与保管：用席包装。保管时宜放干燥通风处，并防止受潮。

性能：味甘，性寒。为清热、利尿、补血、明目、益精、增髓、化痰药。



原形放大

石 葦

别名：石兰、石皮。

来源与形态：屬水龙骨科，为多年生草本，常生于岩石上。根茎横生，外披茶、褐色的鳞片及須根。叶生在根茎上，高5寸至尺許，有长柄，叶片較厚，长椭圆形或披針形，长短不一，全緣，表面暗綠色，背面密布褐色粉状物，往往叶緣向上而卷。

主要产地：易县、涞源、唐县、薊县、遵化、迁安、平泉、兴隆、内丘、涉县、邢台、蔚县、怀来、平山和新乐县，以及张家口、承德市。

产季：在夏、秋两季产新。

采集与加工：药用其全草。用镰刀或手采下，去根，晒干即可。

规格質量：身干，青黄色，梗、叶整齐，无杂质。

包装与保管：用席包装。保管时宜放干燥处，并防止受潮发霉。

性能：味辛，性平。消湿热，通淋闭。治淋病，小便出血等。



植物全形

石 榴 皮

来源与形态：屬石榴科，为落叶乔木。春季生叶，长椭圆形，边全緣，有光澤。夏季开紅色的小花，花落后結球形果实，前端有萼冠，里面有不整齐的肉紅色种子。分酸、甜两种。

主要产地：涉县、安国和邢台县，以及承德市。

产季：在9至10月間产新。

采集与加工：药用石榴皮。成熟后，将皮收集起来，晒干即可。

規格質量：身干，色赤褐，片整齐，无子，不霉者佳。



1.带果实及花的枝 2.果实 3.种子 4.药用部分

包装与保管：用席包装。放干燥处保管，防止受潮发霉。

性能：味酸，性温。为驱除绦虫、蛔虫药；又为收敛止痢药。

仙鹤草

别名：金顶龙芽草。

来源与形态：属蔷薇科，为多年生草本，自生于山野潮湿



植物全形

地方。茎高2至3尺，圓形，有毛，色綠，略具條紋。葉為奇數羽狀復葉，有托葉。大葉片長倒卵形；小葉片橢圓形，邊緣有深鋸齒，兩面皆密生長白毛；葉大小不等，莖中部以上葉片較大。夏季開黃色小花，生於莖端，呈總狀花序，長約尺許，花柄短。八月結果實，大如黍粒，外面密生刺毛。

產地：全省山區均產。

產季：在5至7月產新。

採集與加工：藥用全草。用鐮刀割下全株，去淨雜草、陰干即可。

規格質量：莖葉色綠，無老根，身干不霉。

包裝與保管：扎捆外面包席。放干燥處保管，防止受潮。

性能：味苦，性微溫。治吐血、咯血、結核瘰癧、腸風下血、崩痢、帶下。并可提取仙鶴草素，為止血藥。

刘 寄 奴

別名：陰行草、罐兒茶。

土名：野芝麻。

來源與形態：屬玄參科，為一年生草本植物。莖高1至2尺，直立，上端往往分枝。葉對生，羽狀分裂，有葉柄，葉面有細毛。秋季莖枝頂端及葉腋間生有黃色唇形花，萼筒甚長，外表有明顯縱稜，頂端五裂。花落后結果實，呈紡錘形。

主要產地：青龍、平泉、灤平、內丘、邢台、涉縣、涞源、易縣、阜平、唐縣、薊縣、遵化、遷安和昌黎縣，以及承德、秦皇島市。

產季：在秋季採收。

採集與加工：藥用其全草。用鐮刀割其全株，晒干即可。

規格質量：莖葉齊全，不帶根，黑褐色，身干無雜質。

包裝與保管：扎捆或用席包裝。存放時勿使受潮。

性能：味苦，性溫。為破瘀、活血、通經藥。療金瘡，治產後余疾。




1.带花及果实的叶茎 2.花

冬瓜子 附：冬瓜皮

别名：冬瓜仁、瓜蒌子、结瓜子。

来源与形态：属葫芦科，为一年生蔓性草本。全体有毛针，茎长略粗，近似方形，有分枝的卷须，缠绕它物。叶呈心脏形，前端尖，互生，有长柄，叶片作掌状浅裂，通常有五裂片，边缘有锯齿。花单生于叶腋，色黄。果实为瓠果，球形或长圆形，幼时绿色，表面密生针毛。肉厚而纯白，中空。沿瓤肉着生许多种子，卵形，平滑，一端较狭而扁平，色白。

产地：全省各地均产。



1.带花的枝 2.果实 3.皮 4.药用部分

产季：在8月間产新。

采集与加工：药用其种子和瓜皮。把熟冬瓜的綠皮削下，挖出种子，晒干即可。

規格質量：冬瓜子身干，籽粒飽滿，色白，无瓤；冬瓜皮色綠，不碎，身干无杂质。

包装与保管：冬瓜子用麻袋装，冬瓜皮用席包装。保管时宜放干燥处，夏季勤晾晒，防止受潮。

性能：冬瓜子味甘，性平。为清热、利湿药；冬瓜皮利湿热，消水肿。

龙 葵

别名：苦葵、苦菜、天茄子、天泡草、水茄、老鴉酸浆草、老鴉眼睛草。

土名：野茄子、黑姑娘。

来源与形态：屬茄科，为一年生草本。茎直立，有棱角，高2至3尺。叶互生，卵形，頂端尖，全緣或微成波状疏齿。夏季于叶腋間开白色五瓣小花，呈伞形花序。果实小，为黑色球形浆果，大如豌豆，种子扁圓形。

产地：全省各地均产。

产季：在夏季采集。

采集与加工：药用其全草。用镰刀将全株割下，晒干即可。

規格質量：全草，身干，无杂质。

包装与保管：扎捆，外面裹席。保管时宜放干燥处，防止受潮。

性能：味苦，微甘，性寒，有小毒。为利尿消毒药，并用作避倦防睡药。外用敷痈肿及跌打损伤、丹毒等症。




1.带果实及花的枝 2.根

地榆

别名：玉鼓、酸赭、玉扎、野升麻。

土名：山红枣根（张家口）、黄瓜香秧根（承德）。

来源与形态：属蔷薇科，为多年生草本，自生于山野向阳



1. 植株的一部分及花枝 2. 花 3. 药用部分

的地方。茎直立，高3至4尺左右，上部多分枝。叶为奇数羽状复叶，小叶长卵形，边缘有粗锯齿。初秋开暗紫色小形花，集成长圆形短穗花序。果实为瘦果，卵形，有四棱，种子细小棕色。其根圆柱形，肥大，老时多分杈，外皮粗糙紫黑色。

产地：全省山区均产。

产季：春、秋两季刨采。

采集与加工：药用其根。用镐刨出根后，去掉残茎及泥土，拣去枯朽老根，晒干即可。

规格质量：条大整齐，质坚实，外皮暗褐色，断碴黄褐或黄色，无须根、芦头及杂质。

包装与保管：用筐包装。宜放通风干燥处，防止受潮。

性能：味苦，性微寒。为凉血、止血、收敛药。用于吐血、下血、咯血、赤痢、月经过多等症。

地骨皮

别名：苦杞、地仙、仙杖。

土名：野枸杞、红榴榴科。

来源与形态：属茄科，为落叶灌木，自生于山野或道旁。茎高2至3尺。叶互生，椭圆形顶端尖，全缘，有短叶柄。花数朵丛生于叶腋间，紫红色，有细长花柄。果实为浆果，卵圆形，初生时青色，成熟后转红色。

主要产地：定县、阜平、唐县、易县、邢台、内丘、涉县、怀来、蔚县、乐亭、迁安、平山和正定县，以及唐山、承德市。

产季：在春、秋两季刨采。

采集与加工：药用其根皮。用镐刨出根后，去残茎及泥土，趁湿以木棒砸之，使皮与木质硬心脱离，剥皮晒干即可。

规格质量：片大肥厚，外表面粗糙呈黄棕色，里面灰褐色。有细顺纹。整齐不碎，去净毛根和木质硬心。

包装与保管：用席包装。宜放干燥处，防止发霉生虫。

性能：味苦，性寒。清虛熱，除骨蒸，用作清涼解熱藥。

注：地骨皮為家種枸杞的根皮。但為了保護枸杞果的收穫，供藥用。因此，我省地骨皮多用野枸杞的根皮，并有數十年的銷售習慣。



1.帶花的枝葉 2.藥用部分

地肤子

别名：地葵子、地麦子。

土名：扫帚子。

来源与形态：属藜科，为一年生草本。茎高3尺左右，分



1. 带花的枝叶 2. 果实 3. 药用部分

枝很多。叶互生，无柄，狭长披针形或线形，顶端尖。夏季枝梢及叶腋间生出花穗，花小、色黄绿。花落后结果，扁平，膜质状。

产地：全省各地均产。

产季：在秋季采收。

采集与加工：药用其果实。成熟后拔其全株，晒干，收集种子，去掉杂质。

规格质量：籽粒成实饱满，黄褐色无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。保管时宜放通风干燥处，防止受潮。

性能：味苦，性寒。清热、利水。治淋病、脚气水肿。

百 合

土名：山丹花、大红花。

来源与形态：属百合科，为多年生草本，自生于山野中。在地下有呈洋葱形的片状鳞茎；地面上的茎直立，高2至3尺。叶互生，长披针形或线形，有短叶柄。夏季于茎梢簇生或单生红色或白色花，花瓣长披针形，顶端微微反卷，雄蕊六枚，雌蕊一枚。花落后结蒴果，三室包许多种子，种子膜状椭圆形至三角形，黄褐色。

主要产地：易县、唐县、涞源、阜平、涉县、邢台、内丘、蔚县、怀来、隆化、龙关、张北、元氏、平山、正定、新乐、青龙、兴隆、平泉和灤平县，以及承德市。


产季：在秋季收籽后刨采。

采集与加工：药用其鳞茎。用镐刨出后，去残茎、须根及泥土，将鳞片剥开，装入籠屉蒸熟。取出后当日晒干或烘干（阴天不要加工，防止因不易干燥而发霉变质）。

规格质量：色白肉厚，无黄色斑点，瓣整齐不碎。

包装与保管：用麻袋包装。宜放通风干燥处，防止发霉变质；夏季以硫磺熏制，防止虫蛀。

性能：味甘，性微寒。潤肺、補胃、清心、止痛。專治虛火癆嗽。



1. 帶花的莖葉 2. 果實 3. 根塊 4. 生藥外形

老 鸛 草

别名：五齿耙。

土名：老鸛嘴。

来源与形态：屬牻牛兒苗科，为一年生草本，多生于山野道旁。全体密生长絨毛，茎高1至2尺。叶对生，三回羽状分裂，小裂片綫形，全緣，有长叶柄，叶柄基部有膜質托叶。夏季在枝梢开紫色五瓣小花，呈聚伞花序。花落后結蒴果，頂端



带果实的枝叶

有尖长的嘴状突起似鸚嘴，故有“老鸚嘴”之称。

产地：全省各地均产。

产季：在6至7月間采集。

采集与加工：药用其全草。当其成长于半花半籽时，用镰刀割其全株，除去杂草，晒至八成干时捆成小捆，再晒至足干即可。

规格质量：身干不霉，茎叶俱全，青绿色、无根及杂草者佳。

包装与保管：扎捆，外面裹席。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：性平，味苦辛。能祛风、疏经、活血、健筋骨、通经络。

艾 叶

别名：艾蒿、艾绒。

来源与形态：属菊科，为多年生草本。全体有软毛，揉之有香气。茎直立，高2至3尺，多分枝。叶羽状分裂，裂片卵形，叶背面密生灰色绒毛，边缘有粗锯齿或浅裂。秋季开淡褐色小花，呈头状花序，作圆锥状排列。

产地：安国、邢台和巨鹿县均有种植；其他各县也有野生。

产季：在5至6月間产新。

采集与加工：药用其茎叶。当未开花时，用镰刀靠近地面割其全株，将叶捋下，叶与茎分别晒干即可。

规格质量：色灰白，质柔韧，有香气，纯净者佳。

包装与保管：用席包装。保管时宜放干燥通风处，勿受潮湿。

性能：性温，味苦。能温气血，逐寒湿，调经安胎、止诸血。为缓和性的通经药，又为驱虫、解热药。



1. 莖叶 2. 花序

西瓜皮

别名：翠衣。

来源与形态：屬葫蘆科，为一年生蔓性草本。有卷須，借以纏繞它物。叶互生，有柄，羽状分裂，各裂片又有深缺刻。夏季腋生黄色合瓣花，单性，瓠果形大，球形或椭圆形。盛

夏成熟，果肉紅色或黄色，种子扁卵形，黑色、黄色或紅色。

产地：全省各地均产。

产季：在秋季收集。

采集与加工：


药用其果皮。将成熟果实剖开，挖去瓤，然后切成薄片晒干即可。

规格质量：片薄，不带瓤，色黄綠，身干不霉。

包装与保管：

用麻袋或筐包装。宜放干燥通风处。

性能：味甘，性寒。清肺胃，解暑热，除煩、止渴、醒酒，疗喉痹、口疮等症。



1. 西瓜形状 2. 瓜籽瓜瓤 3. 药用部分

問 荆

别名：接續草、笔头菜。

土名：节节草。

来源与形态：屬木賊科，为多年生草本。地下茎細长横生。茎又分营养茎与孢子茎两种：营养茎綠色，細长，圓柱形，有节，外表有縱直浅沟，节上輪生細枝；孢子茎（果茎）頂端生笔头状孢子囊穗，由許多孢子叶組成，叶下面有孢子囊。

产地：全省各地均产。

产季：在5至7月間采集。

采集与加工：药用其全草。用镰刀将全株割下，阴干即可。

规格質量：全草，不带根及杂草，身干色綠。

包装与保管：扎捆后外面裹席。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味苦，性平，无毒。为止血药。治各种出血，如鼻衄、月經过多、腸出血、咯血、痔出血等，煎剂內服。



植物全形


注：苏联将問荆用作利尿剂，作为“利尿茶剂”的組成成分。制剂有問荆疏浸膏。

南蛇藤

别名：果山藤、药狗旦子。

土名：合欢花。

来源与形态：属卫矛科，为落叶攀援灌木。高达丈余，多分枝。单叶互生，老时带革质，圆形至椭圆形，边缘有紧密钝锯齿，顶端突尖，有叶柄。夏季于叶腋间开淡黄色小花，排列呈短聚伞花序。果实为球形蒴果，带黄色，熟则三裂，露出种



1.带果实的枝 2.果实

子。种子为卵形或椭圆形，外包有肉质红色假种皮。其蒴果（含种子）称合欢花，供药用。

主要产地：青龙、平泉、灤平、易县和滦源县，以及承德市。

产季：在秋季采集。

采集与加工：药用其果实。成熟后，将自落或用竹竿打下的果实收集起来，拣去杂质，晒干即可。

规格质量：整齐，红黄色鲜艳，干燥，无杂质。

包装与保管：用席包装。夏季多晾晒，放干燥处，防止虫蛀及受潮发霉。

性能：性平，味甘。调心脾、续筋骨。用治跌打损伤药，又为消散肿痛药。

血 見 愁

别名：地锦草、地肤、夜光、承夜、草血竭、血风草、馬螳草、雀兒臥蛋、酱瓣草、獼猴头草。

土名：地锦。

来源与形态：属大戟科，为一年生草本，自生于田野庭院的小草。茎自根部分枝，平卧地面。赤红色，折断有白汁流出，叶对生，小椭圆形。夏秋之间于叶腋开黄褐色小花，花落后果实黑色。

产地：全省各地均产。

产季：在6至7月间收割。

采集与加工：药用其全草。用镰刀紧贴地面将其割下，晒至八成干捆成小把，再晒至足干即可。

规格质量：整齐，不散，身干不霉，纯净。


包装与保管：用席包装。宜放干燥处保存，防止受潮霉烂。

性能：性平，味辛。治女子阴疝、血结、经闭不通。

列 当

别名：栗当、草蓂蓉。

土名：鬼見愁、独根草、兔子拐棒。



植物全形

来源与形态：屬列当科，为一年寄生草本植物，生于山野半砂石地带。春季生苗，茎呈肉质状，形似松塔，高 6 至 7 寸，独茎。茎上端生短叶，作鳞片状，晒干为紫褐色。

主要产地：蔚县、龙关、易县、涞源、唐县、阜平、兴隆、隆化、丰宁、青龙、围场、平泉和滦平县，以及承德市。

产季：在春、夏季間采收。

采集与加工：药用全草。将全草拔下，晒至八成干捆成小把，再晒至足干即可。

规格质量：全草身干，紫褐色，整齐不霉，无杂质。

包装与保管：用筐包装。宜放干燥通风处，防止受潮。


性能：味甘，性温。治五劳、七伤、补腰肾和治神经错乱等症。

沙 参

别名：北沙参、山沙参。

土名：海沙参。

来源与形态：屬伞形科，为多年生草本，分野生与家种两种。家种：根细长多肉质，直生地下。顶端有短茎头（根茎），



图一 1.植物全形 2.花 3.果实 4.生药外形

外皮带黄色。茎甚短，露出地面约2至3寸。叶互生，为一至二回三出复叶，小叶又呈羽状深裂，裂片倒卵形，边缘有锯齿，有长叶柄，基部宽略成鞘状。夏季于茎顶密生白色小花，排列成复伞形花序。果实为蒴果，倒卵形，外表有数条纵棱。（图一）野生（山沙参）：根细长，多肉质，直生地下。叶自根部丛生，二回羽状复叶，小叶又呈羽状深裂，裂片细小，有长



图二 1.植物全形 2.生药外形

柄，似胡蘿蔔秧。随后于叶腋間抽出高1至2尺的茎，分許多小杈。夏至前后于枝梢开白色小花，呈伞形花序，花落后結蒴果，灰褐色，形似茴香子而小（图二）。

主要产地：家种产迁安县和秦皇島市；野生产元氏、平山、正定、丰宁、内丘、盐山、薊县、玉田、遵化、涿源、阜平、唐县和易县，以及北京、石家庄、唐山市。

产季：在春、秋两季刨采。

采集与加工：药用其根。用鎬从参側面深刨、寬刨，以

防止折断。刨出后，去茎叶，洗净泥土（經水洗的参必須当日加工），选择晴天进行加工。将参按粗細分別浸入开水鍋內約5至6分鐘，待水再开时，捞出放入凉水缸內，然后一根根的去皮。去皮时，先将粗头剥开一点外皮，再从参头部往下捋去外皮，然后放席上晒至八、九成干时，捆成2至3两的小把，再晒至足干，即为毛条沙参。如晒至八、九成干再用小刀刮去外表粗糙部分，使其光滑，按枝条长短分別捆成小把，再晒至足干即为光条沙参。

規格質量：一等长8寸以上；二等长6寸以上；三等在6寸以下。均以条細长，質充实，色白，純淨者为好。

包装与保管：用箱包装，內垫紙，并封閉严密。夏季需勤晾晒，以免受潮。

性能：味苦，性微寒。清肺火、养胃阴、除虛热，治咳嗽。人参为补五脏之阳，而沙参为补五脏之阴。

附：种植方法

一、选地与整地：沙参是深根作物，适于在沙質土壤种植。于小雪前将土地深翻2至2.5尺（越深越能增产），并把石头、杂草拣出（利于根长的长而光滑不分杈），随后将土地整成中間高两边低的形状，以便雨多时排水，防止烂根。

二、施肥：用圈肥、草粪、綠肥和餅肥均可，每亩約五千斤。将肥料細撒到地里，并結合深翻，翻入土中，以供沙参生长前期的需要。沙参生长期較长，一般得一、二年，因此在生长期間还必须施追肥（以臭水、草木灰或过磷酸鈣等肥为主）。

三、播种：一般在小雪前几天播种。因冬播比春播出苗齐，能抗旱，幼苗生长旺盛；但种植不要过早，过早，年前出苗早，易遭晚霜危害。如春播可在化冻后提早播种，借冬墒使其早出苗。播种多以寬壟条播，深2寸左右，行距5寸。沙土地稍播深些，可以抗寒、抗旱或抗风，出苗齐，但亦不宜过深，因过深会影响出苗。每亩播种量15至16斤，土質不好的地要多

播3至4斤种子，以免缺苗，播种后复土盖平。

四、田间管理：地里有草，应及时用手拔掉，不宜锄草。因行距近，容易使沙堆于基部，烫死参苗。

五、收获：有春参与秋参之分。春参是在春季化冻播种，至第二年入伏前收获；秋参是在小雪前播种，第二年秋叶枯死后收获。

六、育种：育种是发展生产的关键。因此，在刨参时，挑其细小的植株（长5至6寸），移栽在肥沃土地里（先将留地浅耕整平），按行距1.5尺，株距8寸、深8寸的小穴坑，并施基肥（亩施粗肥5,000斤左右）。然后将秧栽入穴坑内，复土埋严踩实，然后浇水。第二年夏季开花结子。种子储藏于通风干燥处，防止烟熏，以免影响发芽。

赤 芍

别名：芍药。

土名：山芍药、芍药花根。

来源与形态：属毛茛科，为多年生草本，多自生于山野。茎高2至3尺。叶互生，二回三出复叶，小叶又作二至三次深裂，全缘。花单生于枝端，花瓣红色或白色。其根肥大，长圆柱形，分枝少，外皮粗糙紫褐色。

主要产地：围场、丰宁、张北、蔚县、龙关、易县和涞源县。

产季：在春、秋两季刨采。

采集与加工：药用其根。用镐刨出根后，去掉残茎及须根，摊薄晾晒至六、七成干，捆成枕头形小捆，架起来再晒至足干即可。

规格质量：条肥均匀，质坚实，外皮赤褐色，无须根，断碴有白色粉性。

包装与保管：用筐包装。赤芍受潮易变质，须勤检查，捣碎晾晒。



藥用部分

1. 带花的枝 2. 生药外形

性能：性平，味苦。为散瘀、活血药。

注：山榆根与赤芍类似，常与其混淆。其不同处是：赤芍质坚脆易折断，断面平整，色白有粉性；山榆根质虽坚脆，但断面柴性、黄褐色。

皂 角 附：皂角刺

别名：悬刀、角针。

土名：皂针、山皂角。

来源与形态：属豆科，为落叶乔木，自生于山野或园地。



1.带果实的枝 2.皂角刺

高2至3丈，枝有锐刺。叶为羽状复叶，小叶卵圆形或椭圆形，全缘，顶端尖圆，有短柄。夏季于叶腋间开淡黄色蝶形花，呈总状花序。果实为长圆扁平之荚果，两端微弯，内有种子十余粒，椭圆形，表面光滑，棕黄色。

主要产地：安国、邢台、平山、青龙、兴隆和灤平县，以及石家庄、秦皇岛市。

产季：在霜降前后采集。

采集与加工：药用其果实（皂荚）及锐刺（皂角刺）。用竹竿将果实打下，再用镰刀割下皂刺，晒干即可。皂刺为了便

于包装，多切成一分厚的縱直薄片（即皂刺片）。

規格質量：果实成实，棕褐色，无虫蛀，純淨；皂刺片身干不碎，不霉，无杂质。

包装与保管：用席包装。夏季应經常晾晒，防止生虫。

性能：皂荚味辛，性温。为强烈之祛痰药。治淋疾，有利尿杀虫之效。皂角刺，治療癰恶疮。

谷 芽

别名：粟蘖、粟芽。



1.带果实的茎叶 2.生药外形

来源与形态：屬禾本科，为一年生草本。茎高3至4尺，直立，基部多分枝。叶互生，狭长呈带状，基部包茎着生。夏季于茎頂开花，呈穗状花序，长7至8寸，多下垂。果实呈卵圆形，金黄色或紅褐色。

产地：全省各地均产。

产季：一年四季均可采集（人工培育）。

采集与加工：药用其谷芽。将谷芽（果实）在水里稍微浸泡，捞出放瓦盆內，上盖湿布，使其保持一定溫度。然后每日反复用水淘两次，待出芽后，摘去須根，晒干即可。

規格質量：身干不霉，芽高寸許，純淨无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。保管时宜放干燥通风处，并防止受潮。

性能：味甘。健脾开胃，消食化积。

佛手参

形态：为山野自生的宿根草本植物。春季抽茎，直立，高約1至2尺。叶互生，狭长披針形，頂端尖圓，具平行脉，全緣，无叶柄，基部包茎而生。夏季于茎端开紫紅色小花，呈穗状花序。地下根肉质，扁块状，下端有数分枝，形如手掌，故有“佛手参”之称。

主要产地：易县、涞源、阜平、唐县、蔚县、怀来、平泉、青龙、隆化、围場、新乐、正定和平山县，以及张家口市。

产季：在白露至封冻期間刨采。

采集与加工：药用其根。用鐮将根刨出后，去掉茎叶、須根及泥土，摊席上晒干即可（或用开水燙一燙再晒也可）。

規格質量：个肥大，質坚实，色白滋潤，身干，无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。宜放通风干燥处，防止虫蛀、受潮。

性能：味甘，微苦。能消痰，治跌打损伤、积血不行。



1.带花的枝 2.叶 3.根(药用部分)

車前子 附：車前草

别名：当道、牛舌、地胆头、車輪菜。

土名：猪耳朵棵、牛舌头棵、車粘韃菜。

来源与形态：屬車前科，为多年生草本，自生于道旁及田野潮湿地带。全体光滑无毛。春季生苗，叶自根茎丛生，貼近地面或斜向上升，广椭圆形，肉质厚，全緣，頂端微尖，叶脉



1. 植物全形 2. 果实 (放大)

5至7条,有长叶柄。夏季由叶腋间抽花,开绿白色小花,排列成穗状花序。花落后结蒴果,内包许多细小种子,卵形,黑褐色。

产地: 全省各地均产。

产季: 在夏、秋两季采收。

采集与加工: 药用其全草及种子。在未开花结籽前,用镰刀割其茎叶,晒干即为车前草。当种子成熟后,用镰刀割其全株,捋下种子,筛去杂质,再晒干即为车前子。

规格质量: 车前子: 籽粒成实,色黑或黑褐,纯净无杂质; 车前草: 身干色青绿,无杂质,不碎。

性能: 味甘,性寒。草为利尿、清热通五淋药; 籽为利

水、清热、止泻痢药。

何首乌

土名：山首乌。

来源与形态：属蓼科，为多年生草本，自生于山野，多蔓



1.花枝 2.块根(药用部分)

繞他物上升。叶互生，卵形，頂端漸尖，全緣，基部心脏形，有叶柄，并有膜状的叶鞘抱茎，呈褐色。秋季于茎頂或叶腋間开白色小花，作圓錐形花序。其根肥大，呈块状，黑褐色。

主要产地：蔚县、张北、怀来、邢台、内丘、涉县、易县、涞源、阜平和元氏县。

产季：在春、秋两季刨采。

采集与加工：药用其根。用鐮刨出根后，去掉泥土及須根，切成三分厚的薄片，晒干即可。

規格質量：身干肥大，坚实，內渣粉紅色，純淨者佳。

包装与保管：用席或麻袋包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味苦，性微溫。为滋养强壮药，补肝肾，养血气。治遺精、带下、阴虛、久瘧等症。

杏 仁


来源与形态：屬蔷薇科，为落叶乔木。高1至2尺，叶有柄，广椭圆形，末端尖，边缘有細鋸齿。春季开紅白色五瓣花，果实为圓形核果，生綠熟黃，果肉与核易分离。熟时果肉可食或制杏脯；核圓微扁，核仁扁平，心脏形，长约3至5分，寬約2至4分，厚約1.5至2.5分。基部多不对称，色紅褐，有皺紋。

主要产地：怀来、灤平、兴隆、青龙、遵化、迁安、正定和元氏县，以及承德、秦皇島市。

产季：6至7月間为采收期。

采集与加工：药用其核仁。果实成熟后，剝其果肉食用或干制杏脯，然后用繩作圈套（繩粗比平鋪杏核略低，主要防止砸碎杏仁），将杏核套在圈內（每圈約十几个杏核），用平面木棒砸开核壳；如大批加工时多用脫粒机軋开，取其核仁。

規格質量：籽粒充实飽滿，扁圓心脏形，黃褐色或赤褐色，无虫蛀，碎粒不超过10%者为佳。



1.枝叶果实 2.花 3.生药外形

包装与保管：用麻袋包装。杏仁易遭虫蛀、鼠咬、返油，須用硫磺熏制或儲于冷藏室。

性能：苦杏仁：味苦。为鎮咳、祛痰药。治咳逆上气、咳嗽、喘息等症。甜杏仁：味微甘。有滋潤性，內服有輕泻作用，并有滋补之效。外用于皮肤剝脫时作敷料，起保护作用。

注：杏仁有甜杏仁与苦杏仁两种。甜杏仁个大扁平，外皮淡黃褐色，味淡香；苦杏仁个略小，微扁，外皮色紅褐、微嗅、味苦。

防 风

别名：黄防风、青防风、北风。

土名：黄风。

来源与形态：属伞形科，为多年生宿根草本，生于干燥的砂质山野。茎高1至2尺，主根长圆锥形，茎平滑无毛，多分



1. 植物形态 2. 果实 3. 药用部分

枝。叶互生，为一至二回羽状分裂，裂片又有二至三个缺刻。春季抽茎，夏季于茎端开白色或微紫色小花，呈复伞形花序。果实椭圆形，有棱，幼果上有瘤状突起。

主要产地：平泉、青龙、兴隆、灤平、涿源、易县、阜平、邢台、涉县、张北、蔚县、正定、衡水、藁县、迁安、遵化和元氏县，以及承德市。

产季：分春、秋两季刨采。春季由清明起至小满止；秋季由立秋起至封冻止。

采集与加工：药用其根。用鎬刨出根后，去掉茎叶及泥土，晒至七、八成干，分等捆成约1斤重的牛角形小把，捆后再晒至足干即可。

规格质量：外皮黄，白色，皮细而紧，断碴有菊花心，质坚实者佳。

包装与保管：用筐或席包装。夏季应经常捣垛通风，并防止受潮或虫蛀。

性能：味微苦，性温。散风、胜湿，用于感冒及痛风。为缓和之发汗药，有镇痛、祛风、起痹之效。

注：类似防风的白馬肉、水芹菜根不适药用。它们的鉴别，白馬肉、水芹菜的形状和皮色虽与防风近似，但质糯，无风头，断碴无菊花心。


远 志 附：小草

土名：小鷄棵。

来源与形态：属远志科，为多年生草本，自生于山野。有小叶与大叶两种（细叶远志与瓜子金），均供药用。

一、小叶远志（细叶远志）根长肥厚，茎高七、八寸，叶互生，狭长，呈披针形或线形，全缘。夏季枝端开淡紫色小花，呈总状花序，花多偏于一侧。果实为蒴果，倒心脏形，内包黑色细小卵形种子二枚（图一）。

二、大叶远志（瓜子金）：茎多丛生，叶互生，卵圆形或长椭圆形。花紫色，根细小（图二）。



图一 1.植物全形 2.药用部分

产地：全省各地均产。

产季：在春、秋两季采收。

采集与加工：药用其根皮及幼嫩茎叶（即小草）。用鐮刨出全根，去掉秧苗、須根及泥土，晒至三、四成干，放于平面木板上用淨鞋底或搓板来回搓，使皮与木質硬心脱离，然后握紧，从一端抽出硬心（注意不要抽断），将皮晒干，即为远志筒。一般不易抽出硬心的細根，或抽断的根，仍用木板搓，使皮与硬心脱离，剥开皮去硬心晒干，即为远志肉。小草晒干即可。

规格質量：远志筒：

一等长4寸以上，直徑4分以上，黄褐色，肉厚、皮細、无杂质；二等长4寸以上，直徑3分以上，其他与上同；三等长2寸以上，直徑2分以上，其他与上同。远志肉：不分等，以色黄褐，淨皮去骨，不碎，挑去須根即可。

小草：身干、嫩茎叶、色青綠、无老梗、不霉。

包装与保管：远志筒用木箱装，內垫紙，按級分装；远志肉用席或麻袋包装。小草扎捆席包。保存时放通风干燥处，防止受潮发霉。

性能：味苦，性溫。为有效之祛痰药。古时用作强壮，强心，利尿药。治心悸失眠，记忆力减退等症。



图二 植物全形

麦 芽

土名：大麦芽。

来源与形态：屬大麦禾本科，一年或越年生草本。高3至4尺，茎直立，中空，有明显小节。叶細长而尖，有平行脉，



1. 植物全形 2. 生药外形 (麦芽)

基部成鞘状围于茎上。夏季于茎端开花，呈穗状花序，花外有二个细长苞，上端有长芒。果实为颖果，卵圆形。

产地：全省各地均产。

产季：一年四季均可采集（人工培育）。

加工：与谷芽相同。（见本书115页）

规格质量：芽长3至5分，身干不霉，纯净。

包装与保管：用麻袋包装。保管时宜放干燥通风处防止受潮。

性能：性温，味甘。消食、下气、温中、除满，为营养强壮性助消化药。

麦 角

来源与形态：属麦角菌科。麦角菌寄生于禾本科植物黑麦、老芒麦、大麦草、碱草和赖草子房上而成的菌核。略呈三面性纺锤形体，稍弯曲，两端渐尖，长约2至3分。外表黑紫色，质脆易折断，断碴平滑，边缘一薄层呈暗紫色，内部白色或淡红色，微嗅，味油腻性。

主要产地：张北、围场、丰宁、滦源、易县和龙关县，以及承德市。

产季：在6至7月间采集。

采集与加工：药用其干燥菌核（即麦角）。麦角形成后，摘下晒干即可。

规格质量：个粒饱满，色黑，无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。保管时宜放干燥处，严防受潮。

性能：为止血药。用于分娩后子宫流血及收缩不全的特效药。多制成针剂用之。



1. 植物全形 2. 寄生菌的黑麦 3. 生药外形

麦冬

别名：麦門冬、不忍草、忍凌、不死草、烏韭、禹韭。

土名：寸冬、盆草。

来源与形态：屬百合科，为多年生草本植物，栽培或自生于山野。叶丛生，呈綫状，頂端尖銳。夏季由叶腋間抽花茎，于茎端开紫色小花，作总状花序。果实为球形浆果，成熟时呈紫黑色。其根呈連珠状多肉質，两端略尖，黄白色。

主要产地：易县和邢台县。



1. 植物全形 2. 花枝 3. 生药外形

产季：在秋季采集。

采集与加工：药用其根块。将根块挖出后洗净，除去须根，晒干即可。

规格质量：身干体肥，外表淡黄色或黄白色，质柔软，半透明，纯净者佳。

包装与保管：用麻袋包装。储藏时，宜放干燥通风处，勿使受潮。

性能：性平，味甘。润肺、养胃、泻火、生津。用作祛痰药及和缓滋养药。

旱 蓮 草

土名：老鵝筋。

来源与形态：为一年生杂草，自生于田野、道旁、阴湿地带。茎长1至2尺，多匍匐于地面，自叶腋分小枝。茎基部叶互生，上部多对生，呈羽状复叶，小叶又呈羽状深裂，裂片顶端尖圆，有长叶柄。四、五月间于枝端及叶腋间开黄色五瓣小花。果实为瘦果，细小，长卵形，呈黄褐色，多聚合成球形。

产地：全省各地均产。

产季：在5至6月间采集。

采集与加工：药用其全草。用镰刀割其全株，除去根及杂草，晒干捆成小把即可。

规格质量：净草，不带根，身干无杂质，不霉烂。

包装与保管：扎捆。保管时宜放干燥通风处，防止受潮或发霉。

性能：性平，味甘酸。补肾阴，乌须发，用于缓和滋养与止血药。



带花的枝叶

草 决 明

别名：决完子、合明草子、江南豆。

土名：决明子。

来源与形态：屬豆科，为一年生草本植物。我省多是家种。茎高2至4尺，叶为羽状复叶，小叶倒卵圆形，与槐树叶相似。秋季开五瓣小黄花，花落后結莢角的果实，細长约5至10寸，內有种子数十粒，綠褐色，象綠豆大小，形如馬蹄。

主要产地：安国、阜平、河間、邢台、平山和正定县，以及唐山市。

产季：在秋季采集。

采集与加工：药用其种子。成熟后用镰刀将全株割下，摘下果实晒干，用木棒把种子打出，再晒至足干即可。

規格質量：籽粒成实，綠褐色，身干，无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。保管时放干燥处，防止受潮。但留作种子用的，要严防烟熏，以免影响发芽。

性能：味咸，性平。为清肝、益腎、祛风热、明眼目药。

附：种植方法


一、选地与整地：草决明（即决明子）对土壤要求不严，低洼地都可种植。一般在秋收后将地深耕7至8寸，来年春复耕一遍，深4至5寸，每亩施基肥万斤左右，翻入土內，整平不作畦。

二、播种：谷雨前后进行播种。首先将种子放入溫水內，浸5至10分鐘，捞出晾一晾，撒播沟內，沟深2寸左右，行距1尺，株距2寸，播后复土耙平，6至7天苗即出土。一般每亩播种2斤左右。

三、田間管理：苗出齐后，进行松土、除草，干旱时即浇水，保証幼苗正常发育。苗高尺許，結合中耕，追肥一次（每

亩施硫酸10到20斤)，施肥后培土浇水，任其自然生长。

四、收获：白露前后，当草决明荚果成熟变黑色时，即可收割。



1. 植物形状 2. 种子 (药用部分)

青木香

土名：祁木香。

来源与形态：屬菊科，为多年生草本。我省安国县已有数十年的种植习惯。茎高5尺左右，密生白色絨毛。根出叶丛生，广椭圆形，长尺許，寬2至3寸，有长柄；茎叶互生，长椭圆形至披針形，有短柄或无柄抱茎而生，边缘有不整齐的細鋸齿。夏季于茎端开黄色头状花，象菊花。其根为圓柱形或圓錐形，稍弯曲，多分枝，外皮灰褐色，粗糙。

主要产地：安国县。

产季：在霜降后，叶子枯黄时刨采。

采集与加工：药用其根及根茎。先用镰刀割其茎叶，再用三齿鐮刨出根部，摘去須根，将主根或支根截成3至5寸长的小节；較粗大的疙瘩头（根茎）剖成数瓣，晒干即可。

規格質量：身干，肥大，質坚实，无阴碴，純淨者佳。

包装与保管：用筐或席包装。保管时宜放干燥通风处，严防受潮变质。

性能：性寒，味辛苦。能散风湿，降恶气，为解毒药。

附：种植方法

一、选地：青木香适宜在沙質土壤种植，并有水源条件。

二、整地：霜降至立冬間进行秋耕，深6至7寸。来年化冻后，施基肥（土粪）万斤以上，并复耕一遍，用耙耙平，作畦，畦长3丈、寬3尺。

三、栽植：于清明后5至10天在已作好的畦內，按行、株距各1.5尺，刨成深3至4寸、寬4寸的交錯坑穴。然后将切好的种秧（带芽的根茎）成45度的傾斜度放入穴內，皮向下靠近地面，随即复土（約1寸厚），并用筲攪平后浇水。

四、田間管理：栽植后，每隔5至7天浇水一次，約20天后即发芽出土。苗出齐后，見早即浇水。6月上旬，进行追



植物全形

肥，在植株周围3寸左右的地方挖3至4寸深的沟，施入肥料后，搽平浇水；八月間追第二次肥，随浇水。每次浇水后需中耕除草，但不宜深鋤。此时如发现有花苔抽出，应随即摘除，促其根部发育。立秋間要浇大水，以后浇水次数可逐渐减少。

五、种秧的儲藏：在采刨时，将上端的圓形疙瘩头（根茎）切下，稍微晾晒，使伤口愈合。然后在較背阴地方挖坑（坑的大小可根据种秧多少而定），再将选好的种秧埋入坑內，上面盖土約7至8寸厚（寒冷地区可酌量加厚）。第二年栽植前刨出，略晒，按芽嘴数将疙瘩头縱剖数瓣，以便栽植。

青 蒿

别名：草蒿、香蒿。

来源与形态：屬菊科，为多年生草本植物，自生于河岸、海边。最初就地丛生，形似胡蘿卜。夏季抽茎，直立，高2至3尺，叶互生，色綠，呈三回羽状細裂，裂片先端尖。叶腋出枝，枝梢有头状花序，排列为穗状，色青綠。花落后結瘦果，甚小，卵形，黄褐色，全草有香气。

产地：全省各地均产。

产季：在夏季产新。


采集与加工：药用全草。当花开放前，用镰刀割下，去掉老梗阴干即可。

规格質量：身干，色綠，无老梗。

包装与保管：扎捆后外面用席包装。保存时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味苦，性寒。散风火、解暑热，并止盜汗。为劳热骨蒸煩热之妙品。外用可作杀虫剂。

注：黃蒿不供药用。其莖紫紅色，叶淡黃色，比青蒿叶稍肥大而短，質堅实。



1.花枝 2.头状花序 3.筒状花冠 4.花冠剖开形状

青 椒

土名：野花椒。

来源与形态：屬芸香科，为灌木或小乔木，自生于山野。茎高8至9尺，枝干有刺而尖锐，約长4分左右。叶互生，叶柄短也有刺，奇数羽状复叶，其小叶呈椭圆形或披针形，微有光

澤。邊緣有細鋸齒，表面綠色，背面淡綠色。夏季自頂端生傘房花序，花呈綠色。9至10月間結綠色或褐色蒴果，味異香，圓形，果柄短，內含黑色種子，并有光澤；成熟時果壳自行裂開，種子露于壳外。

主要产地：迁安、遵化、青龙和兴隆县，以及秦皇島市。

产季：在秋季采收。

采集与加工：药用果实。成熟后将蒴果摘下，去淨枝、叶和果柄，晒干即可。

规格質量：身干，綠褐色，无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。保管耐宜放通风干燥处，防止受潮。

性能：味辛，性热。为健胃药。治胃腸冷痛和吐泻，又是驅除蛔虫药。



1.带果实的枝叶 2.果实及种子 (药用部分)

知 母 附：知母肉

别名：蛭母。

土名：蒜瓣子草。

来源与形态：屬百合科，为多年生草本，自生于山坡向阳地带。叶丛生，細长披針形，頂端尖，似蒜苗。夏季于叶腋間抽生高3至4尺的花梗，开淡紫紅色的六瓣小花，呈穗状花序。果实为蒴果，长椭圆形，有六棱，內有黑色的种子。其根茎横生于地下，略呈扁圆形，稍弯曲，很少分枝，外皮棕黄或棕褐色。根茎上方平坦，下方微隆起，着生許多須根，并自兩側向上，密生金黄色长絨毛。

主要产地：易县、涞源、平山、元氏、內丘、邢台、涉县、阜平、龙关、平泉、青龙、兴隆、丰宁、薊县和玉田县，以及石家庄、承德市。

产季：分春、秋两季。春季自化冻起至清明节止（芽高2寸止收）；秋季自白露起至封冻止。

采集与加工：药用其根茎。用鐮将毛知母刨出后，摘去秧苗及須根，晒干即可。毛知母因带油性，不易干燥，晾晒時間要长，一般晾晒方法有以下二种：

（一）广场打壟晾晒法：将湿知母在广场上打成泥鳅背壟的小壟，每隔一、二天在早晨有露水时翻一次壟（防止撞掉毛），晒至五、六成干时并小壟为大壟（使其回性，滲出里面水分），待两三天后，再分小壟晒至足干。

（二）搭架分层晾晒法：用木棍搭架，架长5尺、寬3尺，共分五至七层，每层高2尺，架上用秫秸作帘子，然后将毛知母一层层鋪上。每层可晒毛知母1,500斤左右，并經常翻晒检查。以上晾晒足干即可取下分等包装。

知母肉加工方法：

一、热剝皮：即伏天刨根（炎夏季节），乘湿用手擰掉外



1. 植物全形 2. 加工后的药用部分

皮晒干。此法去皮洁淨，外表光滑。惟根茎养分不足，体輕質糠，質量較次。

二、刀刮皮：立秋后刨根，冬季趁冻时用小刀刮去外皮，放席上晒干。此法因用刀刮皮厚薄不均，外表不光滑，色澤虽

无热剥皮洁白，但質坚实較好。

規格質量：毛知母：一等（盖王）长3寸以上，直徑在4分以上。二等（頂王）长2寸以上，直徑在3分以上。三等（王中王）长2寸以下，直徑在3分以下。以上規格均須条略圓，肥大，質坚无朽头，身干不霉。知母肉：不分等級，以肥大，滋潤，質坚，色白者佳；瘦小发糠者次之。

包装与保管：用筐包装。知母易吸湿返潮，发霉变质，宜放通风干燥处保管。

性能：味微苦，性寒。滋腎补水，泻火滑腸，除心煩躁悶、久瘡煩热、小便热閉不通等症。

枸杞果 附：地骨皮

别名：枸櫞子、枸棘子。

来源与形态：屬茄科，为落叶灌木。我省靜海县已有数十年的种植习惯。枝条长达丈許，呈弧形状下垂，有短刺。叶互生或多数丛生，有短柄，叶片卵状披針形，全緣，色鮮綠。夏季由叶腋間生淡紫色小花，丛出，花柄細长，花萼鐘形，裂片三至五，花冠紫色。花落后結浆果，暗紅或紅色，卵圓或长圓形。

主要产地：靜海、滄县、安国和定县，以及唐山市。

产季：在夏、秋两季采集。

采集与加工：药用其果及皮（为保持杞果的生产，一般多用野枸杞根皮为地骨皮）。果实成熟后，利用早晨或晚上（中午摘的果实容易坏），将鮮果摘下，薄摊席上晾晒，并要輕輕翻动，以防碰破及变黑色。另一种是烘干法，在室內安装迭式晾架，分层把晾板放在架上，然后将枸杞果薄摊在晾板上，室內生爐火，使室溫經常保持在38度左右。为了排除水分，在离地面半尺处留通风洞1至2个（使溫度向下流动，以保持杞果質量），这样經過96小时后即可烘干。采用这种方法的好处是风雨天都可进行，避免因阴雨而招致的烂果損失。



1.花枝及果枝 2.根

規格質量：身干，个大，肉厚，色紅，无杂质。

包装与保管：用木箱包装，内垫紙二层，装实后封閉严密（或用紙将外皮糊严，再涂血料）。保管时应放干燥低温处，有条件者可放在冷仓里。

性能：味苦，性寒。枸杞果为滋养、强壮药。治糖尿病、肺结核、虚弱消瘦症有效；枸杞酒（枸杞果五升，酒二斗，浸二周制成），为强壮剂。地骨皮清肝泻热，凉骨除蒸，治咳嗽、吐血等。

附：培植方法

一、选种与整地：枸杞对土壤选择不甚严格，一般碱地均可种植；但切忌在排水不良的地内种植，以免积水腐烂其根。由于枸杞多是移苗培植，因此在移苗前先在留在地里，挖好树坑（行距7至8尺，株距6至7尺，每亩百棵上下，旱田可增到150棵），坑内施上基肥（每坑施粪肥5—10斤），以便栽秧；但栽秧前必须作好育苗工作。

二、育苗及移苗：育苗期在留种地里做畦，先浇水溼透，然后将选择结果多而大的老果，用水浸软（指干果）挤出种子，撒播畦内复土即可。如水源充足，又系砂质土壤，可先将畦面整平，种子拌土撒播畦内，用耙复土埋上种子，再进行浇水。播种后6至7天苗即可出土。以后应注意除草、追肥和浇水。第二年清明节前即可移栽在整好的树坑内，栽好后埋土踩实，随即浇水。

三、田间管理：枸杞幼苗生长很快，三年后即接近成年树，喜干燥，因之早年多是丰收。在生长期，滋生新枝叶较快，果枝枯死也很严重，所以要随时剪枯枝、打幼条。同时要多施肥料，保证养料的充分供给，以保证增产。

枸杞开花期很长，每年五月即开花，一直连续开到八月，所以有夏果、伏果、秋果之分。但须做好以下管理工作：

1、剪枝：结果实以后的枝条，极易枯死，特别是老树更多，如不及时剪掉枯枝，被风吹摇动干枝，极易把嫩芽和果花碰掉，影响产量。因此在春天发芽前，一律将干枝剪掉。在发芽后也须随时打去树身新生芽叶及酌情剪去过密的幼条，保持稀密均匀，通风透光；但也要防止剪枝太稀。果实成熟时，因

鳥食很厉害，必須有专人看守。

2、除虫：果树的主要虫害是小白虫，要及时除治。一般用6%可湿性的六六六粉液噴洒，但只能在結果前噴洒，孕果时一切带有毒性葯剂不准使用，以免果实染有毒性，发生人身危險。

3、浇水：开春以后，要結合施肥进行浇水。但浇水不宜过勤，并注意雨后要及时排水。

4、施肥：春秋两季各施一次。第一次在开花前；第二次在秋季結果实时，施肥量每棵用豆餅1至3斤，大糞5至10斤，或硫銨、骨粉各3至4两均可。施肥后随即浇水，以增加植物吸肥力。

四、收获：夏果在芒种开始繼續成熟，約持續一个月的時間。因此，須每隔一天摘果一次；伏果在八月成熟；秋果在十月初成熟。以夏果产量高；伏果产量次之。其晾晒或烘干方法与前相同。

板藍根 附：大青叶

别名：大青、菘藍。

来源与形态：屬十菜花科，为一年或越年生草本植物。我省安国县已有数十年的种植习惯。茎高2至3尺，全株光滑无毛。第一年无茎，根出叶近地面丛生，倒卵形至匙形，长5至6寸，先端微尖，全緣或微呈波状，基部漸狭近于无柄，叶面綠色，背面略浅。次年春抽茎，茎上叶互生，箭形或披針形，无柄。四月中旬茎頂与叶腋間开黄色四瓣小花，作总状花序。花落后結长圓形果实，扁平，生时色綠，熟时色紫。其根細长，入葯为板藍根。

主要产地：安国县。

产季：在霜降产新。

采集与加工：葯用其根。刨采时，先在畦边挖2尺深的沟，随即順沟刨收。将根刨出后，去淨苗叶及泥土，晒至八成



植物全形

干，用手或木板略搓一搓，使其条直。然后捆成牛角形的小把，再晒至足干即可。

规格质量：身干，条长，质肥，色白，粉性足，无杂质。

包装与保管：用筐包装。保管时宜放干燥通风处，但夏季容易被虫蛀，除用硫磺熏制外，用沙土埋藏。叶扎捆即可。

性能：味苦，性寒。为清凉、解热、解毒药。治丹毒、斑疹、伤寒等症。

附：种植方法

一、选地与整地：板蓝根适于在砂質土壤种植，喜水而又怕涝；高燥、低洼地都不宜种植。一般在秋收后将留地进行深翻，深尺許，来年春再复耕一遍，随施基肥万斤以上，耕入土內，整平作畦。畦寬3尺，长可根据地形而定（一般在3丈左右），并浇水溼地。

二、播种：清明节前后即可播种。在整好的畦內松土划沟（深寸許，寬6至8寸），将种子撒播沟內，复土3至4分厚，10至15天苗即可出齐。

三、田間管理：苗高1寸时进行間苗，苗距2至3寸，同时浅耕除草，并根据干旱情况及时浇水，保持土壤湿潤，但浇水不宜太大。苗高5寸时追肥一次，追肥后及时浇水，以后浇水的次数应根据土壤湿潤情况而定。同时要注意紅蜘蛛为害，发现后立即用6%可湿性六六六粉液或滴滴涕噴洒除治。

四、收获：在霜降后即可刨采，其具体方法与前相同。

五、繁殖种子的方法：板蓝根当年收根不結子，但又是用种子播种，因此，必須注意繁殖种子。其方法是：霜降刨收板蓝根时，选留主根粗大、須根少，而无病虫害的作为种秧，同时移栽。行距1.2尺、株距8寸至1尺，栽后复土埋严，浇水一、二次。如在原地，将选好的种根留下不刨亦可，这样产子量較高。立冬后将种根复土或用牲畜粪埋盖一层（厚度寸許），以保安全越冬。来年清明节即可发芽出土。苗出齐后，要根据干旱情况及时浇水或松土。苗高2寸时追肥（一般粪肥即可），追肥量可根据苗的壮、弱而定，肥后要浇水，以加速植物吸肥力。四月中旬开花，五、六月間种子即漸成熟。全部成熟后，将全株割下晒干，将种子打下，儲藏于干燥处，防止烟熏，以备播种。但因收种子的根有柴質，一般不再供药用。

注：其叶为大青叶，多制藍靛为染料，京津二市用量很大。如需叶时收割第一年生的（夏季割一次，霜降前割一次）晒干即可。

板 栗

别名：魁栗、家栗、大栗、毛栗、毛板栗、瓦栗子、锥栗。

土名：栗子。

来源与形态：屬壳斗科，为落叶乔木。茎高5丈余，树冠半圆形或伞状，树皮暗灰色，呈不规则的深裂。叶互生，卵形或披针形，顶端长尖，边缘有锯齿，齿尖常生硬刺，叶柄短。夏季于叶腋间开淡黄褐色小花。雄花，呈穗状花序，雌花常三花集生于雄花序的下部，外有总苞。果实为坚果，通常二三枚包于带硬刺的壳斗内，形如刺蝟。成熟后，壳裂散出褐色果实。

主要产地：迁安、遵化、薊县、昌黎、平山、正定、易县、阜平、邢台、兴隆和青龙县，以及秦皇島市。

产季：在8至9月间产新。

采集与加工：板栗的种类很多，药用多以栗壳和树皮。果实多供食用，也可煨研和药用。成熟后用竹竿打落果实，剥下带刺的壳斗，拣去杂质，分别晒干即可。

包装与保管：栗实和栗壳用麻袋或席篋包装，栗树皮扎捆。保管时宜放通风干燥处，防止受潮。但入药栗实必须风干，否则容易发霉变质，不能药用。

性能：栗实性温，无毒。补肾气、厚肠胃，用作滋养；栗壳治翻胃、止渴、止泻血；栗树皮治丹毒，可煎汤洗之。



植物带果实枝叶的一部

金銀花

土名：金藤花。

来源与形态：屬忍冬科，为多年生常綠蔓性小灌木，自生于山野。我省涉县（原武安县）已有十余年的种植习惯。全株



1.带花的枝 2.剖开的花 3.生药外形

密生棕色軟毛。叶对生，呈椭圆形，全緣有叶柄。夏初由叶腋間开白色或深黄色唇形小花，有香味。

主要产地：涉县。

产季：在4至7月間产新。

采集与加工：药用其花蕾。金銀花开花時間較长，一般从四月开到七月，但須在花未开放前摘其花蕾（早晨摘的色澤好）。摘后放在室內或通风干燥处的席上或木板上摊平晾干（切忌阳光曝曬），并随时輕輕翻动，防止发霉。

規格質量：花蕾身干，色黄、白，无杂质，不霉。

包装与保管：用席包装。保管时宜放通风干燥处，防止受潮发霉。

性能：味甘，性寒。清散风湿，消除肿毒。治一切疮瘍、痔瘻、痢疾等症。

附：种植方法

一、选地：金銀花对土壤要求不甚严格。凡是荒山、土岭或地头、沟旁土层較厚、通风向阳的地方都可以栽植，一般不占耕地。

二、栽植：在每年的伏天霪雨連綿的时候栽植为宜。将一、二年生的枝条（不要老的或过嫩的），截成1尺长的节，斜插入挖好的穴坑內（每穴播2至3根），芽眼向上，枝条入土7寸左右，露土3寸，用脚踩实，如无雨，栽后需浇水。另外，分根栽植也可。

三、管理：栽植后，注意除草、追肥（圈肥、化肥均可），遇干旱时应及时浇水，并經常保持土壤湿润，以使其正常发育。在成幼林时期，如有干枝，应立即剪掉，以利其他枝条生长。金銀花一般生长三年左右，即可收获。

金櫻子

別名：刺梨子、山石榴、山鷄頭子。

土名：酒瓶子。



1. 帶花的枝 2. 藥用部分

来源与形态：屬薔薇科，为攀緣木本。其蔓长达丈許，多刺。复叶互生，小叶三个，頂端者大，兩側者略小，卵圓形，頂端尖，有光澤，邊緣有鋸齒，托叶着生于叶柄上，夏季于新枝頂端开白色单瓣或重瓣花，花象托瓶状，有細刺，雌蕊多隱于花托內，有絨毛。花托成熟时紅色，呈肉質漿果状，梨形，外有剛毛，長約4分，粗約3分，內含許多質堅瘦果。

主要产地：易县、涞源、平山、正定、新乐、兴隆、青龙、平泉、蔚县、怀来和龙关县。

产季：在秋末采集。

采集与加工：药用其果实。成熟时，将果实摘下，晒干即可。

規格質量：个大均匀，外皮色紅，身干純淨。

包装与保管：用麻袋或筐包装。宜放于干燥处，防止受潮发霉。

性能：味酸涩，无毒。为强壮、收斂药。

芫 花

别名：杜芫、去水、毒魚、赤芫。

土名：药魚草。

来源与形态：屬瑞香科，为落叶灌木。高3至5尺，枝細长而直立。叶对生，偶为互生，橢圓形或长橢圓形，全緣略为革質，先端尖，基部有短叶柄。花在叶出前开放，淡紫色，作丛状，萼頂端四裂，呈花瓣状。果实为核果，內含种子一枚。

主要产地：易县、元氏、平山、邢台和涉县，以及邯鄲市。

产季：在4至5月間产新。

采集与加工：药用其花。当花未开放时，采集花蕾阴干即可。

規格質量：花蕾身干，淡紫色或紫色，无梗叶。

包装与保管：用麻袋包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。



1.带果实的枝 2.药用部分

性能：味辛，性温，有小毒。为祛痰药，又用作治水肿，泻五脏水饮。

玫瑰花

别名：赤蔷薇花。

土名：刺玫花。

来源与形态：屬蔷薇科，为小灌木，自生于山野。茎直立，高2至3尺，枝間多刺，叶为奇数羽状复叶，小叶椭圆形，有锯齿，叶柄有托叶。夏季开紫紅色花，有香味。花落后結长圓形果实。

主要产地：龙关、怀来、蔚县、涞源、易县、平山、正定、邯鄲、遵化、迁安、昌黎、青龙、兴隆、隆化、丰宁、灤



1.花枝 2.生药外形

平、平泉和围场县，以及承德市。

产季：在夏季产新。

采集与加工：药用其花。当玫瑰花苞将要开放时，采下阴干即可。

规格质量：花朵色粉红，身干，无杂质。

包装与保管：用箱包装，箱内垫纸，并封闭严密。宜放干燥处保管，防止受潮。

性能：味微苦，性温。为行气、解郁，并有柔肝、止血之效。黄色和白色花多供副食用。

芡 实

别名：鷄头、雁头、鴻头、水流黄。

土名：鷄头米。

来源与形态：属睡莲科，为一年生草本植物，生于池塘中。叶及叶柄有许多刺，叶圆形而阔大，直径由5寸至1尺，平浮于水面，略似荷花叶，叶面色深绿，有光泽，背面紫色。夏季花茎伸长于水面，顶端开花，深紫色，中午盛开，日落萎。果实如鷄头，长2至3寸，外皮褐色有刺，内有球形种子7至8粒，色洁白。

主要产地：高阳、乐亭和薊县。

产季：在秋季产新。

采集与加工：药用其种子。但由于芡实生长在水中，可乘小船或木筏子采取。因茎和果实外皮生有硬刺，须用镰刀在茎上端割下果实，然后再用铁丝箴篱将果实捞到船上。

将果实堆成堆沤烂外皮(约六、七天即可沤掉全部外皮)，洗净晒干，即成为核果。经过大小孔筛子筛后，将核果个粒均匀的放一起，分别用脱粒机将其硬壳砸开，搗去外皮及杂质，即为芡实米。

规格质量：身干，色洁白，质饱满，粒整不碎，无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。宜放通风干燥处，夏季应及时

晾晒，防止虫蛀和发霉。

性能：味甘，性平。为滋养强壮药。治湿痹、腰、腿关节痛及慢性泄泻、遗精、女子带下等症。又可用于副食。



1. 植物全形 2. 果实 3. 生药外形

抽 葫 蘆

土名：抽巴葫蘆。

来源与形态：屬葫蘆科，为一年生蔓性草本，多种于地边、宅旁和院落。茎細长，卷須纏繞它物。叶互生，心脏形，有軟毛。夏初开白花，夕开朝萎。花落后結球形果实或双球重迭状。蒂細。嫩时可供食用；老时可剖开将瓢子取出作容器



植物全株

用；未长成而抽巴干（为抽巴葫蘆）可供药用。

产地：全省各地均产。

产季：在霜降后产新。

采集与加工：药用霜降后未长成的抽巴葫蘆。将其摘下，晒干即可。

规格质量：身干，皱纹多，不碎，不霉烂。

包装与保管：用筐包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：清心热、润肺、利水。治五淋等症有效。

蘆 根

别名：葦根、葦茎。

土名：葦子根、蘆葦根。

来源与形态：属禾本科，为多年生草本，自生于池边、沟旁。春季从宿根生茎，高丈许，茎中空，有节，叶互生，狭长披针形，先端尖。秋季茎顶抽生圆锥花序，花白色。其根茎横生于地下，有节，色白柔润，晒干后，呈黄白色。

产地：全省各地均产。

产季：在春初、秋末产新，以春产者为好。

采集与加工：药用其根茎。用镰刨出后，去净老皮和须毛，晒干即可。

规格质量：身干，色黄白，不带毛须。

包装与保管：扎捆或用席包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。


性能：味甜，性寒。有清胃火、止呕、除烦热、利小便之功。为解热利湿药。



1.花枝 2.根 3.生药外形

松 节

来源与形态：屬松科，为常綠乔木。高約5至6丈不等，树皮灰褐色或棕褐色，呈鱗甲狀，裂縫紅褐色。叶鞘永存，叶如針形。雄花序圓筒狀，长4至5寸，生于嫩枝茎部，橙色或淡褐色；雌花序圓球形或卵形，长約2寸，紫色单一或数个生于新枝頂端，結球形果实。种子长卵形，褐色有斑紋，长約2分



带松球果的枝

許。我省用油松树枝間之节为松节。

主要产地：迁安、遵化、薊县、龙关、怀来、青龙、兴隆和灤平县，以及秦皇島、承德市。

产季：一年四季均可采集。

采集与加工：药用油松之节。将伐下松树枝取五化头之节，截成2至3寸长，晒干即可。

規格質量：身干成块状，色褐紅，質坚硬，带油質。

包装与保管：用席蓆包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：性溫，无毒。治筋骨疼痛、骨节风湿等症。

注：我国松树种类很多，药用以馬尾松、油松和海松为正品。

附 子

别名：黑附子。

来源与形态：屬毛茛科，为多年生宿根草本植物，自生山野砂礫湿地。春季生茎，高3尺許，直立，四棱形。叶互生，呈二至三个羽状分裂，裂片綫形。秋季由茎頂和叶腋間抽生复总状花序，花黄色或黄底有紫色，不整齐。其根为倒圓錐形或长卵形，下部略尖，长约寸余。外皮灰褐紫色，略有皺紋，断面白色有粉質，并含有毒質。

主要产地：平泉县及承德市。

产季：在秋季刨采。

采集与加工：药用其根。用鐮刨出，去淨残茎、須根和泥土，晒干即可。

規格質量：身干，灰褐色，質坚实，断面白色，粉質大，无杂質者佳。

包装与保管：用席或筐包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。


性能：味辛，性溫，大热。为强心、回阳、暖脾胃要药。用于一切疾病之虛脫。



1.带花的枝 2.生药外形

兔兒傘

来源与形态：屬菊科，为多年生草本，自生于山野。茎直立，高2尺左右，圓柱形，有淺縱溝。叶互生，叶片呈掌状分裂，裂片又作不等的深裂，邊緣有粗鋸齒。夏末由茎頂開粉色小花，由若干个筒状花組成头状花序，呈圓錐形排列。其根細



1. 莖叶 2. 花枝 3. 筒状花冠 4. 根 (藥用部分)

长而多，作不規則的弯曲。

主要产地：易县、迁安、青龙、兴隆、平泉、围场和隆化县，以及秦皇島、承德市。

产季：在春、秋两季产新。

采集与加工：药用其根。当春季开冻时刨采，到苗高2寸时止；秋季叶枯死开始至封冻止。用鐮将根刨出后，去掉茎叶和泥土，晒干即可。

規格質量：身干不霉，无泥土。

包装与保管：用筐或席包装，~~时~~时宜放干燥通风处，防止受潮发霉。

性能：民間习惯用治~~...~~

南 星

土名：山棒子、药狗丹。


来源与形态：屬天南星科，为多年生草本。我省有野生与家种两种：

一、野生：自生于山野阴坡。茎高3至4尺，根出叶，有长柄，为掌状复叶，小叶7至11枚，狭长呈披针形。叶腋間抽长花梗，頂生粗大肉穗花序。果实成熟后色紅而鮮艳，似玉蜀黍状，故有“山棒子”之称（图一）。

二、家种：高尺許，叶从根出，有长柄，为掌状复叶，小叶5至7枚，长椭圆形，頂端尖，全緣或微現波状。叶腋間抽长花柄，穗状花序生在佛焰苞上，果实为浆果，成熟后即变成黑色。其根茎为不規則的扁圆形块状，四周有圓芽嘴及須根（图二）。

主要产地：涿源、易县、內丘、平山、正定、蔚县、怀来、遵化、迁安、青龙和兴隆县，以及石家庄、秦皇島市均有野生；安国县为家种。

产季：野生在夏、秋两季生产，以秋季質量为佳；家种在十月产新。



1.根球莖 2.叶 3.果实 4.药用外形

图一

采集与加工：药用其根莖。用鎬刨出后进行加工，其方法有三：（一）去掉上部残莖及下部须根，洗净泥土，用有棱竹板，将外皮刮净、晒干。（二）将洗净的南星装于条筐里，浸入水中，以竹扫帚头擦去外皮晒干。（三）放荆条筐中于河里盪去

外皮，晒干后再用荆条筐撞一遍，撞至白色为止，并以硫磺熏制，使其色白且防止虫蛀。南星含有剧毒，加工时应带手套和口罩；如发生中毒现象，可用甘草水洗，即能解其毒。

规格质量：身干肥大，质坚实，不带老皮，外皮黄白色，



1.根球莖 2.果实穗 3.叶 4.佛焰苞 5.药用外形

图二

断碴白色，无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。保管时，注意防潮湿或虫蛀。

性能：味苦，性温，有毒。为祛风、化痰、散结、消肿药。

附：种植方法

一、选地与整地：南星喜生长于阴湿砂黄土壤，不仅产量高，质量亦好。冬季将土地深翻0.8至1.2尺，使土壤疏松，又可冻死越冬潜藏地下的害虫及虫卵。来年春季，于栽种前再重耕一遍，耙平作畦，行距0.8尺，上宽下窄（上宽0.3尺，底宽0.1尺，深0.15尺）。

二、栽植：

（一）块茎栽植法：秋后收获时，选择栗子或钮扣大小的作种子，深埋地下（1至1.5尺），放一层种根，盖一层土，以免发热霉烂，栽植时刨出，栽植期以三月下旬或四月上旬（清明至立夏之间）为宜。块茎栽植又分干沟与湿沟两种：（1）干沟栽植法：每沟内种一行，株距0.4至0.5尺，种秧似栗子大小者每株放一枚；钮扣大小者每株放两枚；鸡蛋黄大小者可从发芽处切两瓣，每株内也放一枚，一般平均每亩栽植70至80行。下种后将两沟间的土壤隔一壟拥平一壟（一壟土可拥平两条沟子），这样就成了1.6尺宽的平面长畦（每畦内两行）。为便于浇水，可再截为短畦，约四、五天浇水一次，十几天后方能出芽。（2）湿沟栽植法：方法大致如前相同。将沟串深一些（0.2至0.25尺），在栽植前一天，先把沟溼湿，次日待土不粘时下种，然后把沟拥平。一周左右浇水一次，十几天后即可出芽。此法的优点是：第一节省水量；第二节省人工；第三出芽较快；第四抗旱期长。

（二）种子种植法：选择当年新收种子，于立秋前，在已整好的畦内，按0.4至0.5尺的行距划浅沟，将种子均匀的播在沟内。如天旱地干时，可划0.8寸深沟；阴雨天地湿，沟深0.5寸即可。播种后六至十天苗可出全；霜降后用厩肥复盖，以保

护根芽安全越冬。来年谷雨至立夏間，幼苗长2至3寸时即可定苗（株距4至5寸）或移植（隔一行移去一行）。移植时可多带原土，深栽按实，使新老土密切吻合，成活率可达95%以上；如在阴雨天移植，成活率更高。

以上两种栽植法，块茎栽植法当年可收，产量较高，应推广；种子种植法二年才能收获，产量较低，适于繁殖种根。

三、田間管理：

（一）浇水：下种后第一次浇水要多些，以促进种子发育，随后隔四、五天浇水一次至苗出全为止（阴雨天地湿可不浇）。

（二）中耕：苗高2至3寸时可进行初次中耕，此时因苗小应浅鋤，待苗长到5至8寸时进行第二次中耕，宜深些，使土壤疏松，通风透气，调节地温，以促进根部对水分和养分的吸收。中耕时宜将松土培在每株的根部，以防暴风雨的摧残，而影响发育。

（三）施肥：整地前先施基肥（厩肥、粪肥均可），每亩約40担；苗高5寸时（端午节左右），可追施人粪尿（尿肥宜兑入等量水混合浇之为宜），数量根据地質薄厚而定。初次追肥后宜深中耕，使肥料掺入土内，促进分解；第二次追肥在中伏，每亩追施化肥30至50斤，撒于两行之間（离根稍远一些）。撒时注意不要将肥料粘在秧苗上，以防腐蝕叶茎。

（四）采摘佛焰苞：南星摘除佛焰苞能增产10—14%。摘佛焰苞时最好用剪子剪茎，因用手拔往往带出老根，损伤株苗。

（五）虫害防治：虫害以挖心虫为害較重，平常多发生在干旱天。发现时可用5%可湿性六六六液噴洒，即可消灭。

四、收获：通常在寒露前后采收。因种植关系，往往发育成熟期有早有晚，以叶子全部萎黄棵倒时采收为适宜。

紅 花

别名：紅蓝花、黄蓝。

土名：草紅花。

来源与形态：屬菊科，为一年生草本。1957年我省引种成功。全体光滑无毛，茎直立，高2至3尺，上部分枝很多。叶互生，卵形或卵状披针形，近于无叶柄或抱茎而生，叶边缘呈尖锯齿状，叶顶端尖锐。夏季于枝梢生大形头状花序，花托扁平，上面生许多筒状花，桔红色。果实为瘦果，卵形。

主要产地：新乐、平山、遵化、平泉、灤平、丰宁、滄



1.带花的枝 2.药用部分

县、怀安和安国县，以及秦皇島、唐山、承德市。

产季：在7至8月間采集。

采集与加工：药用其筒状花。当花由黄色变成紅黄色时，在早晨带露水采摘，摊于席上，放通风处阴干，防止曝晒，以免影响色澤；如遇阴雨天可进行烘干。其方法是：（一）鋪在火炕上烘干；（二）鋪在木架上，室内生炭火，火力要温和均匀，并随时翻动，均以九成干为限。

規格質量：淨花，整齐不碎，紅色或紅黄色，身干无杂质。

包装与保管：用麻袋或布袋包装。保管时放通风干燥处。但在包装时可将木炭放入包內一、二块，以保色澤和防潮。

性能：辛温。为通經药。对月經閉止、难产、胎死腹中、跌打损伤等症有效。

附：种植方法

一、选地与整地：紅花是抗旱耐寒喜肥植物，潮湿与积水地对其生长不利，适于在砂質黄土壤种植；切忌碱地，同时不宜連作，以間作輪作为佳。在播种前将留作紅花的土地进行深翻（深6至7寸），使其土壤疏松破碎，且排水良好；并在翻地的同时施腐熟圈肥3,000至5,000斤作为基肥，随之整平，然后作畦（寬2.5至3尺，长度不一，畦背1.8尺）。

二、播种：分春播与秋播两种。春播于初春化冻后播种；秋播一般在秋分播种。由于南北气候不一，北半部宜春播，每畦种两行，行距1.5尺、株距1尺左右，开沟条播，播后复薄土，每亩播种量4至5斤。

三、田間管理：秋播紅花于上冻前浇冻水一次，浇后用牲畜粪盖严保温，至来年春化冻后，苗长至3至4寸高时进行間苗，株距尺許，如有缺株时可进行补苗。在蹲苗时期不宜浇水，待苗长至1.5尺高追化学肥料（每亩不超过10斤），随之浇水，以后經常保持畦內湿润。开花期不宜浇水，以免灌死，并掌握有草即除。

四、病虫害防治：紅花虫害較多，危害最大的是紅蜘蛛，現尚无良好的除治方法。一般用5%可湿性六六六液噴洒，但此法仅限于在孕蕾以前使用；若花蕾将开放时发生虫害，可用烟草叶、石灰水或石灰硫磺合剂噴洒；如到花朵盛开时发生虫害，任何葯品都不宜使用。

五、收获：收获方法与前相同。

六、选种：紅花系用种子繁殖，因此在开花前要先选择生长健壮、花蕾飽滿的作为种株，待茎叶呈黄棕色时种子即成熟。采收时将全株拔下，晒干，打落种子，簸去杂质，放瓦罐內或布袋內儲存于干燥通风处，防止烟熏，留作来年种植。一般每亩可收种子150至200斤。

注：紅花在我省培植的有兩種，一是叶和花朵带尖銳刺；一是叶和花朵都不带刺。但带刺的产量高。

郁李仁

别名：棠棣仁、自棣树仁、山梅子。

土名：櫻桃仁、溫李仁。

来源与形态：屬薔薇科，为落叶灌木。茎高4至5尺，枝丛生，叶互生，橢圓形或广披針形，边缘有鋸齿。春季在叶間开白色或浅紅色小花，花落后結圓球形核果，果仁为白色。

主要产地：遵化、薊县、昌黎、涞源、易县、阜平、灤平、隆化、平泉、蔚县、怀安和张北县，以及唐山、秦皇島、承德市。

产季：在夏季产新。

采集与加工：葯用其果仁。将成熟的果实摘下，堆成堆，溫去果肉（注意翻动，防止果仁溫黑），再用杏仁机砸开硬壳，簸去皮及杂质，将仁晒干即可。

規格質量：仁成实，整齐，身干，无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。因其容易受虫蝕、返油，夏季应放于通风干燥处或冷藏室保管較好。

性能：味甘苦，微酸。破血、潤燥、泻气結、通大便，用

作利水消腫藥。治大腹水腫、面目四肢浮腫、便閉不通等症。

注：偽品楸仁，如不注意很容易和郁李仁混雜。但楸仁較郁李仁大而扁，不能供藥用。




1. 帶果實的枝 2. 生藥外形

香 附 子

別名：莎草、雀頭香、草附子、水莎、續根草、地賴根、水三棱、地毛、莎結。

土名：三棱草、莎草根。

来源与形态：屬莎草科，为多年生草本，自生于原野。茎通常单生，直立，三棱形，高約1尺余，表面光滑。叶由茎基部丛生，細长带形，頂端尖，全緣，有平行脉。夏季于茎頂分歧生穗，小穗綫形而扁，花呈赤褐色。其地下茎匍匐生长，先端有块茎，椭圆形，表面粗糙呈黑褐色，长3至4分，直徑約



1. 植物全形 2. 花序 3. 药用部分

2分左右。

主要产地：藁县、正定、束鹿、平山、衡水、徐水、涿县、定县、高阳、安国、邢台、涉县、磁县和內丘县。

产季：在秋季刨采。

采集与加工：药用其根茎。用鐮刨出后，去掉須根及泥土，放开水中煮熟（断面无粉渣，呈冰糖色即可）后捞出，晒至七、八成干，撞去須毛，再晒至足干即可。

規格質量：整齐均匀，外表光滑无毛，赤褐色，断面冰糖渣有光澤。

包装与保管：用麻袋包装。宜放干燥通风处保管，夏季須勤晾晒，防止生虫。

性能：性寒，味甘。治月經不調、气郁不舒、胸腹胀痛等症。

香 鈴 子

别名：椿、香椿、猪椿、紅椿。

土名：香椿鈴鐘、香椿子。

来源与形态：屬楝科，为落叶乔木，多栽培。茎高3至4丈，叶为羽状复叶，小叶对生，全緣，近似无叶柄，嫩时呈紅色，长椭圆形，頂端尖，有香味，可供食用。五、六月間开白色小花，花落后結果，秋季成熟后則自行裂开，种子黄褐色有翅，能飞散于他处。

主要产地：易县、定县、安国、涿县、邢台、內丘、涉县、遵化、昌黎、平山、正定、交河、滄县和吳桥县，以及唐山、秦皇島市。

产季：在秋季产新。

采集与加工：药用其果实。成熟后，用竹竿打落，摘去果枝，晒干即可。

規格質量：整齐不碎，色黄褐，无梗叶杂质。

包装与保管：用席包装。存放时防止受潮。

性能：性溫，味苦，无毒。治五淋，利小便。



1. 叶子形状 2. 带果实的枝

香 薷

土名：香茹。

来源与形态：唇形科，为一年生草本。全体密生绒毛，有香味。茎高2至3尺，多分枝，方形。叶对生，卵圆形或披针形，边缘有稀锯齿。夏季于枝端开白色或微紫色唇形小花，呈穗状花序。

主要产地：安国县。

产季：春播的七月采集；夏播的九月采集。

采集与加工：药用其带花的全草。用镰刀近地面将其全株割下，拣去杂草，晒干，捆成小捆即可。

规格质量：茎细，叶多，带花穗，无根，身干，纯净者佳。

包装与保管：扎捆，外面裹席。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：性温，味辛。为发汗散暑热、利湿消水肿要药。止鼻衄，对颜面浮肿、脚气水肿、霍乱腹痛、吐泻及口臭等有效。又可作香精原料。

附：种植方法

一、选地：香茹除碱地和低洼地外均宜种植，但需有水源条件。前茬以豆类或谷类作物为好。

二、整地：秋收后，在种香茹地内每亩撒土粪10,000至15,000斤作基肥，随之进行深翻。来年春季再复耕一遍，然后耙盖整平，作畦。畦的长、宽度以便于除草、施肥和浇水为原则。

三、播种：分春播与夏播。春播在清明至谷雨间；夏播在芒种前后（以春播者佳）。条播、撒播均可。条播：用铁耙在畦内按0.5尺行距划浅沟，然后将种子均匀撒入沟内，复土（约一指厚）后用脚踩严，随之浇水，每亩用种子1.5至2斤。撒播：在撒播前先浇水溼畦，经一、二日后进行撒种，复盖一指厚薄土，每亩用种子5至6斤。

四、田间管理：播种后每隔3至5天浇水一次，约10至20天即可出苗，以后掌握有草即除。因香薷易受菟丝子缠绕，须注意及时摘除。土壤显干即浇，以便经常保持土壤湿润。撒播的不用间苗，除草时结合中耕松土，苗高4至5寸时进行追肥，每亩追施硫酸40斤或饼肥80至100斤。

五、收获：与采集加工相同。

六、种子的采集：香薷系种子繁殖，应注意留种。当种子成熟后，拔其全株，晒干，打下种子，簸去杂质，然后装入袋内，放通风干燥处保存（要防止烟熏），以备来年种植。



植物上部枝叶的形状

苦 参

别名：地槐、野槐、苦骨。

来源与形态：属豆科，为多年生草本植物，自生于山野。



1.带花的枝 2.带果实的枝 3.生药外形

茎高3至4尺。叶为羽状复叶，小叶卵形。初夏茎頂开淡黄色蝶形花，呈总状花序。果实为荚果。

主要产地：易县、涞源、唐县、蔚县，怀来、龙关、薊县、遵化、昌黎、迁安、乐亭、正定、平山、新乐、内丘、涉县和邢台县，以及石家庄、唐山市。

产季：在春、秋两季刨采。

采集与加工：药用其根。用鎬将其刨出后，去掉残茎及泥土，晒干即可。

规格质量：身干黄白色，无杂质。

包装与保管：用席包装。放通风干燥处保管，防止受潮。

性能：性寒，味苦。为坚阴、泻火、健胃、驱虫药。

苦丁香 附：甜瓜子

别名：瓜丁、苦丁香。

土名：甜瓜蒂、香瓜蒂。

来源与形态：属葫芦科，多栽植于田园里，为一年生蔓性草本。茎有粗毛，叶腋有卷须。叶圆呈掌状浅裂，有不规则的粗锯齿，叶柄长。夏季由叶腋间抽花柄，花单生于顶端。花落后结浆果，形状不一，多呈长椭圆形，有数条纵纹。其蒂呈细圆柱形，稍弯曲；长寸许，黄绿或黄褐色。果实内有許多种子，色淡黄而扁平，表面有光泽。其瓜蒂为苦丁香。

产地：全省各地均产。

产季：在6至7月间产新。


采集与加工：当瓜成熟后，将瓜蒂摘下或用剪刀剪下，阴干，以备药用。成熟的瓜子（带瓢）也能供药用。

规格质量：瓜蒂身干带钉帽，黄绿色或黄褐色，整齐不碎，无茎，无杂质；甜瓜子成实，无瓢，身干，无杂质。

包装与保管：瓜蒂用席包装；甜瓜子用麻袋装。保管时宜放通风干燥处，防止受潮。

性能：瓜蒂味苦，性寒。为有效催吐药。治风痛、吐热

痰；甜瓜子味甘，性寒。为清肺，润肠药。用于治阑尾炎有效。




1. 植物外形 2. 种子 3. 瓜蒂 (药用部分)

独 活

别名：羌活、大活。

土名：走马芹。

来源与形态：属伞形科，为多年生草本，自生于山野。茎高3至4尺，直立，中空。叶互生，二回羽状复叶，小叶椭圆形，边缘有细锯齿，有叶柄，基部膨大成鞘状抱茎。秋季于茎顶开绿白色小花，呈复伞形花序，果实椭圆形，扁平。



1. 叶全形 2. 带果实的枝 3. 果实放大 4. 生药外形

主要产地：易县、涞源、蔚县、怀来、平山、正定、邢台、涉县和內丘县，以及石家庄、秦皇島、唐山市。

产季：在春季4至5月与秋季9至10月間刨采。

采集与加工：药用其根。用鐮将其刨出后，去掉残茎及須根，晒干即可。

規格質量：以条大，体肥，質坚实，外皮黄褐色，断碴黄白或黄褐色，香气浓厚，身干純淨者佳。

包装与保管：用筐包装。独活易受虫蛀，夏季須熏制，并放干燥通风处保管，防止受潮变質。

性能：性苦，微溫。为鎮痙、鎮痛药。对感冒、头痛、体痛、骨节疼痛、风湿痛等有效。并有发汗、利尿、消浮腫之功。

独 角 蓮

来源与形态：屬天南星科，为多年生草本，自生于湿地。茎高1至2尺。叶丛生，形大，具肉質叶柄，叶柄长5寸至1尺左右，呈紫色斑紋；基部寬广作鞘状，叶片在未开放时卷曲成棍状，开放后为长心脏形，长1至2尺，寬0.5至1尺，質厚而脆，无毛，上表面深綠色，下表面較淡，全緣或微呈波状。成年植株，每年于五、六月間花先由叶面开放，呈肉穗花序，外包佛焰苞。其地下茎呈卵形或长椭圆形，外表棕褐色，四周生許許多須根。

主要产地：迁安县及唐山市。

产季：在夏末秋初采集。

采集与加工：药用其根茎。刨出后，去掉残茎，然后进行加工。其方法与天南星加工相同。

規格質量：个大，整齐，質坚实，色白者佳。

包装与保管：用麻袋包装。放干燥通风处保管，勿使受潮发霉。

性能：主治恶疮、疔毒、癰癤或鼠疮等症。



1. 植物全形 2. 佛焰苞

茄 根

土名：茄子根。

来源与形态：屬茄科，为一年生草本。茎高1至2尺，多分枝。叶互生，卵形，頂端尖，边全緣或呈微波状，有叶柄。



1.带果实的枝 2.生药外形

夏季由莖上抽出花梗，開白色或紫色合瓣花。花落后結漿果，長圓形、橢圓形或圓球形，綠白色或紫色。

產地：全省各地均產。

產季：在霜降後採。

採集與加工：藥用其根。用鎬將根刨出後，去掉殘莖及泥土，曬干即可。

規格質量：圓柱形，整齊不碎，無雜質。

包裝與保管：用席包裝。保管時放通風干燥處，防止受潮。

性能：甘寒，無毒。為收斂藥。有利尿作用。

威 靈 仙

土名：鉄靈仙。

來源與形態：屬毛茛科，為多年生蔓性草本，自生于山野向陽地帶。莖長，多分枝。葉呈羽狀復葉，對生，小葉多為五片，卵圓形或橢圓形，頂端漸尖，全緣，有長葉柄。七月間于枝端或葉腋間開白色小花，呈圓錐花序。其根為許多細長圓柱形的須根着生于短小根莖上，根莖為暗褐色，密生堅刺，須根呈棕黑色，質堅韌不易折斷，如鉄絲。

主要產地：易縣、淶源、唐縣和阜平縣，以及保定市。

產季：在8至10月間採。

採集與加工：藥用其根及根莖。用鎬將根刨出後，去掉莖葉及泥土，曬干即可。

規格質量：疙瘩頭（根莖）小，色黑，根長而光亮，質堅實，無殘莖及泥土。

包裝與保管：扎捆。保管時放干燥通風處，防止受潮。

性能：味苦，性溫。有利尿、通經、鎮痛之效。治一切風寒濕熱、頭風頑痹、癥瘕積聚、黃疸浮腫、風濕痰氣、腰膝腿腳冷痛等症。



1.带花的枝 2.果实 3.生药外形

胡麻子

别名：亚麻子、鵝麻子、山脂麻子、胡脂麻子。

来源与形态：胡麻屬亚麻科，为一年生草本。茎高1至3尺，全体平滑无毛，圓柱形，上部分枝。叶互生，綫形或披針形，頂端漸尖，全緣，无叶柄。五、六月間开蓝色小花，呈聚



1. 植物形状 2. 花 (放大) 3. 果实 (放大) 4. 生药外形

伞状。果实为球形蒴果，熟时呈淡褐色。种子卵形，扁平，一端稍尖而略弯曲，表面黄褐色而有光泽。

主要产地：丰宁、围场、龙关、怀安和张北县。

产季：在秋季采集。

采集与加工：药用其种子。当果实成熟时，将果实摘下晒干，然后把种子搓下即可。

规格质量：籽粒成实，色黄褐光亮、纯净。

包装与保管：用麻袋包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味甘，性微温，无毒。内服可作润肠药及轻泻药；外用治烫伤、火伤，为软膏原料。

穿山龙

土名：狗山药。

来源与形态：属薯蓣科，为多年生缠绕性草本植物。地下茎横生，多肉质，呈圆柱形；地上茎细长，叶互生，卵形或广卵形，分三裂，中间裂片形大，两侧裂片较短。夏季开绿黄色小花，呈穗状花序。果实为蒴果，种子上部有膜状翼。

主要产地：涞源、易县、阜平、唐县、昌黎、迁安、遵化、兴隆、青龙、灤平、平泉和围场等县，以及秦皇岛市。

产季：在春、秋两季刨采。

采集与加工：药用其根茎。用镐将根刨出后，去掉茎叶、须根及泥土，晒干即可。

规格质量：条粗长，表面土黄色，质坚实。

包装与保管：用麻袋或筐包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：民间习用治腰腿痛。



1.带花的枝 2.果实 3.生药外形

齊 菜

别名：沙薺、薺糞。

土名：娘娘指甲。

来源与形态：屬十字花科，为二年生草本，多生于道旁。根出叶，丛生，平鋪地面，叶羽状分裂，裂片又作浅裂，有叶柄。第二年春抽茎，綠色，多分枝，茎上叶互生，箭形，基部抱茎，边缘有粗鋸齿，两面有細毛，茎頂与叶腋間开白色四瓣花。果实为短角果，三角形或倒心脏形，扁平。成熟时果实由



植物全形

下而上开裂，內生許多种子，細小长椭圆形。

产地：全省各地均产。

产季：在5至6月間采集。

采集与加工。药用其全草。将其全株拔下，去掉泥土，晒干即可。

規格質量：身干，色綠，純淨。

包裝與保管：用席包裝。保管時宜放乾燥通風處，防止受潮。

性能：味甘，性溫，無毒。為止血藥。治肺出血、子宮出血、流產出血及月經過多等症。

枳 實

來源與形態：屬芸香科，為落葉灌木。系我省新發現品。



1.花枝及果枝 2.果实剖开形状

种。枝条有許多銳刺，叶为三出复叶，小叶卵形或长椭圆形，叶柄有翅。春季开五瓣白色花，果实球形，青綠色。

主要产地：邢台县。

产季：在7至8月間采集。

采集与加工：药用其未成熟的果实。将其果实摘下，横着切开，曝日晒干即可；如遇雨天，可摊放于通风处阴干或烘干。

规格質量：身干，个均匀，内色白，外皮色青，肉厚无瓢。

包装与保管：用筐或麻袋包装。保存时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味苦，微酸，性寒。为芳香性苦味健胃药。治胃胀满，胃腸消化不良等症。

前 胡

来源与形态：屬伞形科，为多年生草本，自生于山野。茎高3至4尺。叶互生，羽状复叶，小叶又作羽状深裂，裂片卵圆形，全緣或呈不規則的浅裂，有长叶柄，基部較大而抱茎。秋季开紫黑色小花，呈复伞形花序。花落后結果实，如大麦粒。其根类似柴胡。

主要产地：内丘、邢台、涉县、元氏和蔚县。

产季：在春季刨采。

采集与加工：药用其根。用鐮将根刨出后，去掉茎叶及泥土，晒干即可。

规格質量：根粗大，質坚实，身干，无杂质。

包装与保管：用席包装。保管时宜放通风干燥处，防止受潮。

性能：味苦兼辛，性微寒。为解热、鎮咳、鎮痛、祛痰药。



1.花枝 2.花序 3.花放大 4.果实

卷 柏

别名：万岁、长生不死草、豹足。

土名：万年青、老虎爪、还阳草。

来源与形态：属卷柏科，为多年生隐花植物，自生于山地岩石上。茎匍匐生长，密生鳞片状小叶，呈长卵形，先端长而

尖銳。其生活力極強，乾燥後枝卷如拳狀，甚至干萎；移置陰濕處或洒水，即復活似出，故有“九死還魂草”之稱。

主要產地：蔚縣、邢台、涉縣、正定、平山、定縣、涿源、易縣、唐縣、平泉、青龍、興隆和圍場縣，以及承德市。


產季：在夏、秋兩季產新。

採集與加工：藥用全草。採集時把須根剪掉，去淨泥土，曬干即可。但去須根時，以不使全草散碎為原則。

規格質量：身干色綠，不散碎，無雜質。

包裝與保管：用席包裝。保管時宜放乾燥通風處，防止受潮發霉。

性能：味辛，性平，無毒。有止血之效。用於腸出血、痔出血、脫肛、尿血等症。



1. 植物全形 2. 葉放大

柿 蒂 附：柿霜

土名：柿盖、柿子把。

来源与形态：属柿树科，为落叶乔木。茎高2至3丈，春季生新枝叶，叶互生，椭圆形，有短柄。初夏开微黄色四瓣花，果实为浆果，初青绿色后渐变黄，扁圆形或椭圆形。成熟后，果蒂不落，逐渐萎硬，色赤褐。

主要产地：平山、邢台、涉县、内丘、定县、易县、藁县和兴隆县，以及石家庄、保定市。



1. 果实 2. 生药外形

产季：在冬季产新。

加工：柿蒂：当柿餅在加工时，将摘落的柿蒂收集晒干即可；柿霜：当柿餅加工时，削去柿的外皮，晾晒后，表面分泌一层糖液，再經冷冻，結成白霜，即为柿霜。

規格質量：柿蒂色赤褐不碎，身干純淨；柿霜洁白，无土及雜質。

包装与保管：柿蒂用筐或席包装；柿霜用木箱包装。保管时放干燥通风处，防止受潮。

性能：柿蒂味苦，性溫。治夜尿病等症；柿霜性寒，味甜，无毒。治咽喉痛、咳嗽咽干等症。

莖 莖 子

別名：千金菜、莖菜。

土名：莖莖、莖菜、莖莖菜。

来源与形态：屬菊科，为家种蔬菜类的一年或越年生草本。叶可供菜食用。莖高1至2尺，根生叶，呈椭圆形；莖生叶，形較短而抱莖，先端尖，裂开有白色粘汁。夏季莖的梢头分枝，开黄色花，作舌状花冠，并有白色軟毛。花落后結果实，內包种子，黑褐色，有稜角，呈不規則的圓形，似白菜子。

产地：全省各地均产。

产季：在秋季采籽。

采集与加工：药用其籽。当果实成熟后，用镰刀将全莖割下，晒干后，用木棒打下种子，簸去雜質即可。

規格質量：籽粒成实，黑褐色，身干无雜質。

包装与保管：用布袋或双层麻袋包装。保管时放干燥通风处，夏季应多晾晒，以防虫蛀。

性能：味苦，性寒。为下乳、利尿、止血、消阴肿药。



1. 植物形状 2. 花、叶

韭菜籽附：野韭菜籽

别名：起阳草籽、个人菜籽、长生韭籽。

来源与形态：韭属百合科，为多年生宿根草本，为蔬菜之一。有野生和家种两种，我省家种为多，均供菜食用或药用，



1. 植物全形 2. 花序 3. 药用部分

但药用其籽较多。春季叶丛生，细长而扁平，长尺许，色青绿；夏季抽茎，顶上开白色小花，呈伞形花序。花落后结三棱形小果实，内包有扁平黑色种子。野韭菜籽自生于山野，其形态与上相同。

产地：全省各地均产。

产季：籽于秋季产新。

采集与加工：

当种子成熟后，用手捋下，搓去外皮，簸去杂质，晒干即可。

规格质量：籽粒成实，身干，色黑有光泽，无杂质。

包装与保管：

用麻袋包装。保管时宜放干燥通风

处，防止受潮。

性能：味甘酸，性温。为兴奋、强壮、健胃药。能治泻痢、多尿、遗精、疝痛等症。地下茎又有止血作用。

桔 梗

别名：梗草、利如、苦梗。

来源与形态：属桔梗科，为多年生草本，自生于山野向阳的地方。春季生苗，茎高2至3尺，全株光滑无毛，茎中下



1.带花的枝 2.生药外形

部叶对生或三、四片輪生，呈卵形，邊緣有鋸齒；茎上部叶漸小，呈披針形或长橢圓形，互生。夏秋間由茎頂端开青紫色或白色紡錘形花，花落后結球形蒴果。其根肉質，呈紡錘形，下部漸小，略弯曲，偶有分枝；根上端有蘆头，將外皮剝去后呈白色或黃白色，断面白碴中央有黃心，俗称“菊花心”。

主要产地：易县、涞源、阜平、定县、邢台、内丘、涉县、平山、新乐、正定、藁县、遵化、迁安、昌黎、龙关、平泉、围場、隆化和丰宁县，以及唐山、秦皇島、承德、保定市。

产季：在夏、秋季刨采。

采集与加工：药用其根。用鐮刨出后去掉秧苗，洗淨泥土，趁湿剝去外皮，晒至八成干，然后用手將其根捋直，再晒至足干即可。

規格質量：一般不分等級，长3至7寸，粗（直徑）2至5分，色白，質堅实，断面有菊花心，身干不霉。

包装与保管：用筐包装。夏季易生虫，保管时宜放干燥通风处或冷藏較好。

性能：味苦，性溫。宣肺气、散风寒，能載药上行。可用为祛痰、鎮咳药。

注：伪品白馬肉与桔梗相似。但白馬肉色黃发柴、質韌，断面无菊花心。

荆 芥附：芥穗

别名：京芥、姜芥、胡荆芥。

来源与形态：屬唇科，为一年生草本。我省有野生、家种两种，以野生为多。春季抽茎，直立，高2至3尺，方形，色紫綠，分枝很多。叶对生，羽状深裂，小叶呈披針形。夏季由叶腋間和枝茎上部开淡紅色唇形小花，作穗状花序，穗长2寸左右，全草芳香。家种和野生均供药用。

主要产地：易县、涞源、唐县、藁县、平山、正定、安



1.带花序的枝 2.叶

固、兴隆、灤平、青龙、平泉、迁安、内丘和涉县，以及承德、秦皇島市。

产季：在秋季产新。

采集与加工：药用全草。在离地面半尺高处用镰刀将其全株割下，去掉老梗，晒至七成干，捆成小把，再放在通风干燥

处阴干，即称“全荆芥”。入药又分为荆芥梗、荆芥穗。

规格质量：全荆芥梗、叶、穗俱全，色紫绿，无根和老梗，身干，味芳香；荆芥穗净穗无梗、叶，身干色灰绿，不霉，味芳香。

包装与保管：荆芥梗扎捆，荆芥穗用筐或席包装。保管时均放干燥通风处，防止受潮。

性能：味辛，性温。为发汗驱风药，治感冒头痛、疮毒等症。

注：1. 安国县家种荆芥与野生荆芥在外形上略有区别：家种者穗长约5至7寸，码稀（指花间距离）、茎细、分枝多；野生者穗短，长约2至3寸，码密、茎粗、分枝少。

2. 伪品山荆芥与野生荆芥形状相似，但山荆芥秧苗矮、穗扁，有一种特臭臭味，不能入药用。

附：种植方法

一、选地与整地：荆芥适于在沙质土壤种植，并有水源条件。一般在秋收后将留地进行深耕（深度6至7寸），同时施基肥（圈肥）万斤以上，并翻入土内。来年夏至节前复耕一遍，深5至6寸，整平作畦（畦宽3尺、长按地形而定）。

二、播种：荆芥系用种子繁殖，在夏至播种。播种前首先在作好的畦内用耢子开沟，行距6寸左右，深2至3寸，顺沟将种子撒播沟内，复土浇水，六、七天即可出苗。每亩播种量1至1.5斤。

三、田间管理：幼苗出土时，防止浇水，以免将小苗灌死。苗高2至3寸时进行锄草，宜浅锄或用手拔，并视其干旱情况及时浇水，以便经常保持土壤湿润。

四、除虫：幼苗生长期间，要注意螻蛄咬伤根部，并应经常检查苗的生长情况。如发现害虫（多是螻蛄），可用六六六粉二两、麦麸一斤、加香油拌合一起，撒在地面，即可除治螻蛄为害。另外还须防止菟丝子蔓的伤害。

五、收获：秋分前后，当荆芥半花半籽时，用镰刀割下，将穗剪下或用鋤刀截下的为芥穗，其梗为芥梗。但繁殖种子的全株，应留在地内使其继续生长，待种子成熟变黑时，连根拔掉，鋤下穗部，打下种子，晒干，储藏干燥处，并防止烟熏，以备来年种植。

党 参

别名：辽党、台党。

来源与形态：属桔梗科，为多年宿根草本植物，自生于大山林或阴阳坡的地方。我省张家口已引为家种，但仍以野生为多。春季由宿根生茎，高3尺，沿地蔓生或缠绕其它植物而生。枝叶繁茂，生长稠密。叶单生，有长柄，卵形，边缘有浅锯齿，上下两面均有软毛。夏季由叶腋间开花，呈甬状，浅绿色，并有紫色斑纹。花落后结蒴果，圆锥形，成熟时裂开，内含许多小圆形种子，褐色，有光泽。其根长1尺左右，圆柱形，顶端有较膨大的根头，外皮淡棕色，粗糙，并有明显的横纹，质坚实。

主要产地：易县、涞源、阜平、平山、隆化、围场、兴隆、青龙、平泉、灤平、蔚县、龙关和涉县，以及承德市。

产季：在白露后至封冻前刨采。

采集与加工：药用其根。用镐将根刨出后，去掉苗和泥土，晒至六成干时进行随晒随用手搓，使其肉质坚实；晒到八成干时捆成圆锥形的小捆，再晒至足干即可。

规格质量：一等长8寸以上，粗（直径）三分以上；二等长短粗细不限，但粗度在一分以下的不生产（即不收购），使其继续生长。

以上各等均须身干，肥壮，外皮粗糙，淡褐色有横纹，质坚实。

包装与保管：用箱包装。箱内外用毛头纸糊好，外涂猪血晒干，然后将党参按顺序装好，把箱盖钉严，再用猪血封固，

以防生虫。另外用筐装的，須用硫磺熏制，儲藏于低溫干燥处或用沙土埋藏。

性能：味甘，性平。为补脾胃、生津液，还可作强壮药，治一切衰弱症。



1.带花的枝 2.生药外形

秦 艽

别名：秦胶，大艽。

土名：攪根子草、左扭、小渠霜。

来源与形态：屬爵床科，为多年生草本，自生于山野。茎高6至8寸，多丛生。叶互生，长披针形，柄短或无柄，頂端尖，叶脉五条，中間一条突出明显，全緣或微带波状。六月間于茎頂开紫色花，呈聚伞花序，花冠直立，筒状，頂端五裂。花落后結果，內包許多种子，暗褐色，长椭圆形。其根略呈圓錐形。扭曲不直，并有向左方扭曲的縱紋，故俗称“左扭”。

主要产地：蔚县、涞源、易县、阜平、丰宁和围場县。

产季：在春、秋两季刨采。春季从見苗起至夏至止（苗高2寸止收）；秋季从白露起至封冻止。

采集与加工：药用其根。用鐮将其根刨出后，去掉残茎及泥土，随之用水浸泡（最迟不得过第二天，否則黑皮泡不下来）半小时。捞出后，搓去黑皮，晒至六、七成干，堆垛苫好悶一夜，第二天分等捆成約半斤重的小捆，再晒至足干即可。

規格質量：一等长5寸以上；二等长在5寸以下。以上規格均須肥大，質堅实，色黃，不带黑皮，身干。

包装与保管：用筐包装。保管时放干燥通风处，夏季应多晾晒，防止发霉。

性能：味苦，性平。散风湿，治痹痛，用作风痹药。



植物全形

秦 皮

土名：山核桃櫟。

来源与形态：屬木樨科，为落叶乔木，自生于山野。茎高丈許，大树分枝，小枝有細軟毛。叶对生，呈奇数羽状复



1.带果实的枝 2.生药外形

叶，小叶无柄，广卵形或长卵圆形，尖端中央小叶特别宽，先端渐尖，边缘有钝锯齿；叶背面初生有软毛，老时平滑无毛。花生于枝顶端或叶腋间，呈圆锥花序，广钟形或杯状，花落后结果实。树皮深灰色带白斑，光滑略有浅裂。

主要产地：阜平、涞源、易县、平山、藁县、迁安、涉县、邢台、青龙、兴隆和灤平县，以及承德、秦皇島市。

产季：在春、夏、秋三季采集，以春季为好。

采集与加工：药用嫩茎皮。一般是将第二年生的树枝茎皮用刀剥下，晒干即可。

规格质量：为卷筒状嫩茎皮，身干，不霉，外皮灰色带白斑点，内面黄褐色，无杂质。

包装与保管：扎捆，外面包席。储藏干燥处，防止受潮，以免发霉变质，失去药效。

性能：味苦，性寒。为泻热、明目、止痢药。又用作洗眼、泻痢药。

柴 胡

别名：北柴胡、芑胡。

土名：黑柴胡、山根菜。

来源与形态：属伞形科，为多年生草本，自生于山野。茎高2尺，丛生，上部多分枝。叶互生，狭长披针形，顶端渐尖，全缘，无叶柄，似竹叶。夏季于叶腋间抽花梗，开黄色小花，呈复伞形花序。其根为圆锥形，多分枝，表面粗糙，深褐色，或红褐色。

主要产地：易县、涞源、阜平、涉县、邢台、内丘、平山、正定、新乐、藁县、迁安、蔚县、怀来、龙关、平泉、隆化和灤平县，以及唐山、秦皇島、承德市。

产季：在春、秋两季刨采。

采集与加工：药用其根。用镐将根刨出后，去掉茎叶及泥土，晒干即可。



1.带花的枝 2.根部 3.生药外形

规格质量：主根粗大，杈根少，芦头长不超过5分，无杂质。


包装与保管：用筐装或扎包。保管时放干燥通风处，防止受潮发霉。

性能：味苦，性平。疏肝、开郁和解表。用作升阳解热药，又为瘧疾之要药。

胡桃仁 附：分心木

土名：核桃仁。

来源与形态：核桃树屬胡桃科，为落叶乔木。茎高1至2丈，叶为奇数羽状复叶，小叶五至七片，广卵形，叶面光滑，背面密生絨毛。夏初叶腋間开淡黄色的花，呈穗状花序。果实



1.带雄花序的枝 2.带雌花序的枝 3.果实 4.生药外形

为核果，圓球形，如青桃状。內有核，核壳淡褐色質坚硬，有深陷不規則的皺紋。剖开里面有黃白色核仁被“分心木”間隔，含有油性。

主要产地：邢台、涉县、內丘、薊县、遵化、迁安、易县、涞源、阜平和平山县。

产季：于白露采集。

采集与加工：药用其核仁及分心木。成熟后用竹竿将果实打下，漚烂皮肉，将核砸开取其核仁。

規格質量：淨仁，无皮，无虫蛀，不返油者佳。

包装与保管：用木箱包装。胡桃仁易返油虫蛀，立夏前須儲于冷室內。

性能：味甘，性平。为滋补强壮药。有緩和、鎮咳及收斂之效。

桃 仁

来源与形态：桃树屬蔷薇科，为落叶乔木。茎高丈許，叶互生，长椭圆形或披針形，頂端尖长，边緣有細鋸齿，叶柄短。三、四月間先开花后生叶，花呈粉紅色。花落后結卵圓形或略扁的果实。果皮肉質，味甜可食，外表有絨毛，种核（內果皮）質坚，砸开核壳，里面有一粒紅褐色长扁圓形种子，表面有沟紋。

产地：全省各地均产。

产季：在秋季产新。

采集与加工：药用其种子。加工方法与杏仁相同。

規格質量：大扁（大桃仁）个大整齐，卵圓形略扁，长4分以上，寬3分以上；小滾子（小桃仁）个兒小于大扁，卵圓形不扁，不太整齐。以上均要求外皮紅褐色，粒充实飽滿，不返油，无核壳，碎瓣不超过10%。

包装与保管：用麻袋包装。桃仁易遭虫蛀，保管时須放干燥通风处，夏季以硫磺熏制。

性能：味苦，性平。为破血、行瘀、潤燥、通便药。



1.带果实的枝 2.花 3.生药外形

臭燕萁

来源与形态：燕萁是用山扁榆树子加工而成，我省安国县已有数十年的加工习惯。山扁榆树属榆科，为落叶乔木，自生于山野间。形如榆树，叶互生，椭圆形，顶端尖，边缘有重锯齿，似榆叶，但比其圆而厚。四月间生小花，果实扁圆，大6至7分，有膜状翅，中间含有一粒扁平的种子，似榆钱子而大，气臭如狐。

主要产地：涑源、蔚县和內丘县。

产季：在5至6月間采集。

采集与加工：药用其种子。当果实成熟后，用手捋下，拣去杂质，晒干，搓去膜翅，将种子浸入温水或面湯中。約一周左右，种子即发酵，随之加入榆皮面（家榆树皮面，因其粘性大无毒）、多年紅土及菊花（比例是榆皮面10%，蕪荑子55%，紅土30%，菊花5%），并加水混合均匀，攤于席上約3至4分厚，切为2寸見方小块，晒干即可。

規格質量：方形色暗紅，籽多，身干，体輕。

包装与保管：用木箱包装，內垫紙，并封閉严密。保管时放干燥通风处，防止受潮。

性能：性平，味辛。能散风湿，消虫积。用为小兒杀虫、消疳药。

夏 枯 草

别名：鉄色草、筋骨草、猪屎草。

土名：白花草。

来源与形态：屬唇形科，为当年生草本植物，自生于山野。春季由宿根生茎，方形，高尺許。叶对生，长椭圆形或披針形，有細鋸齿。初夏由叶腋間和茎頂生白色或紫色唇形花，呈穗状花序；夏季自枯死，故有“夏枯草”之称。

产地：全省各地均产。

产季：在夏初采收。

采集与加工：药用其全草。当半花时将全草用镰刀割下，阴干即可（注意翻动，以免发霉）。

規格質量：全草身干，不霉，无杂草。

包装与保管：扎捆，外面包席。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味苦，性寒。清肝火，治療癰等症。



1. 植物全形 2. 花及苞片 3. 花冠剖开
(示雄蕊及雌蕊)

徐长卿

来源与形态：属萝藦科，为多年生草本植物，野生于山坡草丛中。茎直立，高尺许，细而坚韧，节间较长。叶对生，有短柄，叶片狭，呈披针形至线形，两端渐尖，边缘略反卷。夏



1. 植物全形 2. 果实 3. 花全形

季由茎端和叶腋間抽枝，开淡黄綠色小花，呈圓錐花序。其根丛生于地下，細长，褐色，有香味。

主要产地：涞源、易县、迁安、灤平、兴隆和青龙县。

产季：在春、秋两季刨采。

采集与加工：药用其根。用鎬将根刨出后，去掉泥土，晒干即可。

规格质量：身干，色灰褐，无杂质。


包装与保管：用筐包装。保管时防止受潮。

性能：味辛，性温。治腹胀、臌症和牙痛等症。

陈 皮

别名：黄橘皮、柑皮、广陈皮。

土名：橘子皮。



1. 果实 2. 药用部分

橘子在我省尙无种植。但历年購进橘子很多，每年收集的橘子皮即达20至30万斤，既增加了群众收入，又供应了药用需要，同时也降低了药品成本。因此，注意收集橘子皮，是很必要的。将收集的湿橘皮或干橘皮，都必须用淨水冲洗二至三次，晒干或烘干即可。

規格質量：片大不碎，色紅黃，身淨。

包装与保管：用席包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味苦，性溫。为健胃药。对鎮咳、祛痰、鎮呕、利尿有效。

馬蘭子 附：馬蘭花

別名：馬萱子、馬帚子、馬薤子、鉄扫帚子。

土名：馬蓮子。

来源与形态：馬蘭屬鳶尾科，为自生的宿根草。春末叶在宿根丛生，細长而厚，略迭，长尺許，有中筋，基部呈鞘状。夏季抽茎，直立，高6至7寸，茎端开紫色六瓣花，呈甬状。花落后結圓三棱形长棒果实，内包有赤褐色扁形种子。

产地：全省各地均产。


产季：在3至4月間采花，5至6月間采子。

采集与加工：药用其子和花。当花开放后摘下阴干（防止露水淋湿）；籽成熟后摘下果实晒干，将种子搓出，簸去杂质。

規格質量：花身干色紫，不碎，无杂质；籽赤褐色，粒成实，无土，身干。

包装与保管：花、籽均用麻袋包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮发霉。

性能：味甘，无毒。花为利尿、治淋疾、解諸毒药；籽能泻湿热，治小腹痛气痛。



1. 植物全形 2. 药用部分

馬鞭草

别名：鉄馬鞭、狗牙草、凤頸草。

土名：狗鞭子、馬鞭子。

来源与形态：屬馬鞭草科，为多年生草本，自生于山野。茎方形，叶对生，多呈深三裂，有鋸齿和粗毛，近似无柄。夏、秋季間开紫色或蓝色小花，呈穗状花序。

主要产地：邢台县。

产季：在夏季产新。

采集与加工：药用全草。当半花半籽时，将全草割下，阴干即可。



1.花枝 2.花

規格質量：全草身干，色綠，无雜質。

包裝与保管：扎捆。保管時宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味苦，性寒。为破血、通經、消脹藥。

馬兜鈴 附：天仙藤

別名：兜鈴苗、兩金藤、王黃瓜。

土名：臭蘆葫、臭鈴鐘。

來源與形態：屬馬兜鈴科，為多年蔓生草本植物。春季生苗，莖細而嫩，多纏繞樹木而生。葉互生，呈心臟形，背面粉白色，有軟毛，葉柄長。葉、莖都有一種惡臭的氣味。夏季在葉腋間開角形黃色花，花落后結果實，向下垂，呈倒卵圓形，外皮綠褐色，里面包着許多褐色扁平的種子，似榆樹籽。其果實稱馬兜鈴，莖蔓稱天仙藤。

主要產地：平山、新樂、灤平、興隆、磁縣、涉縣、邢台、蔚縣、懷來、龍關、昌黎、遷安、遵化、涿源、易縣、唐縣和阜平縣，以及唐山、秦皇島市。

產季：在秋季采收。

採集與加工：藥用其果實和莖蔓。當果實已成熟尚未破裂前進行采收，然後攤開（單層）晾曬，並輕輕翻動。但要防止曝曬和露水浸濕，以免變色或發霉。莖蔓可用鐮刀割下，曬干即可。

規格質量：兜鈴身干，不碎，綠褐色，不霉；天仙藤身干，無雜草。

包裝與保管：兜鈴用箱或筐包裝；天仙藤扎捆。保管時放通風干燥處，防止受潮。

性能：味苦，性寒。兜鈴為鎮咳，祛痰藥。治喘息、咳嗽失音、咯血，外用治痔出血和肛門周圍腫脹等症；天仙藤為利尿藥。治妊娠水腫、疏血止痛。




1.带花的枝 2.果实

馬 齒 莧

別名：馬莧、长命菜。

土名：馬升菜。

来源与形态：屬馬齒莧科，为一年生草本，自生于荒地或沟旁。春季生苗，多平臥地面，茎肉質光滑，无毛，微赤色。小叶对生，頂端輪生，边全緣，无柄。夏季由叶腋間开黄色五



1. 带花的枝 2. 蒴果

瓣小花，花落后結果实，內包有种子，色黑。

产地：全省各地均产。

产季：在夏季采收。

采集与加工：药用全草。当半花时，用镰刀或手将全草采下，去根，用开水燙或鍋蒸后，再进行曝晒。八成干时捆成小把，再晒至足干即可。

規格質量：身干整齐，无老根和杂质，不霉。

包装与保管：用席包装。放干燥通风处保管，夏季易吸收水分，应及时晾晒，以防发霉。

性能：味酸，性寒。泻热、治恶疮。为解毒、散血药。

馬 勃

别名：馬包、灰包、馬尼菌。

土名：馬粪包、药包。

来源与形态：屬埃覃科，是一种菌生。夏季生长在山林、草原、坡崗、阴湿地带。初生呈球形，如馬粪，色白，无根，无叶。长大干燥后，外面暗褐色，質輕如棉花，非常柔軟。熟透以后，触之有尘烟，个大小不等。

主要产地：张北、龙关、怀安、平山、邢台、涉县和內丘县。


产季：在秋季产新。

采集与加工：馬勃全体供药用。但采收季节性很强，过早皮白不熟；过晚熟透成粉烟，不能供药用。因此，視其皮发黄褐色即可收集，曝日晒干即可。

規格質量：个大粉足，暗褐色，不碎，內含如棉絮粉末，質松者佳。

包装与保管：用木箱包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味辛，性平。清肺火，疗喉痛、开音、止血。



生药全形

桑白皮


附：桑枝、桑叶、桑椹

别名：伏蛇皮、馬額皮。

来源与形态：桑树属桑科，为落叶乔木，自生于山野或栽培。叶卵形或广椭圆形，边缘有粗锯齿，叶片分裂或不分裂，有短叶柄。春末开单性小花，色黄绿，呈穗状花序，有雌雄花之分。花落后结球形或椭圆形的小浆果，成熟后变紫黑色。

主要产地：涞源、易县、阜平、定县、唐县、邢台、内丘、涉县、正定、平山、元氏、遵化、薊县、迁安、青龙、兴隆、平泉、灤平、吴桥、河间和静海县，以及唐山、承德市。

产季：在春季采嫩枝，秋末（霜降）采叶，春、秋采皮，夏季采桑椹。



1. 植物形状 2. 树皮 3. 果实

采集与加工：药用桑皮、桑枝、桑叶、桑椹。桑枝用刀割下；桑叶、桑椹采下；桑皮是色白皮（十年以上的嫩皮），用铜刀剥下为宜。以上各种均晒干即可。

規格質量：皮片大肉厚，色白，身干，无老皮；枝嫩无杈叶，无老枝，身干，色黄不碎，无杂质；椹粉红色，不霉烂。

包装与保管：桑枝、桑皮用繩打捆，外包席；叶用席包装；桑椹用麻袋包装。枝、椹夏季易生虫，应儲藏干燥通风处，并經常检查晾晒，以防虫蝕、发霉变质。

性能：皮、叶味苦，性寒。皮为利尿、鎮咳药，嫩枝和叶熬膏服，治高血压。椹清凉、止咳、利尿、消肿。

桑寄生

别名：寄屑、桑上寄生、桑生。

土名：呱呱草、冻青。

来源与形态：屬桑寄生科，寄生于桑、榆、楊、柳等树上。根生在树的枝杈中，高2至3尺。叶椭圆形，質厚柔軟，叶面青有光澤，背面色淡紫而有軟毛。自生枝叶，五、六月間开白花，七、八月間结实，色紅似小豆。秋后百叶齐落，唯有寄生虽經严寒枯黄而不死。据传记桑寄生系鳥吃草籽后把粪拉在树杈裂縫上，經夏季湿润而复生繁殖。

主要产地：涞源、易县、青龙、平泉、隆化、灤平、迁安和遵化县，以及承德、秦皇島市。

产季：在冬季采集。

采集与加工：药用其全草。用斧刀将树上的桑寄生砍下，阴晾七、八成干时捆成小把，再架起阴晾至足干即可。

規格質量：全草身干，青綠色，不带木性疙瘩者佳。

包装与保管：扎捆，外面包席。存放干燥通风处，夏季应經常晾晒，防止受潮。

性能：性平，味苦。有驅风湿、健筋骨、安胎作用。治孕早期腰痛有效。



植物全形

茯 苓

别名：伏兔、不死面。

来源与形态：屬多孔菌科，为地下菌生植物。是我省新发现品种，产于山林地带，多寄生在松根上。地上无苗，地下呈

不規則的球块。

大者重数斤、小者如拳，外皮黑褐色而皺縮，似瘤状，断面白色或淡赤色两种。白渣为白茯苓，赤色为赤茯苓，都供药用。

主要产地：

兴隆和青龙县，以及承德、唐山市。

产季：一年

四季均可采集。

采集与加工：

茯苓多生于老油松树根底下，地上无苗。

刨时看浮土形状



植物全形

凸起而不长草，发现后即可深刨，刨出去淨泥土，晒干即可。

规格质量：身干粉多，質細，断面白色或赤色，但以白色者为好。

包装与保管：用麻袋包装。保管时宜放干燥通风处。

性能：味甘，性平。为利尿药。治水肿、淋疾、安神、鎮靜。

草 烏

别名：两头尖、奚毒、金鴉。

土名：芽草、药羊蒿、芽子。

来源与形态：属毛茛科，为多年生草本，自生于山野阴坡



1.带花的枝 2.生药外形

間。莖直立，高2至3尺左右。單葉互生，葉片呈掌狀深裂，裂片又為二至回深裂，邊緣有不規則的粗鋸齒。下部葉有柄，上部葉近似無柄，葉質略厚。秋季開紫色小花，呈總狀花序。根圓錐形，下端狹長，大小不一，外表茶褐色，有縱皺紋，質堅硬，不易折斷，斷面白色或淡黃色，有毒性。

主要產地：涞源、易縣、懷來、蔚縣、青龍、圍場、灤和平泉縣，以及承德市。

產季：在秋季產新。

採集與加工：藥用其根塊。用鐮刨出後，去淨苗須、泥土，曬干即可。但草烏含有毒質，禁止用口嘗。

規格質量：身干整齊，皮黑褐色，斷面白澁，獨根無須和雜質。

包裝與保管：用麻袋或筐包裝。存放於干燥通風處，防止受潮發霉。

性能：味辛，性溫。治腹痛、胸痛、頭痛和關節痛等症。

茜 草

別名：茅蒐、茹蘆。

土名：高麥、牛夕先、駱籠頭。

來源與形態：屬茜草科，為多年生蔓性草本。春季自宿根抽莖，呈方形，中空，有倒生刺。葉長卵圓形，邊緣有細刺，四葉輪生，葉柄長。秋季由莖端葉間開淡黃色小花，花落后結漿果，可食用。其根細長而多，色紅黃或紅褐。

產地：全省各地均產。

產季：在春、秋兩季採。

採集與加工：藥用其根。用鐮將根刨出後，去掉秧苗和泥土，曬干即可。

規格質量：身干，色紅褐，整齊，無雜質。

包裝與保管：用筐包裝。保存時放干燥通風處，防止發霉變質。

性能：味苦，性寒。为通經、行血药。并有利尿作用。



1.带花的枝 2.生药外形

益母草 附：茺玉子

别名：益明、野天麻、貞蔚、坤草。

土名：四棱蒿、益母蒿。

来源与形态：屬唇形科，为草本植物，自生于原野湿润地方。春季生苗抽茎，茎高3至4尺，四棱形，有縱沟紋，每节叶对生，呈掌状分裂，三片至数片；茎端叶較小似艾叶，色綠。夏季由叶腋間輪生淡紫色唇形小花，一花常結四子，称为茺玉子，色黑有光澤，粒小似芝麻。



1.带花的枝 2.叶 3.花(放大) 4.种子(放大)

产地：全省各地均产。

产季：在夏季收草，秋季采子。

采集与加工：药用其全草和种子。当花开放时，用镰刀将全草割下，去掉下部老梗，阴干即可。秋季成熟后，把全株割下晒干，再用木棍将种子打下，簸去杂质，晒至足干即可。

规格质量：草绿色，嫩茎叶，带花全草，身干不霉，无老梗；籽灰褐或黑色，成实，身干无杂质。

包装与保管：草扎捆；籽用麻袋包装。存放干燥通风处，以防发霉变质。

性能：味辛，性寒，为通经、调血药。籽味辛，性温，为利尿药。治水肿等症。

浮萍草

别名：九子萍、水苏、浮藻。

土名：水萍草。

来源与形态：属浮萍科，为一年生草本，自生于池塘深水中。多是三叶相集而生，浮生在水面上，叶略圆呈扁平形，大2至3分，光滑，背面紫红色。叶下须根很多，夏季开淡绿色的小花。

主要产地：高阳、邢台、霸县、玉田、怀来、衡水和蔚县，以及承德市。


产季：在夏季产新。

采集与加工：药用全草。采集时用漏水工具（如筛子、笊篱等）将浮萍由水中捞出，去净杂草，晒干即可。但须勤翻动，以免霉烂。

规格质量：叶片大，整齐，面青，背紫色，身干，无杂草。

包装与保管：用席包装。保管时放干燥通风处，防止受潮发霉。

性能：味辛，性寒。为发汗、利尿药。治热性病、无汗、斑疹、痘疮、水肿等症。



植物全形

鬼 箭 羽


别名：鬼箭、卫矛、神箭。

土名：鬼箭。

来源与形态：属卫矛科，为落叶灌木，自生于山野。茎高丈许，分枝很多，略称四棱形，色绿；茎的两侧有羽状突出，似雕翎箭。叶对生，椭圆形或广披针形，边缘有细密锯齿，叶

面深綠色，背面淡綠色；秋季叶色則變紅，美麗可觀。夏季開黃綠色的小花，花落后結蒴果，橢圓形，綠色或紫綠色。成熟后裂開，有種子一粒。

主要產地：易縣、淶源、龍關、薊縣、內丘、涉縣、邢臺、平山、正定、遷安和遵化縣，以及秦皇島市。



1. 帶果實的枝 2. 莖部形狀

产季：在夏、秋两季采收。

采集与加工：药用其嫩细枝。将嫩细枝用刀砍下，晒干即可。

规格质量：嫩细枝长2至3尺，四棱形，羽翎显著，色绿，身干无叶。

包装与保管：扎捆。存放干燥通风处，防止受潮。

性能：味苦，性寒。为通经、驱虫药。治产后瘀血、妇人经闭等症。

茵 陈

别名：白蒿、因尘、芪蒿。

土名：小白蒿。

来源与形态：属菊科，为多年生草本，自生于原野、路旁。



植物全形

春季苗由根丛生，叶互生，细长呈丝状，密生白软毛，似胡蘿蔔叶。茎高2至3尺，夏、秋季在茎梢开白色小花，作穗状花序。花落后结种子，黄褐色。

产地：全省各地均产。

产季：在春季产新。

采集与加工：药用其嫩全草。当春季苗高1至1.5寸时，用镰刀近基部割下（不要散苗），拣去杂草，当日晒干为好。但茵陈季节性很强，如生梗即不宜入药，故有三月茵陈，四月蒿，五月当柴烧之说（指旧历）。因此，刨采时应注意季节。

规格质量：嫩全草灰白色，苗不散，身干整齐，无梗，无杂草。

包装与保管：用席包装。保管时防止受潮发霉。

性能：味苦，性平。为利湿、解热药。治黄疸等症。

狼 毒

别名：狼青草。

土名：大猫眼睛、狼青草。

来源与形态：属大戟科，为多年生宿根草本植物，自生于山野干燥坡面地方。茎高2尺左右，茎下部叶呈鳞片状，基部复瓦状而密集；茎上部3至5叶轮生，长圆或长卵形，先端略尖，全缘、平滑。秋季开黄色花。其根肥大，内质含有大量的白色乳汁，皮色黄，断面有黄、白相隔的环纹，毒性剧烈。

主要产地：涑源、易县、蔚县、怀安、平泉、围场、丰宁和隆化县。

产季：在春、秋两季刨采。

采集与加工：药用其根。春季从化冻后开始到苗高4寸止；秋季当叶枯黄开始至封冻止。刨采时用镐深刨，将刨出的根去掉残茎和泥土，趁鲜用刀切成2至3分厚的片，摊在席上晒干即可。但狼毒含有毒汁，勿沾在手上，以免中毒。

规格质量：身干，片大肉厚；外皮红黄色，断面淡黄色，



1. 植物全形 2. 生药外形

有黄白相隔的环纹。

包装与保管：用筐包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味辛，性平，有剧毒不可内服。外治皮肤疥、癣、恶疮等症；又有除治农作物害虫的作用。

透骨草

来源与形态：屬毛茛科，为蔓性草本植物，自生于道旁。我省民間葯用习惯有二种，又分軟苗和硬苗，以透骨草为多。軟苗：茎高5尺至1丈左右，攀援而生。叶对生，呈二回三出复叶，二裂或三裂，中間小叶片特別狭长而尾尖，由叶腋間生



图一 1.带花的茎、叶 2.果实

聚伞状花序，白色。花落后结瘦果，扁卵形，似芝麻粒而短，赤褐色，花柱细长，有羽状白色细丝毛。如图一。硬苗：茎高2至3尺，叶如柳叶，边缘，枝干很硬，象小灌木，如图二。药用以图二的为多。

产地：全省各地均产。

产季：在夏、秋季间采集。

采集与加工：药用全草。用镰刀将其全株割下，晒干即可。

规格质量：全草，青绿色，身干不霉。

包装与保管：扎捆，外面包席。保管时宜放干燥处，防止受潮发霉。

性能：味甘，性平。治风湿、筋骨疼痛等症。



图二 植物形状

黃 著

別名：戴槿、菱草、百本。

來源與形態：屬豆科，為多年生草本，自生于山野沙地。莖高2至3尺，多近地面蔓生。葉為奇數羽狀復葉，小葉卵圓形，上表面平滑，下表面生白色絨毛。夏、秋季間開淡黃色小蝶形花，作總狀花序。花落后結莢果（如毛豆角），內包有黑色扁平小種子。

主要產地：張北、蔚縣、易縣、涿源和平山縣。

產季：春季由化凍起至芒種止；秋季由白露起至封凍止。

採集與加工：藥用其根。先用鎬在一側挖1尺深的溝，再用黃著鏟順根剝，然後用黃著套（即用繩一端系在黃著上；一端系在自己腰部，借直腰的力量將黃著拔起）或用手拔出，摘去須根，用刀切去蘆頭（根莖）。切時必須刀快力猛，使斷碴整齊，枯空心不得留過一寸。然後鋪廣場曬至六、七成干，分等捆成十斤左右重的小捆；再曬至足干捆成大捆即可。

規格質量：一等（大條）：長2尺以上，直徑在6分以上；

二等（中條）：長1尺5寸以上，直徑在4分以上；


三等（小條）：長度不限，直徑在2分以上。

以上規格必須去杈（支根）及蘆頭（根莖），條均勻整齊，色淡黃或黃白，皮細致而不破，體質堅實無空心；等外的長、粗度不限，但必須不帶枯心，質量成實，身干無雜質。

包裝與保管：用麻繩打捆，外面裹席，等外品可裝筐。黃著易遭蟲蛀，保管時須放乾燥通風處。

性能：性溫，味甘。為緩和強壯藥。有補氣、止虛汗作用。又為瘡瘍、痛疽以及痘症之要藥。

注：木槿根與黃著類似，它們的區別是：木槿根外皮粗糙色白，內皮不綿發柴性，斷碴白色有一環紋，無菊花心；黃著皮細致淡黃色，內皮色白質鬆軟發綿，斷面有黃色菊花心。



1. 帶花的枝 2. 生藥外形

附：种植方法

一、选地：黄蓍适宜在一些砂質土壤和排水良好的荒山上种植。

二、整地和播种：播种期分春、秋两季。春季在4至5月；秋季在9至10月。播种前先将地里的小树及杂草除掉，并将杂草就地烧灰作为肥料，接着翻地或刨一遍。然后将种子匀撒地内，再将土刮平即可。每亩須种子三斤左右。

三、田间管理：春播的如雨水适时，約15至20天后即出苗；秋播的来年春天发芽。苗长出后，应及时鋤草，因山坡杂草生长很快，及时除掉杂草，以免影响其生长，同时还須防止牲口践踏。

黄 苓

别名：腐腸、空腸、苦督邮。

土名：黄金茶、空心草。

来源与形态：屬玄参科，为多年生草本，自生于山野。茎高1至2尺，茎直立，分枝少。叶对生，呈披針形，頂端长尖，似柳叶。夏季于茎頂开紫色唇形花，作总状花序。花落后結蒴果，內包有黑色圓形种子。其根呈紡錘形，长5寸至1尺，外皮棕黑色，里面呈黄色。根头部粗圓中空，有类似腐木的紫黑色黧（俗称黄苓屎）。

主要产地：隆化、围場、青龙、平泉、蔚县、龙关、张北、涿源、易县、阜平、唐县、涉县、磁县、內丘、邢台、藁县、迁安、遵化、昌黎、平山、正定和新乐县，以及石家庄、秦皇島、唐山市。

产季：春季由清明节前开始至立夏止（新芽长出半尺高即止收）；秋季由立秋起至封冻止。

采集与加工：药用其根。用鎬深刨（注意不要把根刨断），将根刨出后，去掉残茎及泥土，晒至二、三成干，用筐輕輕撞头



1.带花的枝 2.生药外形

遍(撞筐长5.5尺、宽2.3尺、高1尺,横13道径);再晒至四、五成干撞第二遍,撞净老皮,呈红黄色;再晒至七、八成干撞第三遍,撞至黄色时下筐,放席上晾晒,并避免沾土;晒至九成干时撞第四遍,撞时须快撞几下,至黄白色,再晒至足干即可。

在加工过程中如遇色泽不好,可多撞一次,但也不可过

劲，撞至露骨損失分量。同时加工时还应注意随撞随晒，避免撞至中途堆放起来，以致发霉变质，造成損失。

規格質量：头路条：长7寸以上，直径在8分以上；二路条：长5寸以上，直径在6分以上；三路条：长4寸以上，直径在5分以上；疙瘩条：长2寸5分以上，直径在6分以上；枝苓面子：长4寸以上，直径在4分以上，有头有尾；枝苓棒：长1寸以上，直径在1分以上；尖苓：不够枝苓棒者均为尖苓；瓣苓：即苓渣子及碎瓣，无其他杂质，色澤純正而干燥。

以上規格为出口規格，內銷一般混装。

包装与保管：用荆条筐包装。底长2.6尺，寬1.6尺，高2.2尺，口长2.5尺，寬1.5尺，盖与底相同。

(一) 一等大条装法：底层装三路条57%，尾对尾碼四节，4寸高；第二层两头碼三路条，当中装二节疙瘩条，占15%，8寸高；第三层装三路条，4寸高；第四层装二路条20%，碼三节装至平口，用大条盖面，然后用毛头紙盖面，再封口。

(二) 枝苓装法：底装枝苓棒占80%，上盖枝苓面子6寸，高占20%，用毛头紙盖面，再封口。

(三) 片苓装法：大片挑出盖面，再封口。

性能：味苦，性平。为泻实火，清湿热，治泄痢，疗疮瘍，清凉、解热药。

黄 精

别名：黄芝、黄衣、菟竹、救穷草。

土名：黄鷄根、黄金梁、黄鷄蛋飯。

来源与形态：屬百合科，为多年生草本，自生于山野。茎高2至3尺。叶輪生4至5小叶，呈披針形，頂端尖长，似柳叶。初夏于叶腋間开青白色花，下垂如鈴。其根茎肥大多肉质，呈圓柱形，結节粗大，須根稀少，通体有明显的环节。



1.带花的枝 2.生药外形

主要产地：龙关、张北、易县、涞源、阜平、唐县、定县、兴隆、青龙、灤平、丰宁和平泉县，以及承德、保定市。

产季：春季从化冻起至谷雨止；秋季从立秋起至封冻止。

采集与加工：药用其根茎。用鐮刨出根茎后，去掉残茎及須根，晾晒至倒浆时（即指外表微干，而内部且軟），用里面发光的筐輕輕撞一遍，溜去毛、土即可。随之分等放席上晾晒，

晒至倒浆时用手輕輕揉头遍，避免碰破皮或折断；揉完再晒，晒至倒浆再揉；反复揉晒，一遍比一遍加重些，揉至綿軟，再晒至足干，用光筐撞一遍，使其透明光亮即可。

規格質量：以个大整齐，体肥浆足，透明光亮，色淡黄，身干不返潮者佳。

包装与保管：用筐包装。黄精易遭虫蛀，須及时检查进行熏制，并防止受潮。

性能：味甘，性平。潤肺、生津。治癆伤、填精髓，用作滋养緩和药。除药用外并能酿酒。

黄 柏

别名：黄蘗、柏皮。

土名：黄柏木皮。

来源与形态：屬芸香科，为落叶乔木。黄柏分关黄柏和川黄柏两种，我省产为关黄柏。茎高3至5丈，树干外皮多皴折，灰黄色，內皮鮮黄色。叶为奇数羽状复叶，小叶对生，呈椭圆形，頂端尖长，邊緣有細鋸齿。夏季枝梢开淡黄色小花，作圓錐花序。花落后結球形核果，成熟后呈黑色。

主要产地：张北、蔚县、青龙、兴隆、平泉和涞源县，以及承德市。

产季：在夏季采收。

采集与加工：药用其树皮。先在树干上横着打节，再縱切，剝下树皮。然后用小刀刮去外层老皮，晒干即可。

規格質量：片大，皮厚，无外皮，色鮮黄，整齐不碎。

包装与保管：捆成长方形捆，外面裹席。存放时严防受潮变質。

性能：味苦，性寒。治五脏腸胃、中結热、黄疸腸痔，止泄痢、目热、赤痛、口疮等症。



1. 带果实的枝 2. 花 3. 生药外形

黃瓜皮 附：黃瓜子

别名：胡瓜皮。

来源与形态：黃瓜屬葫蘆科，为一年生蔓性草本。全体有細毛，茎高1至2丈，借卷須纏繞它物而上生。叶互生，掌状浅裂。夏季开黄色单性花，雌花下部有长形子房，果实为瓠果，表面有小刺，成熟时呈黄綠色，内包許多粒种子。

产地：全省各地均产。

产季：在秋季采集。


采集与加工：药用其果皮及种子。采集已成熟的果实（越

老越好)，将皮刮下晒干，再将籽取出洗净，晒干即可。

规格质量：皮（黄瓜皮）片薄，色黄不霉纯净；种子（黄瓜籽）籽粒饱满，黄白色，身干无杂质。

包装与保管：皮用席包装；籽用麻袋包装。保存时放干燥一通风处，防止发霉变质。

性能：味甘，性寒。为利尿、解热药。



1.带花的枝 2.果实 3.生药外形

商 陆

别名：蓬葛、当陆、章柳、白昌、马尾、夜呼、莧陆。

来源与形态：属商陆科，为多年生草本，自生于山野。高4至5尺，茎绿色或紫红色，光滑，分枝甚多。叶互生，卵圆

形，頂端尖長，全緣，有長柄，葉片大如煙葉。夏季於枝梢開白色或淡粉紅色小花，呈總狀花序。果實為漿果，成熟時為深紅紫色或黑色。其根粗壯，呈圓錐形，多分枝，外皮呈淡黃色。

主要產地：涿源和邢台县。

產季：在春、秋兩季採。

採集與加工：藥用其根。用鎬刨出後，去掉須根及泥土，切薄片曬干即可。



1. 帶花及果序的枝 2. 花（放大） 3. 生藥外形

規格質量：整齐不碎，黄白色，身干，无杂质。

包装与保管：用席包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮发霉。

性能：味辛，性平，有毒。为利尿药。治水肿、脚气，外贴用于无名肿毒。

苘麻子

别名：苢麻子、白麻子、青麻子。

土名：青麻子、苢麻子。

来源与形态：苢麻属锦葵科，为湿草类，一年生草本。我省有野生、家种两种，以家种为多。茎高7至8尺，叶大而圆，呈心脏形，边缘有锯齿，叶柄长。夏季在茎上部的叶腋间开黄色的小花，有五个花瓣。花落后结果实，嫩时青色，成熟后为褐色，内包有扁黑的种子，与蜀菊花子相似。苢麻子的茎、叶、果实都生有密度不同的细毛，茎很轻虚。

产地：全省各地均产。

产季：在秋季产新。

采集与加工：药用其籽。当果实成熟后，用镰连根刨下，摘下果实晒干，再用手搓或用木棒打开果实，簸去外皮和杂质，留下种子即可。

規格質量：籽粒成实，色黑，身干，无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味苦，性平。治红白、冷热痢疾，除眼中瘀肉等症。



带果实的枝

旋复花

别名：金錢花。

土名：小黄花、复花。

来源与形

态：屬菊科，
为多年生草
本，多生于原
野湿润地带。
茎高1至2尺，
直立，上部略
分枝。叶互生，
广披针形，无
柄，边缘有鋸
齿，微有毛。
夏季于枝梢开
黄色花，呈头
状花序。花落
后結坚果，椭
圆形，有毛。

产地：全
省各地均产。

产季：于
7至8月間花
正开时采集。

采集与加
工：药用其
花。将花朵摘
下，曝日晒干
即可。



1. 植物上部形状 2. 舌状花冠 3. 筒状花冠

規格質量：色黃，純淨，身干。

包裝與保管：用席包裝。保存時宜放乾燥通風處，防止受潮。

性能：性溫，無毒。為健胃、祛痰藥。治胸中痞悶。骨部膨脹、咳嗽、嘔吐等症。

梓 實

別名：木角豆。

土名：臭梧桐。

來源與形態：屬紫葳科，為落葉喬木。莖高2至3丈，葉對生，呈掌狀，邊緣淺裂，有長葉柄。夏季枝梢開淡黃色花，花落后結長莢果，類似豇豆莢，長尺許，圓柱形，內包許多種子，淡褐色，長橢圓形，扁薄略卷，呈匙狀，兩端密生長毛。

主要產地：青龍、興隆和灤平縣，以及承德市。

產季：在冬季採集。

採集與加工：藥用其果實。將成熟的果實摘下，陰干或晒干，捆成小把即可。

規格質量：整齊不碎，身干，純淨。

包裝與保管：用筐包裝。宜放乾燥通風處保存，防止受潮。

性能：甘平，無毒。為利尿藥。治浮腫。




1.带果实的枝 2.叶子

敗醬草

别名：黄花龙芽。

来源与形态：屬敗醬科，为多年生草本，自生于山野。茎高3尺左右，全株有疏毛。一年生叶近地面丛生，长椭圆形，頂端尖，邊緣有鋸齒；第二年抽茎，茎上叶对生，羽状分裂，裂



植物上部形状

片披針形，邊緣有細鋸齒。秋季莖梢開黃色小花，呈復傘形花序，花落后結瘦果，小橢圓形。其根類似柴胡，棕褐色，有腐醬味。

主要產地：涞源、蔚縣、興隆、青龍和豐寧縣。

產季：在秋季採。

採集與加工：藥用其根。用鎬刨出根後，去掉殘莖或泥土，曬干即可。

規格質量：條長整齊，質堅實，無殘莖、雜質，身干。

包裝與保管：用席包裝。保管時宜放乾燥通風處，防止潮濕。

性能：味苦，性平。為消腫、解凝、排膿、利尿藥。

盤龍參

別名：綬草。

土名：豬鞭草。

來源與形態：屬蘭科，為多年生草本，自生于山野。莖高6寸至1尺左右。葉互生，狹長，披針形，有平行脈。初夏頂生淡紅色鐘形小花，呈穗狀花序，斜掄而上。其根為許多圓柱形須根，多肉質，黃褐色。

主要產地：隆化、易縣、涞源和蔚縣。

產季：在秋季採。

採集與加工：藥用其根。用鎬刨出根後，去掉莖葉及泥土，曬干即可。

規格質量：整齊，去殘莖及泥土，外表淡褐色或黃褐色，內髓白色，身干不霉。

包裝與保管：用席包裝。保管時宜放乾燥處，勿使受潮發霉。

性能：有滋補作用。治虛弱、吐血、喉毒等症。



植物全形

澤 兰

土名：地环秧、地溜秧、地叭啦。

来源与形态：屬唇形科，为多年生草本。茎高4至5尺，



1.带花的枝 2.根

地下茎稍肥大，赤褐色。茎方形直立，通常单一，中空，有节，节处有毛。叶对生于节上，呈长椭圆形或广披针形，顶端尖，边缘有锯齿，叶柄短，类似薄荷叶。夏、秋季于叶腋间开白色或淡紫色小花，呈伞花序。

产地：全省各地均产。

产季：在秋季产新。

采集与加工：药用其全草。当花盛开时，用镰刀近地面割其全株，晒干即可。

规格质量：不带根，色绿，无杂草，身干。

包装与保管：扎捆，外面裹席。宜放干燥处，防止受潮。

性能：性温，味苦。能行血、行水。用作妇人调经及月经过多病，并治水肿。

蛇床子

别名：虺牀、思益、蛇米、蛇粟。

土名：山胡萝卜蔓、野胡萝卜蔓、秃子花。

来源与形态：属伞形科，为二年生草本，自生于田野、道旁潮湿处。三月间生苗，下部叶丛生，为二回羽状分裂，裂片披针形，顶端尖，似香蒿叶。春末抽茎，高2至3尺，分枝多，茎中空，表面有纵沟及稍隆起的节。夏季于茎顶及叶腋间开白色五瓣小花，呈伞形花序，似胡萝卜花而小。花落后结实，长椭圆形，黄褐色，有翼，为二分果合成。

产地：全省各地均产。

产季：在6至7月间采集。

采集与加工：药用其果实。成熟时用手捋下果实，除去杂质，晒干即可。

规格质量：籽粒饱满，黄褐色，身干，无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。保管时防止受潮。

性能：味苦，性平。为兴奋药。治阳痿，外用于妇人阴肿、除粘液分泌物及阴部瘙痒等症。




1. 带花及果实的枝 2. 生药外形

貫 仲

土名：鷄頭野鷄膀子、毛毛罐。

来源与形态：屬水龙骨科，为多年生草本，自生于山野阴湿地带。茎高2尺左右，叶由地下茎丛生，为羽状复叶，小叶卵状披针形近于无柄，又羽状分裂，叶背面散布許多棕褐色孢子囊群。其根茎呈长圆柱形，如枫梨，黑褐色。

主要产地：灤平、隆化、兴隆、易县、涞源、唐县、阜平、怀来、龙关、张北、平山、正定、迁安和遵化县，以及石



1. 植物全形 2. 小叶 3. 生药外形

家庄、承德、秦皇島、保定市。

产季：在春、秋两季生产。春季从化冻起至芒种止；秋季在白露前后。

采集与加工：药用其根茎。用鎬将根刨出后，除去叶柄、須根及泥土，晒干即可。

規格質量：整齐，无須根及泥土，呈黑紅色。

包装与保管：用席包装。保存时防止受潮发霉。

性能：性寒，味苦。为清湿热、止血、解毒药。

側柏叶 附：柏子仁

别名：扁柏叶、扁松叶、香柏叶。

土名：柏树叶。

来源与形态：屬松柏科，为常綠灌木。茎高丈余，树干端直，分枝多，小枝全体为綠叶所包，扁平，小叶鱗片状，在树枝上呈側向排列。夏季于小枝頂端开黄綠色花，花落后結果实，为球形或卵状椭圆形。初綠色，肉質，成熟后变深褐色，被有白粉，并轉成木質。通常由六鱗片組成，每鱗片內有两枚种子，长卵形，略有三棱，种皮淡褐色有光澤。


主要产地：青龙、兴隆、平泉、灤平、邢台、涉县、磁县、內丘、定县、安国、唐县、涿县、易县、蔚县和张北县，以及唐山、保定市。

产季：一年四季均产。

采集与加工：药用其枝叶及种子。用剪刀将幼枝叶剪下，放席上阴干，即得側柏叶。当果实成熟后，打落种子，除去杂质，再用水漂去秕子，然后用石磨輕輕磨开种皮，以风車搗去种皮，晒干即得柏子仁。

規格質量：側柏叶色綠，不帶老梗，身干无杂质；柏子仁整齐不碎，黄白色，身干，带皮的最多不得超过15%。

包装与保管：側柏叶用席包，柏子仁用麻袋包装。保管时宜放干燥通风处，夏季种子易遭虫蛀，需熏制。



1.带果实的枝叶 2.果实 3.种子

性能：侧柏叶性寒，无毒。为清凉、收敛药。适用于各种出血，如咳血、吐血、鼻衄、肠出血、尿血、妇人子宫出血及赤白带下等症，又为淋疾之利尿药。柏子仁有滋养作用。

麻 黃附：麻黃根

別名：龍沙、卑相、卑盐、中央节土。

来源与形态：屬麻黃科，为多年生草本，雌雄異株。茎高

1尺左右，多分枝，細小，有許多縱淺沟。叶退化成細小鱗片状，常为二片对生，基部愈合，包围茎节。三、四月于茎頂开黄色細小单性花，花落后結实如百合瓣。其根紫褐色，长约1尺，粗如手指。


主要产地：蔚县、怀安、围場和丰宁县。

产季：在白露至地冻前为采收期。

采集与加工：药用其全草及根。用镰刀割其地上全草，晒干；其根用鋤刨出后，去掉残茎及須根，晒干即可。

規格質量：麻黃草，綠黄色，整齐无杂质，折断有黄色粉末，身干不霉烂；麻黃根条粗，不带残茎，身干。

包装与保管：麻黃草扎捆，外面裹席；麻黃根用席包装。宜放干燥通风处保存，防止受潮。



植物上部形状

性能：味辛苦、性温。麻黄草发汗、利尿、镇咳、祛痰，对咳嗽、喘息、关节痛等有效；麻黄根有止汗作用，用于盗汗、产后虚汗等症。

牵牛子

别名：二丑子、草金铃子、狗耳草子。

土名：喇叭花子、黑白丑子。

来源与形态：属旋花科，为一年生蔓性草本。茎长数丈，



1.带花的枝 2.果实 3.生药外形

叶互生，三裂掌状或心脏形，有叶柄，全体有細絨毛。夏、秋季于叶腋間开紅、紫、白色喇叭形花。花落后結球形蒴果，三室，每室含种子二枚，种子为三面形，一面隆起，两面平坦，外表呈棕黑色（黑丑）或淡褐色（白丑）。

产地：全省各地均产。

产季：在秋季采集。

采集与加工：药用其成熟种子（黑白須分別采收）。用鐮刀割其全株，摊場上晒干，用木棒打下种子，去掉杂质及泥土即可。

规格質量：籽粒飽滿不秕，黑白分裝，无杂质和泥土。

包装与保管：用麻袋包装。宜放干燥通风处保存。

性能：味苦，性寒。泻湿热、利二便。治腰部以下之水肿及尿閉症有效。

紫 苑

别名：青苑、夜牵牛、返魂草。

土名：小瓣。

来源与形态：屬菊科，为多年生草本。我省有野生、家种两种。安国县已有数十年的种植习惯。春季叶自宿根丛生，叶片大，长椭圆形，边缘有锯齿，表面粗糙。生长二年的紫苑抽茎，高2至3尺，枝茎交错互生。秋季在茎的頂端和枝的梢头开淡紫色的小花，排列为头状花序，有舌状花冠。其根一株丛生很多細长的根，长5至7寸，表面紫紅色，質柔韌，不易折断（图一）。野生紫苑茎高2尺以上，有縱沟。根出叶，有长短不等的叶柄，叶片腎圆形，先端鈍或略尖，边缘有粗锯齿，表面色綠，背面呈浅綠，小叶抱茎而生。秋季开黄色头状花，排列成密总状花序。其根与家种相似（图二）。

主要产地：家种产于安国和定县；野生产于青龙、兴隆、围場、平泉和隆化县，以及承德市。

产季：家种在封冻前或春初刨采。野生从化冻开始，到五月份止；秋季从八月份开始到封冻止。



图一 1.植物全形 2.花序

采集与加工：药用其根。刨采时先把叶子割掉，再用三齿鎬将根全部刨出，去净泥土，摘掉母根，修净芦苗，晒一两天，然后将细根拧成辫形，晒至足干即可。

规格质量：身干，根细长，色紫，辫整齐，无泥土者佳。

包装与保管：用席包装。宜放干燥处保存，夏季应经常晾



图二 1.植物全形 2.生药外形

晒，防止受潮发霉。

性能：味苦，性温。温肺、下气、化痰、止咳。治咳嗽、吐血以及小便带血等症。

附：种植方法

一、选地与整地：紫苑适宜在肥沃土壤，或水源充足的地方种植。秋后将留种地进行深耕（深尺許），每亩施基肥（土肥）万斤以上，随即耕入土内。来年春分再浅耕一次，整平作畦，畦寬3尺，长度可按地形而定。

二、栽植：紫苑多用种根栽种。春分节前后，将选好越冬的种根刨出，用剪刀截成4至5寸长的小节，把穴坑挖好（行距1尺、穴距7寸、深2寸），然后将种根順点播在穴坑内（每穴5至6根），复土埋严、踩实，随即浇水。二十天左右，苗可出土。当苗全部出齐后，浇第二次水。

三、田間管理：紫苑怕干，宜經常保持土壤湿润，及时中耕除草。苗高4至5寸时进行追肥，每亩施硫酸20斤或餅肥40斤即可。但如有抽苔者，应立即将苔剪掉，以免影响質量。

四、收获：在封冻前或来年春初刨采。但在刨采前需浇水溼地，使土壤疏松，并将叶子割掉，以利刨采。其具体方法与前相同。

五、种根的保管：为了繼續栽种，可在收获新产品的同时，进行选种根。只要主根的最末梢，将尖端掐去，儲藏在坑内（坑深4尺，复土厚1尺），坑内要湿润，便于保温。貯藏坑宜在背阴处，以防春季在坑内发芽。另一种方法是当年不收，讓其在地里越冬，来年春季刨收，随之选种栽种。

紫 草

别名：紫丹、紫芙。

来源与形态：屬紫草科，为多年生宿根草本植物，自生于山野。茎高1至2尺，叶互生，广披針形，无柄或近似无柄，全緣，先端尖銳，全株有毛茸。夏季由叶腋或頂端生白色漏斗状的小花，呈总状花序。花落后結小球形果实，而坚硬。根屈曲如錐形，外皮暗紫色有皺紋，断面黃白色，如用热水浸之即



1. 植物形状 2. 花 3. 药用部分

成紅色。

主要产地：龙关、青龙、兴隆、平泉、隆化、围场、滦平、涉县、邢台、涞源、易县、薊县、遵化、迁安、平山和正定县，以及承德、秦皇島市。

产季：在春、秋两季生产。

采集与加工：药用其根。当春季苗高1寸前；秋季苗枯死后可用鐮刨出（因这时其精液足、質坚实），去掉苗蘆和泥土，晒至八成干时捆成小把，再晒至足干即可。

規格質量：身干整齐，个条大，質坚实、外皮呈紫色，无杂质不霉者佳。

包装与保管：用筐或麻袋包装。宜存放干燥通风处，防止受潮发霉。

性能：味苦，性寒。治痘疹、恶疮等症。

注：紫草与丹参往往混淆，应注意识别。紫草外皮紫色，断面有白渣；而丹参为紅皮、紅心。它們的疗效也不同，因之要分别生产与包装。

紫 苏

附：苏梗、苏叶、苏子

别名：赤苏、香苏、水苏、山魚苏。


土名：葯苏。

来源与形态：屬唇形科，为一年生草本。多种植于平原地带，我省安国县已有数十年的种植习惯。茎高3尺左右，方形四角有棱，分枝很多，叶有长柄，对生，为卵圆形或广卵形，先端尖长，边缘有粗鋸齿，叶面呈綠色，背面呈紫紅色，叶脉密而明显。白露节前后，由茎端或叶腋間生出3至4寸的花穗，开白色或淡紫色唇形小花。花落后結瘦果，內含有种子，黄褐色，象芥菜子而大。全株都有芳香气味。

主要产地：安国、定县、新乐和怀安县。

产季：在白露节前三、四天內采收。紫苏季节性很强，采收过早未成熟，叶片薄呈灰綠色；过晚开花結子消耗养分，叶片薄呈黄綠色，梗空心質次，最好在其刚吐穗时采集。但收苏子的植株，需較長時間生长，一般在寒露后籽可成熟，收籽后的梗、叶一般不入葯，因其質次疗效低。

采集与加工：药用全株。成熟后連根拔下，去淨泥土，挂在通风干燥处阴干（保持色澤鮮艳）即可。但在未干前需注意



1. 植物形态 2. 花及苞叶

翻晾，以防发霉。籽成熟后，将穗剪下晒干，碾下种子，用扇车搨去杂质和泥土即可。

规格质量：苏叶叶片肥大，不碎，色紫，无梗，身干；苏梗身干整齐，外皮紫褐色，断面色白；苏子籽粒饱满，身干无

秕粒或杂质。

包装与保管：苏叶、苏梗扎捆，外面包席或用席包装。宜放通风干燥处，防止发霉变质。苏子用麻袋包装。夏季应多晾晒，以防虫蛀。

性能：味辛，性温。叶为发汗、利气、和血、开胃药；梗为顺气、安胎药；籽为润肺、下气、定喘、镇咳药。

附：种植方法

一、选地与整地：紫苏对土壤要求不甚严格，以砂质土壤为好，但不宜在易涝地区栽种；喜甜水，切忌用苦碱水灌溉。麦收后将留作地进行耕翻，每亩并施基肥（粪肥）万斤左右，翻入土内，然后整平开沟（沟宽1.8至2尺，深约2寸），顺沟浇水；同时要挖穴坑，坑深2寸，宽1.5寸，以准备栽秧。

二、育苗与栽秧：紫苏在春季播种育苗；夏季刨秧移栽。育苗地应选择种过菜类的地。将地精细整平作畦，畦宽2.5至3尺，随即浇水溼畦，两天后在畦内划半指深的沟，将种子撒播沟内搽平即可。每亩撒种子约3至4斤。播种后三、四天浇水一次，七、八天苗可出全。苗高二指时进行间苗，株距1至1.5寸，并适时浇水、拔草，以保持土壤湿润，但浇水量不宜过大。苗高5寸左右，根据苗的壮弱追肥1至2次，追肥后及时浇水。六月中旬（麦收后）苗高1.5尺左右，即可移苗。将苗移植已准备好的地穴内，培土埋严、浇水（当天栽的秧要当天浇完）。第二天早晨再浇水一次，以后根据干旱情况进行浇水。但在蹲苗时需中耕除草。小暑节秧苗刚显分杈时进行追肥，每亩施硫酸10至15斤或饼肥100斤左右，追肥后浇水，不再中耕，并保持土壤湿润。雨后要及时排水，以防受涝。

三、治虫：紫苏在七月份是生长最茂盛时期，也是虫害发生时期，必须及时检查，发现后立即除治。一般用20%可湿性六六六粉1斤，兑水1,000斤，连续喷治2至3次即可消灭。

四、收获：在白露节前后，紫苏将要抽穗成朵时为采收期，

采收过晚或过早均影响产量和质量。一般亩产700斤左右。

苏子是紫苏的籽。如留种子时，可在白露以后抽穗开花期继续加强田间管理，进行浇水、追肥，使其生长良好，以提高种子产量。寒露后种子成熟，即可收割。一般每亩产籽300斤左右。

紫花地丁

别名：布氏紫。

土名：苦丁科。

来源与形态：属罂粟科，为湿草类多年生草本。我省有野生家种两种。春天生苗，有一细直的主茎，分枝很多。叶互生，有长柄，为二回羽状分裂，裂片线形。春、夏季间开紫色小花，呈总状花序。花落后结荚角，似豌豆角且小，内包有种子数十粒；种子呈心脏形而扁圆，色黑有光泽，外包一层白色膜皮，干时膜皮变黄。

主要产地：安国、易县、涞源、涉县、邢台、蔚县、平泉、青龙、灤平、兴隆、玉田、薊县、迁安、藁城和束鹿，以及承德、唐山市。

产季：在夏季产新。

采集与加工：药用全草。当成熟时，用镰刀将其全株割下，去净杂草，晒至八成干捆成小把，再晒至足干即可。


规格质量：全草去根，半花半子，色青绿，身干无杂质者佳。

包装与保管：用席包或扎捆。保管时宜放干燥通风处，防止受潮发霉。

性能：味苦，性寒。为清凉、解毒药 治各种痈肿、疔疮，并能止泻痢。

附：种植方法

一、选地：紫花地丁一般不单独种植，多与谷子、黍子或



1.带花及果实的枝 2.花 3.开裂的果实

萝卜间作；忌重茬，怕干旱，适宜在肥沃土地和水源充足的地方种植。

二、播种：小暑为紫花地丁播种适期，来年小满收获。所

以多用鋤在谷子行間（行距1.2尺、株距2寸）深鋤5分上下，將種子播入溝內，復土2分厚。播后立即澆水，以後每隔五天澆水一次，連續澆5至6次，約一個月苗可出全。

三、田間管理：谷子收割後，紫花地丁苗高2至3寸，隨即澆水一次，至封凍時再澆水一次；但切忌蓋糞，以免發生黑蛆蟲。來年清明節以後，越冬幼苗返青。當苗高5至6寸時，進行追肥，每畝施硫酸銨10至15斤或餅肥100斤，追肥後地干即及時澆水，使土壤經常保持潮潤，並注意除草，以利幼苗生長發育。

四、治蟲：紫花地丁經越冬後的幼苗（清明到谷雨間），最易發生黑蛆蟲，嚴重的在二、三天內就能將苗吃光。所以必須經常檢查，發現後及時用6%可濕性六六六粉1兩和麩皮1.5斤做成毒餌撒在根部，進行除治。

五、收穫：小滿節進行收割。用鐮刀將地上面的全草割下，曬干即可。

紫 參

土名：草河車、刀剪葯、破傷葯，疙瘩參。

來源與形態：屬蓼科，為多年生草本。莖高1至2尺，葉互生，橢圓形，根出葉和下部葉有長柄。夏季枝梢抽長花軸，於頂端簇生許多白色小花，呈穗狀花序。其地下莖為圓柱形略扁，外表暗棕色，一面平坦，一面呈圓形，上邊有明顯橫皺的節，下邊着生許多須根。

產地：山區各縣均產。

產季：在春、秋兩季採。春季從開凍起至芒種止；秋季從處暑起至地凍止。

採集與加工：葯用其根莖。用鎬將根刨出後，去掉殘莖、須根及泥土，曬干即可。

規格質量：個大整齊，外皮黑紫色，內髓微紅，身干無雜質。

包装与保管：用筐装或席包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味苦，性寒。破瘀血、消痈肿。治痢疾或用作通经药。



1. 植物全形 2. 花 (放大)

菊花

别名：节华、女节、女茎。

土名：药菊、白菊花。

来源与形态：属菊科，为多年生草本。我省有野生和家种两种，安国县已有数十年的种植习惯。茎直立，分枝很多，全株密生细软毛。叶互生，叶片羽状深裂或浅裂，两面都有细软



1.带花的枝 2.根 3.舌状花冠 4.筒状花冠

毛。秋季由茎顶开黄色小花，伞房状的排列，呈头状花序。

主要产地：安国县。

产季：于霜降产新。

采集与加工：药用其花。当菊花开放后，用镰刀将全茎割

下，架在通风干燥处阴干。待花干后再摘下（这样花质量好，产量高，不易发霉）即可。

规格质量：身干净花，黄白色或白色，无杂质。

包装与保管：用布袋或席包装。宜放干燥处。但菊花容易吸收水分而返潮，装包时须放入木炭半斤（分放包内中心），以免受潮发霉。

性能：味苦，性平。为驱风、解热药。治风热、清头目等症。

附：种植方法

一、选地与整地：菊花适于在较干燥的砂质土壤种植；低洼地和碱地都不适宜菊花生长，同时忌在重茬地培植。在移苗前将留作地整好，一般在秋季作物收获后，进行深耕（深6至7寸）；来年春季化冻后复耕一遍，随即每亩施基肥（圈肥）万斤左右，耕入土内，搂平作畦，畦宽2.5尺，长短按地形而定。

二、选种：菊花多是分根栽种。在霜降前将留种的植株选好，收割时把茬子留高一些（高出地面2寸即可），作为种秧繁殖。封冻时复盖马粪2至3寸厚，以保安全越冬。第二年春土地化冻后将粪搂去，使其萌芽生长，以备移栽。

三、栽秧：小满节前后即可进行移植。秧苗要随栽随刨，并栽在预先作好的畦内，行距2尺、株距1.5尺。栽时先用铁锹挖穴坑，坑深4至5寸，每穴栽一株，细弱者栽两株，将根复土埋严踩实，随即浇水，六、七天即缓苗生长。一般每亩可栽秧3,000至4,000株。

四、田间管理：苗高2至3寸时，用锄松土除草，但不宜深锄，距根周围2寸以内最好不锄，以免碰伤根部。苗高3至4寸时进行追肥，每亩施饼肥100斤或人粪尿200斤左右；苗高7至8寸时追第二次肥，每亩施化肥40斤。施肥时可在距离根部2至3寸远处挖沟，深、宽2至4寸，将肥料撒入沟内，复土埋严，然后浇水。但在缓苗以后浇水量要大些（可根据干旱灵活掌握），做到干则浇，不干则不浇，以保持湿润为宜。

五、收获：菊花抗霜力较强，因此在霜降后收获最为适宜，过早过晚都影响质量和色泽。收获时的具体方法与前相同，一般每亩产150至200斤。

款冬花

别名：虎须。

土名：冬花。

来源与形态：属菊科，为多年生草本，自生于山野。春季叶由宿根丛生，呈心脏形，有长柄叶，边缘有不规则的锯齿。冬季从根部开花，作头状花序。



1. 植物全形 2. 已开放的花序

主要产地：蔚县、龙关、涞源和平山县。

产季：在立冬产新。

采集与加工：药用其未开放的花蕾。在立冬采集，不宜迟。去土1至2寸，将花蕾采下入筐，摊晾阴凉通风处（但防止受潮、霜打、雨淋），经三、四天后，用木板轻轻地搓一下（切勿用手抓、水洗，以免发黑变色），泥土自掉。然后放在阳光下曝晒，并随时用木杈翻动，直到晒干为止。

规格质量：净花，色浅紫，无泥土，身干者佳。

包装与保管：用木箱包装，内垫纸，并放一块木炭，以吸收水分，然后封闭严密。保管时放干燥处，防止受潮。

性能：味辛，性温。温肺、下气、化痰、止咳，用作祛痰、镇咳药。治痰咳、喘息及妊妇之咳嗽、感冒。

菖 蒲

别名：白菖、水菖蒲、泥菖蒲。

土名：臭蒲棒根子。


来源与形态：属天南星科，为多年生草本，自生于池塘中。茎高2至3尺，地下茎横生，圆柱形，淡红色，全体有特异香味。叶狭扁如剑状，长3至4尺，平行脉，有明显的主脉。夏季由叶腋间抽穗开花，花细小而多，淡黄色，呈肉穗花序（图一）。

石菖蒲与菖蒲类似。其形较小，为多年生草本，多种盆内供观赏。叶剑形而细，无明显主脉，高1尺余。地下茎扁圆柱形，长4至8寸，粗2至4分，外表赤褐色或暗绿褐色，断碴淡红色（图二）。

主要产地：滄县、黄骅、玉田、灤平、青龙、兴隆、高阳、徐水和正定县，以及承德、唐山市。

产季：在春、秋两季采集。

采集与加工：药用其根茎。用锹掘取根茎，洗净，除去须根，切成2至3寸长的小段，用微火烘干即可。




图一 1.植物全形 2.生药外形

规格质量：肥大，整齐，外皮浅褐色或褐色，断碴浅褐近于白色，体轻，纯净。

包装与保管：用席包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮发霉。

性能：味辛，性温。辟秽、开窍、宣气、逐痰、暖肠胃、明耳目、发声音、祛湿、除风。



图二- 1. 植物全形 2. 生药外形

黑 芝 麻

别名：胡麻、脂麻、油麻。

来源与形态：属胡麻科，为一年生草本。茎高3至5尺，直立，方形，有棱。嫩时深绿色，密生短软毛；老时黄绿色。叶对生有柄，茎下部的叶呈广卵形，边缘浅裂；茎上部的叶狭长呈广披针形，边缘近于全缘或呈微波状。花通常单生于叶

腋間，有短柄，表面有毛，向側方下垂，花冠呈唇形，色白微紫。果实为蒴果，直立，带长方形，有棱，表面密生灰褐色短軟毛。熟时縱向开裂，內包有許多种子，小而扁平，卵形头尖，黑色、白色或淡黄色，富油質。



1.带花及果实的枝 2.果实剖开形状 3.生药外形

主要产地：安国县。

产季：在8至9月間产新。

采集与加工：药用其成熟种子。成熟后拔其全株，晒干，打落种子，除去杂质即可。

规格质量：籽粒饱满，色黑，身干无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。宜放干燥通风处保管。

性能：味甘，性平。益肝、补肾、养血、润燥，为滋养强壮药。

附：种植方法

一、选地与整地：黑芝麻适宜在砂质土壤种植。于惊蛰后将地深耕4至5寸，随之每亩施基肥（土粪）万斤左右，并翻入土内，耙平作畦。

二、播种：分春播、夏播两种。春播在谷雨前后；夏播在芒种前后。播种时，按行距1.2尺、株距4.5寸点播，播后六、七天即可出苗，随后及时锄草，并根据干旱情况及时浇水。

三、收获：与前相同。

萊菔子

别名：紫花菘子。

土名：萝卜子。

来源与形态：萝卜属十字花科，为一年或二年生蔬菜类草本植物。初生根出叶，秋季或二年生抽茎，高3尺许。叶互生，呈长椭圆形，光滑，有叶柄，边缘有钝锯齿。茎端开白色或紫色四瓣小花，呈总状花序。花落后结长角形的果实，内包有椭圆形种子，黄褐色。其根有长形、圆形，肥大多汁，可供食用。

产地：全省各地均产。

产季：在夏季或秋季产新。

采集与加工：药用其籽。当果实成熟后，割下全株晒干，



1.带花的枝叶 2.根 3.生药外形

打下种子，簸去杂质即可。

规格质量：籽粒成熟，色黄白或赤褐，无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮或虫蛀。

性能：味甘，性温。为健胃、祛痰、治消化不良药。

蓖麻子

土名：大麻子。

来源与形态：屬大戟科，为一年生草本。茎高5至9尺，叶互生，有长柄，呈掌状深裂，边缘有粗锯齿。夏末开淡紅色单性花，呈总状花序，果实为球形蒴果，果皮有刺，内分三室，各包有种子一个。种子为扁椭圆形，色黑褐夹白斑，有光澤，仁色白，有油質。

产地：全省各地均产。

产季：在秋季产新。

采集与加工：药用其种子。当果实成熟时，摘下果枝晒



1. 有花及果实的枝叶 2. 雌花 3. 种子

干，用木板或鞋底将种子壳搓去，去净杂质即可。

规格质量：籽粒饱满，无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。宜放干燥通风处保管。

性能：味甘辛，性平。为下血、散瘀、泻积滞药。还可榨油。

楮实子

别名：楮桃、谷实、谷桑。



1.带花序的枝叶 2.叶子

来源与形态：屬桑科，为落叶灌木。茎高5至6尺或丈許。叶似桑叶，但叶面粗糙，先端稍尖，有的叶呈不規則的缺裂，叶邊緣有細鋸齒。雌雄異株，花为单性。雄花长寸許，花穗下垂，呈黄白色；雌花相聚作球状，呈紫色。果实大寸許，似楊梅果。

主要产地：安国县。

产季：在8至9月間产新。

采集与加工：药用其果实。当果实成熟后，用剪刀剪下，晒干即可。

規格質量：果成实，赤紅色，身干无老皮，无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。宜放干燥通风处保管。

性能 味甘，性寒。为消水肿、壮筋骨、明目药。

菟絲子

别名：菟蘆、菟縷。

土名：兔兒須、无根草、黄蜡須。

来源与形态：屬旋花科，为一年寄生蔓性草本植物，自生于田野。春季在地上伸茎如絲，黄褐色，借以纏繞其它植物，以豆类为最多。寄生后，自絕其根，吸取被纏繞植物的养料而生长。无叶，夏季开黄白色筒状五裂花。結蒴果，成熟后呈黑褐色，內包有种子3至4粒，类似蘿卜子，色灰褐或淡褐。

主要产地：交河、吳桥、河間、任丘、霸县、猷县、衡水、束鹿、正定、乐亭、迁安、遵化、巨鹿、南宮、邢台、內丘、涉县、大名、永年、高阳、徐水和定县，以及保定、承德、唐山市。

产季：在早秋产新。

采集与加工：药用其种子。果实成熟后，連同被纏繞植物一齐割下晒干，用石碾子軋或打下种子，細篩篩去杂质即可。

規格質量：籽粒成实，无杂质，色灰褐或淡褐。

包装与保管：用双层麻袋包装。保存时要防止受潮。

性能：味辛甘，性平。为滋养性强壮药。治阴萎、遗精等症，并可用作饲料。




1. 植物形状 2. 花序 3. 果实 4. 药用部分

絲瓜絡

別名：天絲瓜、蛮瓜、布瓜、天罗。

土名：絲瓜瓢。

来源与形态：絲瓜屬葫蘆科，为一年生蔓性草本，多种植在宅边院落。茎有刺毛，叶呈心脏形，有五裂至七裂缺刻，其



1. 带果实的枝 2. 花 3. 生药外形

形如掌状，边缘有不规则的锯齿，由叶腋间生出卷须，缠绕它物。夏季开五瓣黄花，花落后结细长的瓜果，长2至3尺。嫩时可供菜食用；成熟后断面成网状纤维，去皮和籽，即称丝瓜络。

产地：全省各地均产。

产季：于霜降后产新。

采集与加工：药用瓜内的瓢子（即丝瓜络）。将丝瓜摘下后，剥去外皮，去净籽，把瓢子晒干即可。

规格质量：瓜瓢条长，色黄白，无籽和杂质者佳。

包装与保管：扎捆，外面包席。宜放干燥处保存，防止受潮。

性能：味甘，性平。为活血、通经、解毒药。

葶 藶 子

土名：白花草、拉拉罐子。

来源与形态：属十字花科，为二年生草本，自生于山野。茎高六、七寸或尺许，直立，上部多分枝，叶互生，披针形或线形，边缘有小锯齿。五、六月间茎枝顶端着生许多绿白色小花，呈长总状花序。花落后结扁圆形的小短角果，内分二室，每室含一粒红棕色细小种子（图一）。另一种与上述形态相似，但叶较大，呈长椭圆形，无叶柄，边缘有锯齿（图二）。药用以图二形状为最多。

产地：全省各地均产。

产季：在5至6月间采集。

采集与加工：药用其成熟种子。将其全株割下，晒干后打下种子，用粗罗筛去杂质，再用细罗筛去土，晒至足干即可。

规格质量：籽粒饱满均匀，长扁圆形，红棕色，无土及杂质。

包装与保管：用布袋或麻袋包装。存放时防止受潮。

性能：味辛，性寒。泻肺、行水、下气、定喘，用为利尿及祛痰药。



1.带果实的枝 2.果实放大 3.种子放大 4.生药外形

图一



1.带果实的枝 2.花放大

图二

葎 草

别名 勒草、葛勒蔓。

土名 拉拉秧、拉拉蔓。

来源与形态 属桑科，为多年生蔓性草本，自生于山野或

道旁。春季生苗，纏繞它物，茎長丈許，略呈四角形，有短刺。葉對生，呈掌狀五裂，先端略尖，邊緣有鋸齒，葉柄長。花由葉腋間生，為雌雄異株。雄花呈圓錐花序排列，長5至6寸；雌花呈穗狀花序。花落后結種子，似大麻子，色黑。

產地：全省各地均產。

產季：在夏、秋兩季產新。



植物上部形狀

采集与加工：药用其全草。用镰刀将全株割下，晒干即可。

规格质量：全草身干，不碎，不霉，无根。

包装与保管：扎捆，外面包席。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味苦，性寒。治瘀血、益气。

鷄冠花 附：青箱子

别名：鷄头、鷄冠。

来源与形态：屬莧科，为一年生草本植物，多栽种于宅旁庭院。茎高2至3尺，叶广披针形或长椭圆形，先端尖锐，互生，全緣，有叶柄。夏、秋季間茎頂生出变形花軸，花如鷄冠状，有紅、黃、白各色。花落后結果实，內含有种子，色黑粒小，有光澤，亦称青箱子。

产地：全省各地均产。

产季：在秋季产新。

采集与加工：药用其花和种子。成熟后用剪子将花剪下（花茎不得超过2寸），搓掉种子晒干即可。

规格质量：花朵大，身干整齐；籽成实，色黑有光澤，无土者佳。

包装与保管：花用席，籽用布袋包装。宜放通风干燥处，防止受潮、虫蛀，夏季应經常晾晒。

性能：味甘，性凉。花和籽均为收斂药。有止血、止泻之效。用于赤白痢疾、痔疮流血、腸出血、女人子宮出血等症。

注：鷄冠花子与青箱子的形状相同，但兩种植物的形态不同。以花穗扁闊呈片形，似鷄冠者为鷄冠花子，也称青箱子，以花穗分歧似麦穗或笔头形，为青箱子花，其子亦称青箱子。我省多用鷄冠花子为青箱子供药用。据叶橘泉說：青箱子与鷄冠花子功效相同。



植物形态

篇 蓄

别名：道生草、扁竹、扁蔓。

土名：猪芽草、竹节草。

来源与形态：属蓼科，为一年生草本，自生长山野和路旁。茎平卧地上或向上斜生，长尺许，多数由基部分枝。自下



植物全形

部至頂端均生有叶，单叶互生，无柄或有短叶柄。叶片椭圆形或披针形，边缘近于全缘或略带波状，似柳叶而窄小，基部抱茎呈鞘状。夏季在叶腋间开淡红色的小花，花落后结黑色三角形的小果。

产地：全省各地均产。

产季：在5至7月间产新。

采集与加工：药用其茎叶。用镰刀将全株割下，去净老根及杂质，晒至八成干时捆成小把，再晒至足干即可。

规格质量：身干，青绿色，无老根和杂质，不霉。

包装与保管：扎捆或用席包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味苦，性平。为利尿、通淋、止泻、驱虫药。

蜀 葵 花

别名：蜀葵。

土名：蜀菊花。

来源与形态：属锦葵科，为二年生草本。茎直立，高4至8尺，全体密生细毛。叶互生，有柄，叶片呈心脏形，有五至七裂片，边缘有不整齐的锯齿。六月间开花，有红、紫、白、黄数种，五瓣或重瓣。花落后结果，内藏黑色扁圆形种子，似榆钱。

产地：全省各地均产。

产季：在夏、秋两季采集。

采集与加工：药用其花。将近枯萎的花朵用手摘下，晒干即可。

规格质量：净花，身干，无杂质。

包装与保管：用席包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：咸寒。治带下，目中溜火，和血、润燥、通窍、利大小肠。



植物形态

萱草根

别名：丹棘、忘忧、鹿葱。

土名：金针、花菜、黄花菜（指花而言）。

来源与形态：属百合科，为湿草类多年生草本，自生于山野和地边。根出叶，有的叶抱茎而生，新旧相替，四季常青。夏季抽茎，高2至3尺，茎端生数花，朝开暮萎，有黄色或杏黄色六出花瓣，可供菜食用。其根似白薇根而粗，色淡黄丛生。

产地：全省各地均产。

产季：在春、秋两季刨采，以秋季产的质量好。

采集与加工：药用其根。用镐将根刨出后，去净苗蘆和泥土，晒干即可。

规格质量：身干，质坚实，色淡黄或黄色，无蘆头和杂质



1. 植物全形 2. 生药外形

者佳。

包装与保管：用席或筐包装。保管时放干燥通风处，防止受潮。

性能：味甘，性凉。为祛湿热、利尿药。

鈴 兰

别名：君影草。

来源与形态：属百合科，为多年生草本植物，自生于山



植物全形

野。春季叶由根茎生，多为两片或三至四片，呈广椭圆形，先端尖，边全缘，光滑无毛，平行脉，有长叶柄。夏季开花，呈总状花序，偏向一边，花多下垂如铃，鲜时味香。果为红色浆果。其根于地下横生，有许多须根，黄白色或淡黄白色。

主要产地：灤平、平泉、围场、兴隆等县，以及承德市。

产季：在夏季产新。

采集与加工：药用其全草。当花将要开放时，用镰刀将全株割下，摊放干燥通风处阴干即可。

规格质量：全草身干，黄绿色，不霉，无杂质。

包装与保管：扎捆，外面包席。保管时宜放干燥通风处，防止受潮、发霉。

性能：味甘苦。为强心、利尿药。

注：其根也可供药用，但我省尚不习惯。

葛 根 附：葛花

别名：鷄齐根、葛藤根、铁葛藤。

土名：葛条。

来源与形态：属豆科，为多年生的蔓草，自生于山野。蔓茎长2至3丈，有软毛，常绕在树或石上。叶互生，三出复叶，叶片有不规则的浅裂，有叶柄。秋季开紫色蝶形花，呈总状花序排列。花落后结扁形的荚果，色绿。其根横卧地下，长丈许，直径7至8寸，皮淡紫色，断面色白。

主要产地：平山、正定、迁安、遵化、薊县、平泉、青龙、兴隆、灤平、易县、涞源、唐县、阜平、邢台、涉县、内丘和蔚县，以及承德、唐山、石家庄市。


产季：在春、秋两季刨采。春季从化冻起至发芽止；秋季从寒露起至结冻止（凡发芽和带苗的时候都不可生产，因质次没粉性）。

采集与加工：药用其根和花。用镐将根刨出后，去净泥土，晒干即可（一般多趁鲜时去掉外皮，用刀切成2至3分厚的竖

片)。花在夏季未开前摘下，摊晾在干燥通风处阴干为好。

规格质量：葛根身干，色白，粉性大，不霉；葛花色紫，身干不霉，无杂质。

包装与保管：根用席包装；花用麻袋包装。宜放干燥通风



1.带花序的枝 2.根

处，防止受潮。

性能：味甘，性平。根为退热、生津、发汗药。治热性病、止呕吐、解头痛等症。花为消酒醉药。

椿根皮 附：凤眼草

别名：樗臭椿、红椿、白椿、恶木。

土名：椿树籽，椿树根皮。

来源与形态：属苦木科，为落叶乔木。高数丈，树皮灰白或淡褐色，平滑而有直纹，叶为奇数羽状复叶，小叶披针形或阔披针形，边缘上部全缘，近基部有1至2个大锯齿，头端尖长，表面绿色，背面灰绿。夏季于叶腋及茎顶开许多绿色小花，呈圆锥花序。果实为翅果，长约1寸，长椭圆形，有翅，呈黄褐色，种子扁平，位于翅的中央。其干燥根皮即椿根皮。

产地：全省各地均产。

产季：春、夏两季采收根皮；秋季为采果期。

采集与加工：药用其根皮及果实。夏季将树根刨出，趁湿用斧头或木棒轻砸，使根皮剥离，然后剥下晒干。秋季当果实成熟时，一串串摘下，放席上晒干，去果柄即可。

规格质量：根皮（椿根皮）皮细，黄白色，片大，肉厚，无木质硬心，身干不碎；果实（凤眼草）色黄褐，整齐不碎，无杂质。

包装与保管：用席包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮发霉。

性能：性平，味甘苦。为苦味健胃及收敛药。内服作止血用；外用煎汤洗皮肤寄生性疮癣，有灭菌杀虫之效。凤眼草主治肠风、便血、小便下血等症。



1.带果实的枝叶 2.花序 3.药用部分

酸枣仁

别名：棘仁、山枣仁。

来源与形态：属鼠李科，为落叶灌木或乔木。茎高数尺至丈余，有刺针。叶互生，有短柄，卵圆形，边缘有细锯齿。夏

季于叶腋間开淡黄色小花，呈聚伞花序。果实为椭圆形核果，紫紅色，似枣而圓小，味酸。

主要产地：内丘、邢台、磁县、永年、易县、涞源、唐



1.带果实的枝 2.花 3.生药外形

县、阜平、元氏、正定、龙关、怀来、蔚县、青龙、兴隆、平泉、灤平、薊县、遵化、迁安和昌黎县，以及石家庄市。

产季：在9至10月間采集。

采集与加工：药用其成熟种子。用竹竿或木棍将成熟果实打落，于冬末春初将酸枣晾冻，然后选干燥天气，在日出前或日落后将冻干枣用石碾碾去枣肉，放阴凉通风处吹干，过筛，去其枣肉，再碾第二遍。这样反复数遍，直到核上大部分枣肉碾去为止。枣肉可制酸枣面，供副食用，可去暑。将核淘洗，晒干，再用石碾轧开枣核，去其核壳即可。

规格質量：色赤紅，飽滿，无虫蛀，带外壳的不超过5%。

包装与保管：用麻袋包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮或虫蛀。

性能：味酸，性平。补肝胆、宁心安神、主治虛煩不安，惊悸健忘，津少口干，体虛多汗等症。

蒼 朮

别名：山精、仙朮、赤朮。

土名：山蒼朮、山刺菜、山姜。

来源与形态：屬菊科，为多年生草本，自生于山野。茎高2至3尺，叶互生。茎基部叶多三至五出深裂，裂片卵圓形；茎上部叶多单一，橢圓形，邊緣有細鋸齒。夏、秋季于茎頂开白色或淡紅色花，呈头状花序，总苞呈叶状。其地下茎肥大，为不規則念珠状圓柱形，外皮黑褐色，須根多。

主要产地：龙关、蔚县、怀来、张北、昌黎、迁安、遵化、薊县、涉县、邢台、內丘、平山、元氏、正定、新乐、易县、涞源、唐县、阜平和定县，以及石家庄、保定、张家口、秦皇島、唐山市。

产季：在春、秋两季刨采。春季从化冻起至出苗止；秋季从白露起至地冻止。

采集与加工：药用其根茎。用鎬将根刨出后，去掉残茎，再用木棒砸去须根及泥土，晒至四、五成干，再用筐撞去外皮，再晒至足干即可。

规格质量：身干肥大，质坚实，黄褐色，不带老皮。

包装与保管：用席或筐包装；保管时严防受潮变质。

性能：性温，味苦。燥湿、升阳，用作健胃及利水、解热药。治食欲不振，风寒湿痹等症。



1.带花的枝 2.叶 3.生药外形

蒼耳子

别名：猪耳、藁耳、野茄、地葵。

土名：蒼耳、蒺藜、蒼耳棵。

来源与形态：屬菊科，为一年生草本，自生于原野。全体



1.带果实的枝 2.果实

密生被短毛，莖高1至3尺。叶互生，卵圆形，頂端漸尖，邊緣有缺刻及鋸齒，叶柄長。夏季于莖梢或叶腋間開綠色小花，呈頭狀花序。花落后結實，長圓形，兩端稍尖，表面有硬刺，越熟果刺越堅硬。

产地：全省各地均產。

产季：在秋季產新。

采集与加工：药用其果实及全草。果实成熟后用鉄箠或柳条箠打落，拣去杂质晒干即可；当莖高1尺許，用镰刀割其全株，晒干即为全草。

规格质量：果实籽粒飽滿，灰綠或黃綠色，純淨；全草身干，嫩莖叶，色綠，无杂质。

包装与保管：籽用席包装，全草扎捆。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：籽味甘，性溫。祛风、退热。用作发汗药及鎮瘧药。全草搗爛，涂疥癬、濕疹、虫伤等有效。

漏 蘆

别名：野兰、莢蒿、鬼油麻。

土名：和尚頭花、牛饅頭根、老牛疙瘩根。

来源与形态：屬菊科，为多年生草本，自生于山野。莖高2至3尺，根出叶丛生，有叶柄；莖出叶互生，无柄，長橢圓形，羽狀深裂，裂片又作羽狀，淺裂，形似大薊叶而无刺，背面略呈白色。秋季莖頂開藍紫色小花，呈頭狀花序。花落后結實，細小。其根略呈圓柱形，外表黑褐色，粗糙，根头部（根莖）密生白色絨毛。

主要产地：迁安、灤平、興隆、平泉、隆化、阜平、易县、徐水、唐县、定县、平山、元氏、正定、涉县、磁县和邢台、內丘县，以及石家庄、保定市。

产季：在春、秋兩季刨采。

采集与加工：药用其根。用鐮將根刨出后，去掉殘莖及泥



1. 植物全形 2. 果实 (放大) 3. 生药外形

土，晒干即可。

规格质量：条粗，质坚实，色黑无杈，带有白绒毛，无枯心纯净者佳。

包装与保管：用筐或席包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味咸，性寒。解热毒、通乳汁。有祛湿痹之功效。

蒲公英

别名：孛孛丁、白鼓釘、構耨草、奶汁草。

土名：波波丁、把兒英、沒根。

来源与形态：屬菊科，为多年生草本，自生于山野道旁。根出叶丛生，倒披針形，边缘有倒向羽状深裂。春季叶丛間抽生花茎，頂端开黄色花，呈头状花序。果实为瘦果，淡黄色，有棱白色冠毛，着风飞揚。



1. 植物全形 2. 花序 3. 果实

产地：全省各地均产。

产季：在5至6月間开花期采收。

采集与加工：药用其全草。用镰刀靠近地面将全株割下，晒干即可。

规格质量：整齐不碎，青綠色，身干无杂质。

包装与保管：扎捆，外面裹席。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：性平，味甘，能解热毒。治滞气，乳房肿痛，解食毒，散恶疮等症。

蒲 黄

别名：香蒲、中央粉、金簪草、醜石。

土名：蒲棒、蒲棒花。

来源与形态：屬香蒲科，为多年生草本，自生于池沼湿地。茎高4至5尺，叶細长而尖，有平行脉。夏季抽花茎，頂生肉穗花序，呈圓柱状，似蜡烛，色黄，雌花在下，雄花在上。

主要产地：平山、永年、正定、藁城、高阳、靜海和霸县，以及邯鄲、承德、唐山市。


产季：在夏季产新。

采集与加工：药用其花粉。当蒲棒发黄膨大时，用手捋下花粉，晒干，过細筛除去杂质即可。

规格质量：色黄，淨粉，无杂质，身干。

包装与保管：用布袋包装。宜放通风干燥处保管，防止受潮。

性能：味甘，性平。行血、祛瘀、止血药。治吐血、衄血、下血、尿血、妇人血带經閉、子宮出血、痔出血等症。外用于創伤、溫疹作撒布药。




1. 植物全形 2. 花序 (上部为雄花, 下部为雌花)
3. 果穗 4. 生药外形 (蒲黄)

豨 薺 草

别名：粘糊棠、猪膏母。

来源与形态：屬菊科，为一年生草本植物，多生于山野和路边。我省安国县已引为家种。茎高5至6尺，略作方形，直立，全株密生软毛。叶对生，呈广卵圆形，先端尖，自基部显出三大叶脉，边缘有粗锯齿，色淡绿柔软而薄，有软毛。秋天茎顶端开黄色头状小花，外侧总苞五片，密生粘毛。花落后，结瘦果，也有粘毛，并有臭味。

主要产地：安国县。



1.带花的枝 2.叶子

产季：在秋季产新。

采集与加工：药用幼枝、叶。当花苞未开放时，用镰刀将其植物的上半部割下，放在阴凉干燥通风处阴干，再捆成捆。但在晾晒时，防止露水淋着，以免色泽变黑发霉。

规格质量：嫩枝、叶，身干色绿，不霉，无老梗。

包装与保管：扎捆。宜放干燥处保管，防止发霉。

性能：味苦，性寒，有小毒。祛风湿、治麻痹，用作散风、燥湿药。

附：种植方法

一、选地与整地：豨薟草适于粘土或黑质土壤种植，不怕重茬。秋收后将留种地深耕5至7寸；来年谷雨前复耕一次，每亩施粗肥万斤左右，并耕入地内，整平作畦，然后进行播种。播种有两种方法：

(一)育苗移植：谷雨前先将畦面整平，每亩播种子半斤，撒入畦内，用耙耨一遍，使种子与土混合，随即浇水，六、七天苗可出土。当苗高2至3寸时进行间苗，苗距5分。麦收后进行整地、施肥，作畦移栽(这时苗高达1尺左右)。首先挖穴坑，深2至3寸，每畦两行，行距1.5尺，株距1尺。将秧苗移栽坑内，复土埋严根部，用脚踩实、浇水，十天后即可缓秧成长。

(二)直播方法：芒种前十天，在麦地行间开沟撒种，沟深寸许，复土5至6分。每亩播种量半斤，播后随即浇水。麦收后苗高2至3寸，进行间苗，行距1.5尺，株距1尺。

二、田间管理：苗高2至3寸时，即进行浇水和除草；苗高1至1.5尺时追肥，一般每亩施化肥10斤即可，追肥后浇水，以加速植物吸肥力。在植物生长期间，要保持土壤湿润。

三、收获：豨薟草在白露至秋分即成熟。当其花苞未开放时即可割收；但留种子的须让其继续生长。霜降后种子成熟，用镰刨下晒干，打下种子，放干燥处保存，并防止烟熏，以备来年种植。

著 草

别名：鋸草、羽衣草。

土名：一枝蒿。

来源与形态：

屬菊科，为多年生草本，自生于山野。茎高2至3尺，直立，多丛生。叶互生，細长，羽状分裂，裂片又作羽状浅裂，形似鋸条。秋季茎頂开白色或淡紅色小花，呈头状花序。

主要产地：易县、兴隆和灤平县，以及承德市。

产季：在4至5月間采集。

采集与加工：

药用其全株。用镰刀将全株割下，晒干即可。

规格質量：色綠，不带根，純淨。

包装与保管：扎捆，外面裹席。保管时防止受潮。

性能：味苦酸，性平。为益气、充肌肤、明目药。



植物全形

槐 花 附：槐米、槐角

别名：穰花：“槐花”，花蕾：“槐米”，果实：“槐角”。

土名：槐树子、家槐花。

来源与形态：槐屬豆科，为落叶乔木。茎高3至4丈，叶为羽状复叶，小叶长卵形，顶端略尖。初夏枝梢开黄白色蝶形小花，呈圆锥花序。花落后结长荚果，呈连珠状，十月成熟，内含有许多黑色种子。未开放的花蕾即是槐米。

产地：全省各地均产。

产季：在夏、秋两季采集。



1.带花的枝叶 2.带果实的枝 3.花蕾 4.花

采集与加工：药用其花蕾、花及果实。槐米：在花苞未开放时，用镰刀将带花蕾的枝条割下，曝日晒干，捋下花蕾，拣去杂质即可。槐花：当花盛开时，将树下扫净，待花落，收集起来拣去杂质，当日晒干。避免露水或雨淋，以免变色。槐角：冬季用竹竿打落，晒干即可。

规格质量：槐米：黄绿色，未开花蕾，整齐，无杂质；槐花：净花，黄色，整齐无杂质；槐角：色黄绿，整齐饱满，身干无杂质和虫蛀。

包装与保管：均用席包装。保管时宜放干燥通风处，防止发霉、生虫。

性能：槐米、槐花性平，味苦，泻热、凉血，用治五痔及作一切止血药。槐角性寒，味苦，治肠风便血。疗内外五痔，祛风、解热。

蒺藜

别名：旁通、屈人、止行、休羽、升推。

土名：蒺藜狗子、硬蒺藜。

来源与形态：属蒺藜科，为一年生草本植物，自生于山野。茎平卧，如蔓状，分枝很多。叶对生，偶数羽状复叶，小叶长椭圆形，两端小叶较中部稍小，全缘。夏季于叶腋间开黄色五瓣花。花落后结果实，3至4分大，表面有突起棱角，如针状，生时绿白色，成熟时则变成黄白色。

产地：全省各地均产。

产季：在6至7月间采集。

采集与加工：药用其成熟果实。用镰刀将全株割下，晒干，打下果实，再用石碾碾去硬刺，除去杂质即可。

规格质量：籽粒成实，青白色，身干无杂质。

包装与保管：用麻袋包装。保管时防止受潮。

性能：性温，味苦。用作平肝、息风、破血、喉痹、明目、轻身。



1.带花及果实的枝 2.根 3.花 4.生药外形

蓮

附：藕节、荷叶、荷梗、荷花、莲须、莲子

土名：荷花、莲花。

来源与形态：属睡莲科，为多年生草本，生于池塘湖泊之

水中。地下茎横生，肥大，长圆柱形，有节，节间长。叶大而圆如盾形，浮于水面，有长叶柄。夏季抽花茎，伸出水面，顶端开淡红色或白色大形花。果实为许多坚果而形成的聚果（附图一）。

主要产地：高阳、徐水、怀来、邢台、大名、曲周、乐亭、宝坻、静海、正定、元氏县，以及唐山、承德市。



(图一) 植物全形


产季：花及花蕊于夏季采集；叶、根茎、果实于秋、冬季采集。

采集与加工：药用其全植物。其根茎名“藕”，节名“藕节”，叶名“荷叶”，叶柄名“荷梗”，花名“荷花”，花蕊名“莲须”，果实名“莲子”（图二）。由于其成熟期不一致，须分别分期采集。夏季当花苞未开放时摘下晒干，然后捆成一百朵的小把。花蕊在花将落时采下，曝日晒干。秋后果实成熟时割下莲蓬，摘其果实，放锅内用炒热的砂土炒烫，烫至外皮（果皮）发脆或显小泡时，用筛子将莲子筛出，放于木墩上用刀剥（木墩上应挖好莲子模型的小凹穴），去其硬壳（果皮），再用温水浸泡种子，然后剥去外层红色膜皮（种皮），晒干即可。9至11月间刨出根茎，洗净，在节两端各留五分长处用刀切下，晒至七、八成干，撞去须毛，再晒至足干，即为“藕节”。

规格质量：藕节：灰褐色，去净须毛，节两端不带根茎或带得很少，无泥土，纯干；荷叶：灰绿色，整齐不碎，不霉烂，纯净；荷花：朵整齐不碎，无开瓣，淡红色或黄白色，身干不霉；莲须：色鲜黄，整齐不碎，身干无杂质；莲子：个饱满，整齐不碎，色白者佳。

包装与保管：莲子用麻袋包装，其他均可用席包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮发霉。莲子易受虫蛀，夏季须封闭严密或放冷室内储藏。

性能：莲子及莲须：性平，微温。为滋补强壮药。清心、固精、止泻、治腰痛、神经衰弱、遗精、失眠等有效。藕及藕节，性凉。清凉、止渴、解酒毒，并有止血之效。治咯血、吐血，生捣汁饮之。荷梗及荷叶：性平。升清、散瘀、消暑、化热，用为止血及解毒药。治久下痢、肠出血、妇人崩中、产后恶血、赤白带下，男子遗精或夜尿等症。花：揉碎贴肿毒，促脓肿之吸收。



生药外形: 1. 荷叶 2. 花苞 3. 莲房 (莲蓬) 4. 莲
子 5. 莲须 (花蕊) 6. 荷梗 7. 藕节

(图二)

猪 苓

别名：地烏桃、豕橐。

土名：野猪粪。

来源与形态：屬多孔菌科，为寄生于多年樺树、枫树根間的一种菌体。地上无苗，离地面約1尺多深，成不整齐的块状。質輕，外表棕黑色，有瘤状突起和皺紋，形似猪粪。

主要产地：兴隆、丰宁、青龙、蔚县、怀来、内丘、邢台、涞源、易县、阜平和平泉县，以及承德市。

产季：一年四季均可收集。

采集与加工：药用其菌体即猪苓。猪苓地上无苗，寻找較為困难。根据各地經驗証明，在生长猪苓的地方，土壤肥沃发黑，雨水渗透也快，小雨后地面仍显干燥，此系猪苓吸收大量水分所致。发现后，

深刨約1尺左右，即有猪苓，多分两三层生长。刨出后，除去小石块及泥土，晒干即可。

規格質量：个大体肥，質充实，皮黑褐，肉白，不带石泥，身干者佳。

包装与保管：用筐或席包装。宜放干燥通风处保管。




生药全形

性能：味甘，性平。为利尿药。治水肿、脚气、淋疾、消渴，兼有解热作用。

猫眼草

土名：打碗棵。

来源与形态：属大戟科，为二年生有毒草本，自生于道旁



1. 植物上部形状 2. 根

阴湿地带。茎高1尺许，直立，断其茎叶流乳白汁。茎顶部以下的叶互生，狭长，呈线形，顶端尖圆，无叶柄，全缘；茎顶部五叶平展轮生，叶形与下部叶相似，五叶之上歧生五枝，每枝再分二小枝，每小枝又分二小枝，各小枝分杈处，轮生两片半圆形小叶，凑合成圆形，似猫眼。小枝顶端着生淡黄褐色小花。

产地：全省各地均产。

产季：在6至7月间采集。

采集与加工：药用其全草。用镰刀将全株割下，除去杂草，晒至八成干捆成小把，再晒至足干即可。

规格质量：全草，整齐不带根，身干色黄绿。

包装与保管：用席包装。保管时宜放干燥通风处，勿使其受潮。

性能：民间用之煎熬为膏，敷无名肿毒极有效。

鴨跖草

别名：鷄舌草、碧竹子、竹叶菜、耳环草。

来源与形态：属鴨跖草科，为多年生草本，自生于山野。茎高2至3尺，质软，基部横卧地面。叶互生，广披针形，基部呈鞘状，包于茎上。夏季茎梢开花，花冠蓝色不整齐，外部有大苞包围，早晨开放至午后则萎缩。花的蓝色汁液可做绘画颜料。

主要产地：易县、涞源、青龙、兴隆、平泉和灤平县。

产季：在6至7月间采集。

采集与加工：药用其全草。用镰刀将全株割下，晒干即可。

规格质量：全草，色绿，身干纯净。

包装与保管：扎捆，外面裹席。保管时防止受潮、发霉。

性能：味苦，性寒。治寒热、瘧疾、痰饮、疔肿、小兒丹毒、发热、痢疾等症。



鸭跖草全形

錦 灯 籠

别名：酸浆、灯笼草、王母珠、洛神珠、天泡草、苦葳。

土名：紅姑娘、豆姑娘皮。

来源与形态：属茄科，为多年生草本，自生于山野。茎高



1.带果实的枝 2.生药外形

2至3尺，直立。叶互生，卵圆形，顶端尖，边缘有疏大锯齿。夏季于叶腋间开白色合瓣花。果实为浆果，赤色，包被于萼内，萼呈赤色，在花落后生长如灯笼。种子为黄褐色，扁圆形。

产地：山区各县均产。

产季：在秋末采集。

采集与加工：药用其萼苞。成熟后将灯笼摘下，去掉里面圆球形浆果，将外皮（萼苞）晒干即可。

规格质量：净皮，整齐不碎，色红，身干，无杂质。

包装与保管：用席或麻袋包装。保存时防止受潮。

性能：性寒。能清火、消郁结。主治咽喉肿痛。

樺 树 皮

别名：白桦皮。

来源与形态：属桦木科，为落叶乔木。干高2至3丈，树皮色白有紫黑色斑纹，薄而易剥。叶卵形而尖，边缘有锯齿，叶柄长，互生。夏季开黄褐色单性花，呈穗状花序，结实如球。

主要产地：蔚县、张北、易县、涞源、平山、正定、新乐、平泉、青龙、兴隆、灤平、遵化、薊县和迁安县，以及秦皇岛市。


产季：在夏季采集。

采集与加工：药用其树皮。用刀在树干上横割再纵割，透皮至木栓层，皮即剥落，晒干即可。

规格质量：皮厚，片大，外表面灰白色，内表面棕褐色，身干。

包装与保管：扎捆或用席包装。保存时防止受潮。

性能：性平。为解热药。有防腐之效，并治黄疸，能解热、利尿。



1.带花序的枝叶 2.生药外形


薄荷

别名：龙脑薄荷、蕃荷叶、莫生。

来源与形态：唇形科，为多年生草本，自生于山野。亦有栽培者。高1至3尺，茎方中空。叶对生，卵圆形而尖，边缘有细锯齿，叶柄短。秋季于叶腋间开紫色唇形花，呈轮伞花序，全体密生短毛，有芳香、清凉味。

产地：全省各地均有种植，以安国、新乐县，以及唐山、承德为最多；野生的多产在山区。

产季：头茬在小暑前五、六天内收割；二茬在秋分至寒露



1.带花的枝 2.花放大

收割。

采集与加工：药用其全草。选晴天的早晨，用镰刀离地面约1寸处将全株割下，当天曝日晒至七、八成干，然后捆成五、六斤重的小把，再晒至足干（注意防止雨淋、霜打，以免影响质量）。

規格質量：色綠，不帶根，身干，無雜質。

包裝與保管：扎捆，外面裹席。保存時宜放乾燥通風處。

性能：味辛，性溫。發汗、散風熱。為驅風、清涼、健胃藥，並用於提取薄荷冰。

附：種植方法

一、選地與整地：薄荷適於在稍帶砂質的土壤上栽植，並須有水源條件；不宜在沙地或粘土地上種植。留種的土地，須在秋季深翻，來年春化凍後即進行淺溝作畦，畦寬2.5尺，畦長可根據地形而定。

二、栽植：薄荷多適於春分栽植，最晚不得超過清明。栽植前一天，先澆水溼畦。栽植時先用耢子開溝，深4至5寸，行距8寸，並將溝底整平，然後將選好的潔白脆嫩的種根（地下莖），切成1至2寸長小節，均勻撒於溝內（每畝須種根180至200斤）。栽後立即復土（約1寸厚），不要用腳踩，隨之澆大水一次。

三、田間管理：栽後兩三天在溝內施土糞萬斤左右，十幾天後苗即可出全。此時可根據乾旱情況進行澆水，並淺鋤一次（只划破地皮即可，以免傷根）。苗高4至5寸時追硫酸10至15斤，追肥後隨即澆水以加速植物的吸肥力。頭茬收割後，二茬長至半尺高時再追硫酸15至20斤或餅肥50至60斤，並經常保持土壤濕潤，有草即除。

四、收穫：一年收割兩次。頭茬在小暑節，當其個別植株開花時即可收割；但不可過晚，以免影響二茬生長。二茬在秋分後進行收割，為避免霜凍，最晚不應遲於寒露。

五、種根的管理：薄荷系用根莖繁殖。為使種根在地下安全越冬，收割二茬後澆一次水，使土壤濕潤，並蓋圈肥一層。結凍前澆凍水一次，來年栽植前刨出，挑選肥大、節短、色白的新根作種根。

薏 米

别名：玉珠、薏米、薏珠子、米仁、回回米、苞实。

土名：草珠子。

来源与形态：屬禾本科，为一年生草本。茎高4至5尺，多分枝。叶互生，长披针形，頂端尖，基部包茎着生。七月中旬于茎梢或叶腋間开白色小花，作穗状花序。花落后結穎果，卵圓形，頂端短尖而有孔，淡褐色有光澤。外壳較硬，剖开外壳內含有白色种仁，披有淡褐色薄皮。

主要产地：平山、正定、安国、阜平、平泉和宝坻县，以及石家庄、承德市。

产季：在8至9月間采集。

采集与加工：药用其种仁。果实成熟后，用镰刀将全株割下，打落果实，除去杂质，再晒至足干。然后用石碾碾开硬壳（果皮），再用风車搗去糠壳，反复碾三次，直到米粒色白光亮为止。

规格質量：以个大、整齐、均匀、質坚实饱满，碎米不超过15—20%，身干色白者佳。

包装与保管：用麻袋包装。保存时严防虫蛀，夏季应經常曝晒或熏制。

性能：甘淡，微寒。为健脾、滋补、潤腸、宣水、去浮肿药。可治水腫、脚气、泄泻、腸痛、肺痛等症。

附：种植方法

一、选地与整地：薏米喜肥沃土壤，并有充足的水源条件，低洼或粘質土地亦可种植，生长期180天左右。惊蟄至春分开始整地深翻，每亩并撒土粪万斤以上，随之翻入地內，整平作畦。畦长按地形而定，寬3尺，每畦分两行交錯刨穴，行株距各1.5尺。

二、播种与管理：薏米系用种子繁殖，清明前播种。在整



1.带果实的枝 2.生药外形

好的穴坑内，每穴点种子十枚（每亩须种子15斤左右），复土1寸厚，十天后苗可出齐（春分至清明）。苗高1尺左右时，每亩施大粪干200斤左右，促使其开花结果。夏季暴雨后要及

时浇水，否则易腐烂籽粒。

三、收获：薏米成熟期一般在白露至秋分間，果实变黑紫色时即可收割，亩产約400至800斤。将全株割下后晒干、脱粒、去皮即可。但留作种子的不去外皮。

薤 白

别名：野韭、乔葱、火葱。

土名：小蒜、野蒜、宅蒜。

来源与形态：屬百合科，为多年生草本。叶自地下鳞茎丛生，狭长綫形，表面平，背面略圓，質軟。秋季由叶腋間抽花茎，高1至2尺，頂端开淡紫色或白色小花，呈伞形花序。其鳞茎为白色球形如指头大。

主要产地：邢台、内丘、大名、巨鹿、涉县、蔚县、张北、龙关、涞源、易县、唐县、平山、元氏、兴隆、青龙、灤平和平泉县。

产季：在春、秋两季刨采。

采集与加工：药用其鳞茎。用鎬将其根刨出后，洗净泥土，除去残茎及須根，用蒸籠稍蒸，晒干搓去外皮即可。

規格質量：整齐，不带外皮，色白，身干不霉。

包装与保管：用麻袋包装。薤白易吸湿返潮，夏季应勤晒，宜放干燥通风处，并防止虫蛀。

性能：性温，味辛苦。能通阳泻浊，开胸脾、散結气。为鎮痛、健胃药。



1. 植物全形 2. 生药外形

翻白草

别名：鷄腿根、鷄眼兒、躑角草、天藕、茯苓草。

来源与形态：屬薔薇科，为多年生草本，自生于向阳地
茎高1尺左右。根出叶丛生，平鋪地面或斜升，奇数羽状



图一、植物全形

复叶，小叶长圆至椭圆形，边缘有钝锯齿，上面浓绿色，背面密生白色绵毛，叶柄长。夏季于茎端开黄色五瓣小花，作聚伞花序。果实为瘦果，细小卵形，表面平滑淡褐色（图一）。另外，省内也有用“委陵菜”当“翻白草”入药的（图二）。

主要产地：全省各地均产。

产季：在夏季采集。

采集与加工：药用其全草。用镰刀将全株割下，拣去杂草，晒干即可。



图二、 1.植物全形 2.花枝 3.花

規格質量：色灰綠，不帶根，身干无雜質。

包裝與保管：用席包裝。保管時宜放干燥通风處，防止受潮。

性能：性平。为止血及解热藥。治諸出血、热性病等。

瞿 麦

別名：石竹、大兰、大菊、巨句麦。

土名：十样景花。

来源与形态：屬石竹科，为多年生草本，自生于田野或种植。茎高1至2尺，丛生，有明显之节。叶狭披針形，細长而尖，对生拥抱于膨起的节上。夏季于茎頂开大形花，为深紅、淡紅或白色，单瓣重瓣等，花瓣的上端分裂，細而浅呈牙齿状。果实为蒴果，成熟时自頂端裂开。

产地：安国县种植；山区多野生。

产季：种植的一年可收割三次。头茬在芒种前收割；二茬在大暑前后；三茬在秋分前后。野生的一年多收割一次，一般在六、七月間采集。

采集与加工：藥用其全草。当花盛开时，用镰刀将全株割下，晒至八成干，捆成小捆，再晒至足干即可。

規格質量：叶多，全草青綠色，茎柔韌不柴，身干，不霉，无雜質。

包裝與保管：扎捆或用席包裝。保管時宜放干燥通风處，防止受潮。

性能：味苦，性寒。利水、通淋、清热、破血，用作利尿通經藥。

附：种植方法

一、选地与整地 瞿麦适应性較强，不择土壤，耐水怕旱，适宜于水源充足的地方种植。春季化冻后即进行翻地，并細致耙耨一遍，然后用鉄耙和刮板作成3丈长、2尺寬的畦。

畦面要整平，畦背要结实，以利追肥、除草、浇水。

二、播种：在谷雨至白露即可进行播种。先在作好的畦面按7寸行距划浅沟，然后将种子均匀撒于沟内（播种宜密，与麦田相同，因雨水后易死苗），随播随复土2至3分厚，播种后浇蒙头水。



植物全形

三、田间管理：播种后约五天左右即可出苗。因瞿麦耐水怕旱，要及时浇水、除草及松土。苗长到3至4寸高时可追肥一次，施饼肥、硫酸或其他肥料均可，数量不限，越多越好。追肥后要及时浇水。瞿麦每收割一次，待苗出齐后，要追一次肥，但应注意收割后，在幼苗出土前不宜浇水，防止烂根。越冬苗，要浇一次冻水，并

蒙一层圈肥保温，以使其安全越冬。

四、收获：与前相同。

藁 本

別名：藁炭、鬼新、微茎、鬼卿。

土名：藁本香。



1. 带花的枝 2. 生药外形

来源与形态：屬伞形科，为多年生草本，自生于山野。全体有疏細毛，茎高3至4尺，叶为三回羽状分裂，裂片頂端尖銳。夏季开白色五瓣小花，呈复伞形花序。其根为不規則的块状，外表黑色，周围及下側着生許多細长須根，有特異芳香味。

主要产地：易县、涞源、唐县、阜平、邢台、涉县、內丘、正定、平山、新乐、青龙、平泉、兴隆、蔚县、涿县、怀来和龙关县，以及石家庄、承德市。

产季：在春、秋两季刨采。

采集与加工：药用其根。将根刨出后，除去残茎及泥土，打壟晒干。翻壟时要在清晨进行，防止掉毛（須根）。

規格質量：身干肥大整齐，質坚实，无蘆头（残茎）和杂质。

包装与保管：用筐或席包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味辛，性溫。散风寒、湿邪，疗各种头痛，用作驅风、散湿药。

藜 蘆

别名：山葱、葱苳、鹿葱、葱葵。

土名：大叶藜蘆。

来源与形态：屬百合科，为多年生有毒草本。茎高2至3尺，根茎周围披棕黑色毛。叶丛生，广卵形，有平行脉，全緣。初夏抽茎开綠白色小花，呈圓錐花序，花暗棕色。花落后結橢圓形蒴果，內含有許多种子。其根茎四周簇生許多細长的根。

主要产地：易县、涞源、阜平、蔚县、迁安、昌黎、遵化、內丘、涉县、邢台、平山、正定、新乐、青龙、兴隆和平泉县，以及石家庄、承德、秦皇島市。

产季：在夏、秋两季采集。

采集与加工：药用其根及根茎。用鐮将根刨出后，切去茎叶基部，洗淨晒干即可。



植物全形

規格質量：肥大，色青白，不帶綠葉，身干，不霉。

包裝與保管：扎捆，外面裹席。保管時宜放干燥通風處，防止受潮。

性能：性寒，味苦，有毒。療中風癱瘓，催吐劑，用以急救解毒。因催吐作用極強，故適于牲畜作催吐用。外用治疥癬、惡瘡等症。但內服必須慎重。

悬 构 子

別名：沿构子、山莓、木莓、树莓。

土名：托盤。

來源與形態：屬薔薇科，為落叶灌木，自生于山野。莖高5至6尺，全体生刺。葉互生，掌狀分裂，裂片三至五片，邊緣有鋸齒，葉柄長。夏季于葉腋間開白色五瓣花，下垂。果實為許多小核果聚合成的肉果，呈紅黃色，可供食用。

主要產地：平泉、隆化、圍場和灤平縣。

產季：在夏季採集。

採集與加工：藥用其成熟果實。將成熟果實摘下後，盡速晒干即可。

規格質量：整齊不碎，深紅色，不帶莖、葉，身干不霉。

包装与保管：用麻袋或箱包装。悬构子易遭虫蛀，须密闭貯儲于干燥处。

性能：味酸，性平。内服治痛风、醒酒、解渴，并有祛痰作用。外用涂丹毒。



1.花枝 2.果枝 3.生药外形

藿 香

别名：兜娄婆香。

来源与形态：属唇形科，为多年生草本，自生于山野。茎



1.带花序的枝 2.花(放大)

高3至4尺，直立，方形。叶对生，作长心脏形，頂端长尖，边缘有锯齿，叶柄细长，叶腋间有向上伸展的分枝。夏季于茎頂开紫色唇形花，呈穗状花序。果实为倒卵形瘦果。

主要产地：种植的产于安国县；野生的产于兴隆、灤平县，以及承德市。

产季：在白露前后采集。

采集与加工：药用其全草。用镰刀将全株割下，拣去杂草，放干燥通风处阴干即可。

规格质量：全草无根，身干色绿，无杂质。

包装与保管：扎捆。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味辛，性温。醒脾、和胃、辟恶、止呕。用治霍乱、吐逆要药。

續 隨 子

别名：千金子、千两金、菩薩豆、拒冬、白随子。

来源与形态：属大戟科，为二年生有毒草本。茎直立，高3至4尺，断之有白汁渗出。叶对生稠密，作十字形，叶片狭长披针形，叶背及茎呈绿白色。夏季于叶腋间开黄紫色花，花落后结黑褐色扁圆形果实，内有种子三粒，表面呈淡褐色，有纹理。

主要产地：安国县、保定市均有种植。


产季：在8至9月间采集。

采集与加工：药用其种子。成熟时，将其果实摘下，晒干，将种子搓出，去掉杂质即可。

规格质量：籽粒成实，淡褐色，纯净。

包装与保管：用麻袋包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮或虫蛀。

性能：味辛，有毒。治妇人血结、月闭、瘀血、癥瘕，除虫毒、心腹痛等症。



1. 植物全形 2. 生药外形

纈 草

别名：穿心排草、鹿子草、甘松。

来源与形态：属败酱科，为多年生草本。茎高2至3尺。



1. 植物全形 2. 生药外形

叶初狭长，后变阔大，每节叶对生，作十字形呈羽状复叶，边缘有疏锯齿。夏季于茎顶簇生淡红色小花，作伞形花序。其根茎粗短，四周着生许多细长的须根，黄棕色至灰棕色，有特异的臭味。

主要产地：青龙、兴隆、灤平、平泉、丰宁、易县和滦源县。

产季：在秋季刨采。

采集与加工：药用其根茎。用镐将根茎刨出后，去掉残茎及泥土，晒干即可。

规格质量：黄棕色，无残茎及泥土，身干不霉。

包装与保管：用席或麻袋包装。保管时宜放干燥通风处，防止受潮或发霉。

性能：味微甜而略苦。治恶气、风疖、心腹痛等症。

動物類

人中白

来源：屬尿壺中自然沉結的固形物体。色白經久而干，質極硬，以灰白色的薄片为最好。

包装与保管：用木箱包装。容易保管。

性能：味咸，性辛。清火邪，用作泻火、清热药。治偏头痛、肺結核、咯血、小兒軟骨等症。

人中黃

来源：系甘草粉装入竹筒中，一端有竹节 一端用新布片塞紧。冬月浸在粪坑中，春季取出，漂洗干净，挂在干燥通风处阴干，破竹取出即是人中黄。

产地：安国县有加工习惯。

性能：味甘，性寒。泻胃火、解疫毒。治丹毒、斑疹、伤寒、天然痘及恶疮等症。

刁 骨 附：刁头、刁爪

别名：皂雕骨、雕骨。

土名：老雕骨。

来源与形态：雕屬鷹科，栖居深山林野間。嘴强大，呈灰色，嘴根有黄色，嘴鈎曲形，眉突出，眼大而深，眼帘淡褐带金色。毛色深褐，背面羽毛有暗色的阴紋，翼尖达尾端，黄褐色，有白紋，基部有灰色条紋。脚短被毛羽而色黄。有强銳鈎爪，性猛力大。

产地：我省山区和沿海地区均有，惟山区有猎取习惯。

产季：在春、冬两季为多。

收集与加工：其刁骨、刁爪、刁头供药用。将其收集起来，晒干即可。

性能：骨治折伤、断骨症；头治头晕、瘰症；爪治五痔等症。



动物形状

大將軍

土名：触角牛、屎蜾蠃。

来源与形态：屬甲虫类，多生在池澤潮湿地方。全身椭圆形，长1寸左右，头頂有独角黑亮如漆，背有硬甲。日伏土中，夜見灯火則飞出，喜食人糞，故有“屎蜾蠃”之称。

产地：安国、邢台、青龙、兴隆、黃驊、靜海和霸县有生产习惯。

产季：在夏、秋两季捕捉。

捕捉与加工：药用其全身。将此物捕捉后，用淨水冲洗几次，然后用热水燙死，晒干即可。

規格質量：身干不碎，无虫蛀、不霉。

包装与保管：用木箱包装。保管时宜放干燥通风处，夏季容易生虫，必須多晾晒或用硫磺熏制。

性能：味咸，性寒，有毒。治結病、癲癩等症。

土元

别名：蟻虫。

土名：土鳖虫、臭虫母、盖子虫。

来源与形态：屬爬虫类节肢动物。阴湿地方較多，常居于粮仓下、糠土內。体长1寸左右，身圓前狭后寬，色赤褐或黑褐而有光澤，头細小，活动方便，足三对发育相等，前胸扩大如盾状，橫紋錯起。

产地：全省各地均产。

产季：在夏、秋两季为多。

收集与加工：药用全虫。将其捕捉后，用热鍋烘死晒干或用盐水洗死晒干都可。

規格質量：身干不碎，赤褐色，无土及杂质，不霉。

包装与保管：用箱包装。宜放干燥处，夏季应用硫磺熏制

或經常晾晒，以防虫蛀。

性能：为通經、催乳药。



动物形状

山羊血

别名：野羊血。

来源与形态：山羊屬羊科，为脊椎哺乳类动物。生活在深山曠野中，形状象綿羊，但身体比較狭。头长脖子短，額上有一对角，与綿羊角不同。其角很长，根部略成三角形，角尖多向后，表面有环紋，也有前面显疙瘩状的。耳朵比較大，口内上牙中沒有門牙和犬牙。毛的形状有許多种，但都不如綿羊的毛柔軟而长。毛的顏色有灰、有白，也有黑白混杂的。身体长度一般在2至4尺之間。

主要产地：张北、怀安、蔚县、龙关、怀来、易县、涿源、承德、兴隆和青龙县。

产季：一年四季都可猎取。


猎取与加工：药用其血。山羊灵敏善跑，捕捉较难。为达到活提取其鲜血，一般多采用套索下网和陷阱方法猎取。捕捉后，用长注射器刺入其心，抽出心血或杀后取血盛于盆内，再将山羊肠子取出刮净油脂，把血灌入肠子中，用细绳扎成一寸长的小节，晒干后即可。

规格质量：心血深紫有光，血干成块，血纹成条者佳；血色暗褐无光，多系屠杀所取之血，较次。

包装与保管：用木箱包装，密封。宜放干燥处保管，防止受潮或虫蛀。

性能：味咸，性温。止血、消瘀、和伤、散血。治吐衄、跌打损伤、筋骨疼痛及一切痈肿等症。

注：山羊血与其他兽类的血不同。鉴别的方法是：用一盆净凉水，放入山羊血少许，其血即由盆底向上升起成线形血丝；假血放入水中即四散冲开，无上升的线形血丝。另外，用鸡血半碗放入山羊血一粒，过一夜即无血而变成水；如用久已凝固的臭鸡血一块放入山羊血中，过一夜即变成鲜血。如系假血即不起变化。



动物形状

牛 黃

別名：丑宝、心黄、西黄。

土名：京牛黄。

来源与形态：牛屬脊椎动物哺乳类、牛黄是牛的胆囊胆管，腸管或胆肝間的結石。形状大小不一，大者如鷄卵，小者如豆粒。通常呈方形、稜角形、栗子形、鴨蛋形、扁圓形、米粒形，色澤鮮艳，有宝光；体輕，質松脆，易碎，大块多不完整，断碴整齐，有間隔均匀的薄层，黄褐色或黄色。嗅微腥，味甘微苦，清凉芳香，有刺舌感，嚼之即溶解。另有人工牛黄，系天津制葯厂合成品，呈块状、顆粒状或粉末状，色淡黄，味极苦。

产地：山区各县均产。

产季：一年四季均有。

收集与加工：牛生結石后，不吃草，喜喝水，逐渐消瘦。病牛宰后，随捏胆囊，如有硬块結石，即为牛黄。将胆汁濾去（如不及时濾出，牛黄在胆汁內待久即变黑，謂吃胆牛黄）取黄晾干，大块黄趁湿时用絨綫或灯心草纏之，避免裂碎。并严禁日晒，防止变色及裂碎。

規格質量：整齐不碎，色鮮黄，光亮，身干无杂质者佳；一个小破碎，色黑者次之。

包装与保管：用鉄盒包装，外面裹棉花囊。保管时宜放干燥通风处，防止受潮发霉，并避免重压。

性能：味苦，性平，有小毒。泻热利痰，通窍、解热、鎮惊及解毒葯。

注：过去葯市上常有伪造牛黄，其区别是：①眞品色鮮黄，断面有薄而均匀的层次，質松脆易碎，嚼之有清凉芳香味，取少許蘸水涂于指甲上能染成黄色（俗称透指），水洗暂时不脱。②伪品色暗黄，层次厚薄不均，質坚，嚼之味苦，无清香味，蘸水亦不透指。



1. 动物形状 2. 牛胆 3. 牛黄

牛胆汁

来源与形态：牛胆汁就是牛苦胆，大小不一，一般象甜瓜形状。外形似囊，内有粘胶性的液体胆汁，黄绿色或暗绿色，味臭而苦。

产地：全省各地均产。

产季：一年四季均有。

收集与加工：药用其胆汁。宰牛后，割下胆囊（注意不要碰破，以免胆汁流失），将口扎紧，放在容器内贮存。

規格質量：淨胆汁，色黃綠，味極苦，無水者佳。

包裝與保管：用酒篋或木桶裝。貯存時宜放低溫處。

性能：味苦，性大寒。明目、除心腹熱渴。治心熱、止下利。又是加工胆星的原料。

胆 星

來源：胆星是用草藥材“天南星”與“牛胆汁”加工而成。我省安國、薊縣、天津都有數年加工習慣。其加工方法是：

一、原料配制：牛胆汁7斤、天南星1斤（以7比1為標準）。加工量大小依此類推。

二、主要用具：水缸、蒸籠、鍋、搪瓷盤和干燥室。

三、加工過程：假設以天南星60斤、牛胆汁420斤為一料。將天南星60斤用水洗淨泥土，晒干後，軋成細粉，放入缸內，同時放入牛胆汁120斤拌勻（420斤胆汁分四次加入）。夏季用太陽晒，冬季放暖室內，使天南星加速發酵，並經常攪拌。經半月左右，放入特制的兩層大蒸籠內，每層一個鍋，分放兩個鍋內（簡稱籠鍋），再放第二次牛胆汁120斤，用火連蒸三天（火力大小要掌握適宜，每天燒煤360斤）。待涼後出鍋，放入缸內，使第二次發酵，每日攪拌數次。經一個月的時間，再次蒸制，將料子分放兩個籠鍋內，隨之放入第三次胆汁90斤，再蒸三天。出鍋後放入缸內晾之，每日攪拌數次。經一個多月的時間，再第三次放入籠鍋內，同時放入第四次胆汁90斤，再蒸三天（切忌蒸時水流入鍋內）。出鍋後將料子放入特制的搪瓷盤內（盤長短不定，以寬約3尺、高3寸為宜），然後放入干燥室（干燥室的地面要用洋灰鋪平，盤下面放爐火，火上隔3寸左右放一鐵板，使火力能達全面）。烘制時間，夏季須24小時方能烘乾，冬季時間要長一些。在烘時必需用鏟子勤翻，以免料子受損失。將烘乾後的料子再放入蒸鍋內蒸約12小時，使其柔軟。出鍋放在石板上，分成約4兩重一份，做成圓球

形，再装入牛胆皮内晒干，即为药用胆星成品（将牛胆皮外边厚皮剥掉，用内皮膜装）。

包装与保管：用木箱包装。贮存时防止受潮。

性能：味苦、性温。治胸痛、金疮、折伤、瘀血等症外贴有效。

五 谷 虫

别名：粪蛆、屎虫。

土名：蛆。

来源与形态：属蝇科，为苍蝇的幼虫。夏季生在粪坑中，体为圆柱状，色略白，有环圈数十个，尾长匍行。10月入土中化为蛹，色白，老时则变灰色，有节，尾长无足而滚行。

产地：全省各地均产。

产季：在7至8月间收集。

收集与加工：药用五谷虫（即粪蛆）。从肮脏的地方将其收集后，装入布袋内或放密筛子内浸入活水中，冲洗干净，晒干即可。

规格质量：身干，黄白色，不碎，无尾巴者佳。

包装与保管：用麻袋包装。宜放干燥处，夏季应多晾晒，防止生虫。

性能：性寒。为清热毒、消痞积药。

水 蛭

别名：红蛭、马蛭、水痴、草痴。

土名：水麻贴、蚂别。

来源与形态：属水蛭科，多生长在池塘、河沟、水田等水中。体长稍扁，背面色黑略绿，有黄直纹，腹部黄色。口在其下面，有吸盘。

主要产地：高阳、邢台、衡水、正定、静海、霸县、张北、玉田、青龙和平泉县，以及承德、秦皇岛、唐山市。

产季：在夏季捕捉。

捕捉与加工：药用全身。用网或箴篱将其捞出，以开水烫死，曝日晒干即可。

规格质量：个大身干，不碎，不霉，黑褐色。

包装与保管：用麻袋包装。保管时宜放干燥通风处，夏季应用硫磺熏制，以防虫蛀。

性能：味咸苦，性温，有毒。破血癥、通月經、利水道、堕胎等。



动物形状

五 灵 脂

别名：盍旦、丹芝、白芝、龙芝、五灵芝。

土名：寒号鸟屎、寒耗虫屎、懒老婆屎。

来源与形态：寒号鸟属哺乳纲翼手目蝙蝠科。寒号鸟体驱



1. 动物形状 2. 生药外形

較蝙蝠粗大，大者體重10余斤，頭吻短闊，耳壳發達，體毛黃褐或黑褐色，栖于山林的樹穴或岩穴內。其糞顆粒狀，長橢圓形，似鼠糞，兩端略圓，表面粗糙質松，俗稱靈脂米。亦有呈不規則塊狀者，黑褐色，帶樹脂質，俗稱靈脂塊或糖靈脂，氣均臊惡。

產地：山區各县均產。

產季：在春、秋兩季收集。

收集與加工：寒号鳥多栖于大山懸崖陡壁的石穴中，不築巢。據傳說此鳥排糞時不論飛出多遠，均回原處排糞，故有“千里吃食，一處排糞”之說。如發現寒号鳥常出入的地方，應進行勘查，發現穴後，即可採集五靈脂。取出後，搽去雜質，曬干即可。

規格質量：靈脂塊呈塊狀，帶樹脂質，黑褐色，無土及雜質者佳。靈脂米為橢圓形，顆粒狀，表面粗糙，黑褐色，整齊不碎，無雜質。

包裝與保管：用麻袋包裝。保管時宜放于干燥通風處，防止受潮。

性能：性溫，無毒。內服治腹痛、疝痛、月經過多，崩漏腸風、小兒疳疾；外敷療蝮蛇咬傷。


注：據說寒号鳥冬季毛脫光，怕冷，不飛出覓食，窩吃窩便，吃自己排出的糞。第一次排出的呈顆粒狀，謂“靈脂米”；吃靈脂米後再排出的糞便呈稀漿狀，日久即干成塊，謂“靈脂塊”。吃了拉，拉了吃，反復次數越多，則質量越佳。

瓦楞子

別名：瓦屋子、魁蛤。

土名：蚶子壳。

來源與形態：屬軟體動物蚌蛤類，為海蛤一種貝壳，多生于淺水海中沙泥處。其壳略呈三角形或心臟形，兩壳面鼓起，表面有壟似瓦楞，壟數很密，都由壳嘴部而散射。壳面色灰白或黑褐，里面乳白色，有光澤。



动物放大

产地：我省沿海地区均产。

产季：在春、秋两季产的为好。

收集与加工：药用其贝壳。收集方法与蛤壳同。

规格质量：身干不碎，无泥沙。

包装与保管：用草袋包装。容易保管。

性能：味甘咸，性平。祛痰痹、散血块。治痿痹、泻痢便脓血。

白丁香

别名：雀苏、青丹。

土名：麻雀粪。

来源：系麻雀之粪。麻雀多栖居在山野，身长2至3寸，羽毛灰黑色。过去居在房檐下，在每日早晨太阳未出前吱喳乱叫。其公麻雀屎就是“白丁香”，两头圆形。

收集与加工：药用麻雀粪（即白丁香）。今后应有计划饲养，否则由于除四害的深入开展，麻雀绝迹，影响药用其粪。收集时，去净杂质，晒干即可。

包装与保管：用麻袋包装。贮存于干燥通风处，防止受潮。

性能：味苦，性温，有微毒。消积胀。治疝气、癥瘕、积聚胀满、目痛及一切肿瘍等症。



1. 动物形状 2. 生药外形

龙 骨 附：龙牙

别名：陆虎遗生、青花龙骨。

来源与形态：系古代大爬虫，为象类动物之骨骼。由于埋在土中，年久而成为化石性，往往从地下掘出，如遇全副大骨有数十担之多。概称龙骨。

主要产地：涿源、蔚县、龙关、张北和平泉县，以及承德市。

产季：一年四季都有发掘。

收集与加工：药用其全骨（附龙牙）。龙骨一般多在挖水库时发现，收集起来晒干即可。

规格质量：身干，色白或黄白色，以舌舐之粘舌者为真

品；否則是偽品，不供藥用。

包裝與保管：用筐或麻袋包裝。容易保管。

性能：味甘，性平。治惡夢不安、止虛汗、遺精、下痢、子宮出血、帶下等症。

全 蝎

別名：薄虫、全虫。

土名：蝎子。

來源與形態：屬節足動物類。全蝎就是蝎子，頭胸短，腹部狹長，有足四對，尾端有毒鉤，全身有環節。喜吃小昆蟲和碱土、麸皮。每年立秋入蟄，驚蟄出世，在炎熱的伏天最為活躍。白天棲息在牆縫中或山石下，夜晚出來乘涼尋找食物、飲水。每年繁殖一次。我省有野生、家養兩種，以家養為多。

主要產地：家養以平山、滄縣、平泉、阜平、安國、易縣、靜海、新樂等縣，以及承德市；野生以灤平、青龍、興隆和龍關縣，以及承德市為多。

產季：在夏季捕捉。

捕捉與加工：飼養、捕捉和具體加工方法見附。

規格質量：身干，不碎，不霉，肚內無泥，略有咸味。

包裝與保管：用木箱包裝，內墊紙，裝後封閉嚴密。保管時宜放乾燥通風處，夏秋應熏制或用石灰埋藏，以防虫蛀。

性能：味甘辛，性平，有毒。為鎮痙藥。治小兒驚癇抽搐、破傷風、半身不遂、口眼喎斜、耳聾疝氣、子宮脫出，又是醫治乙型腦炎發痙要藥。

附：蝎子飼養及加工方法

一、養蝎房的設備：首先修建一間高5尺左右的養蝎房，牆壁用多年的舊牆坯或老灶坯砌成牆。牆厚1尺左右，房頂用草蓋成。砌房時，土坯與土坯之間留5分至1寸左右的縫隙，並僅在牆的上下端用泥，這樣能使坯的上下間留出更多的洞



动物形状

来，以便蝎子栖居。房子不設窗戶，只在前牆中部留一个长方形的普通門，并安装严密的木門，在門的左右靠近牆根各留一个約5寸寬、8寸高的通道，后牆和山牆留出同样的通道，作为蝎子平时出入的道路和收捕时用。牆的外面用泥搪糊严密，里面不要用泥搪糊。在房子的外面距牆基約2至3尺远的周围，挖1尺寬、1尺深的防护沟一条，用砖砌成后，再用水泥

或石灰抹好，以不漏水为宜。沟的里沿砌成斜坡，不要搪得太光滑，以免蝎子饮水时跌入水中淹死；外沿要陡，并要搪光滑，以免蝎子爬出。在春、夏、秋三季，防护沟内要经常存满清水，否则蝎子一夜就会跑光。另外在防护沟的一角，修一个储水池，以便随时换水和添水用，防止水臭和沟干无水。冬季要用坯把门口和通道堵严，次年惊蛰节以后扒开。室内要砌满老墙坯或灶坯，砌法和砌墙相同。在门里留一空地（似方桌大小），以便开关门和检查、放饲料时出入之用。

二、下种：养蝎房修好后，将防护沟内灌上水。待夏季捕捉（或收购）活蝎子后放入，以便繁殖。在下种时应掌握雌虫要多，雄虫宜少的原则（因雌虫在产幼虫后要死掉）。同时捉来的活蝎子应经挑选（雌虫体大腹大）后再下种，这样才能提高繁殖率。一般每座养蝎房下种10斤即可（每10斤在下年秋季约产180斤）。

三、饲料：蝎子喜食昆虫、碱土、麸皮和小谷子。在夏季夜里把门打开，放一小灯，吸引小虫到室内，以供蝎子食用，并解决一部分饲料。如果喂糠皮、小谷子时，可撒在墙边和坯缝中，以弥补小虫之不足，供其食用。

四、收捕：第一年夏季下种，到第二年秋后即可收捕。在收捕时，要事先将通道口堵好，在下边仅留一个通道口，用光滑的瓷盆，在对准通道口的地面上，挖一个象盆大小的坑，并把土移在防护沟外。然后把瓷盆放在坑内（便利蝎子爬出跌落盆内），并要准备好盛蝎子的容器（如白铁筒或光滑的瓷盆、笞帚）。准备齐全后，把通道堵严，防护沟内放满水，然后用白酒在房内喷酒后将门堵严，再把通道打开，蝎子在房内闻到酒气后，便纷纷从通道爬出，跌落盆内；如果爬到墙上或地面，可速用笞帚扫到盆内，不要等盆内蝎子跌满即把盆端起倒入筒或瓷缸内。收捕时要站在防护沟的外边，并要穿齐鞋袜，戴上手套，扎住袖口和裤腿，以免被螫伤。捕捉完毕后，要将过小的或选出一大部雌虫和少部雄虫，待房内酒气消失后再放

进房內，以便繼續繁殖飼养。同时在每个盛蝎子的容器中，不要放的过多，防止压死。最好随时收捕随时加工，以免造成逃脫或死亡的損失。

五、加工：在用水煮前，把活蝎子放在稍带盐質的冷水中（注意不要浸死），这样既使盐質浸透虫体，又能使蝎子吐出泥質，以提高成品質量。然后用箆篱把蝎子捞在开水鍋中，用大火煮一个鐘头左右。在煮的过程中，可以把浸蝎子的盐水倒入鍋內，并随时翻搗，直到把蝎子煮的脊背凹下去，成瓦壠状时（有少数因是大雌虫，腹內有幼虫，脊背凹不下去），即捞出摊晾在席上晒干。晾晒时虫体上会出现一层白色的盐質，但經儲存一个短时期后，盐質即会消失在虫体内，以保虫体不腐蝕。如果盐量不当或煮的不成熟，易于脫肢，成为次品或腐臭失去葯效。

加工前必須把死蝎子挑出，經检查不腐臭时可以单煮单存，以免影响成品質量。在下虫时还要注意鍋的容量大小，一次不宜下虫过多，水要寬裕些，每斤蝎子約用盐 2 至 4 两（夏季以 4 两为宜）。

六、捉野生蝎子的方法：在捉蝎子前，首先准备好 6 至 7 寸长、5 分寬的竹片夹子和光滑的白鉄桶或瓷罐一个，能避风的灯一盞。用具准备好后，在夏季的夜間趁蝎子出来乘凉和寻找食物的时候，沿着住宅外面的墙根寻找，发现后速用竹夹子捉住（注意不要夹死），放在桶或瓷罐內。


捕捉山蝎子，一般在阴坡，以阴雨后或谷雨前后較多，并多在白天捕捉。只要把山上碎石翻开，发现蝎子后即用以上方法捉起来。其加工方法与前相同。

血余炭

别名：乱发灰、血余。

土名：头发炭。

来源与形态：血余炭是用乱头发加工而成。其加工方法



1.人发 2.血余炭外形

是：将乱头发（男女发均可）用皂荚煎湯洗淨，晒干后，入瓦罐煨焦，但須勤翻动，掌握火候。火大了易成灰；火小煨不透，这都不适药用要求。

規格質量：表面呈黑灰色，块状，断面成蜂窩似的黑炭。

包装与保管：用木箱包装，箱內垫紙封閉严密。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：味苦，性溫。为止血和血药。治淋病、大小便不通等症。

羊 头 虫

土名：羊蚕、羊头虫。


来源与形态：羊头虫生长在山羊、绵羊的鼻腔中，一端尖，一端圆，长5分左右，黄白色的小虫，能行动。在夏季炎热天，多在羊打鼻涕时甩出，所以夏季产量为最多。见到后，及时拣起，晒干即为药用成品。

产地：凡羊牧场都产，惟承德地区有生产习惯。

规格质量：身干，整齐，黄白色，不霉。

包装与保管：用木箱包装，内垫纸封闭严密。保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：承德地区民间用之治羊角疯，偏、正头痛，表麻疹有效。并有悠久使用习惯。






1. 动物形状 2. 生药外形

地 龙

别名：土龙、地龙子、附蚓。

土名：曲蛇、蚯蚓。

来源与形态：属环节虫类。地龙即蚯蚓，生长在潮湿、腐植质较多的地方。身细长，约4至6寸，由许多环节组成，呈



1. 动物生活情形 2. 生药外形

圓筒狀，頭部略尖。腹面有細小短刺，以助前進，而防後退。在土中時、肛門向地面，吃土壤而生。能翻土，利於農作物生長，故農民視為益蟲。

產地：全省各地均產。

產季：在春、夏兩季產的為好。

捕捉與加工：藥用其全身。由土里挖出後，用小灰（即草木灰）噏死，去淨土，曬干或烘干均可，但要防止腐臭變質。

規格質量：身干，長條肥大，不碎，外面灰褐色，斷面灰白色，無泥土，不霉。

包裝與保管：用麻袋包裝。夏季易生蟲，熏制後應儲藏干燥通風處。

性能：味咸，性寒，有腥氣。為退熱、鎮痙藥。內服治喘、止痛；外用治燙傷（香油調勻）。

牡 蠣

別名：牡蛤、蠣蛤。

來源與形態：牡蠣為扁圓形，呈不正葉狀之貝殼，多生在海底岩石上。其殼由鱗狀薄片而組成，上下兩殼。上殼為不規則扁圓形或橢圓形，表面呈灰青、褐等各色；內面為乳白或黃



生藥形狀

棕色，有光澤。

产地：天津、唐山市，以及沿海地区。

产季：一年四季均可收集。

收集与加工：药用其貝壳。沿海漁民捕撈后，用刀剖开，鏟其肉供菜食用，将壳收集起来晒干即可。

規格質量：身干整齐，无泥土。

包装与保管：用草袋或筐包装。容易保管。


性能：味咸，性微寒。消瘰癧結核、肺結核、止崩帶遺泄、止汗、止血及胃酸过多症。

夜明砂

别名：天鼠屎、黑砂星、飞鼠屎。

土名：蝙蝠粪。

来源与形态：系蝙蝠粪。蝙蝠耳壳大，体有暗褐色的軟毛，多栖居在石洞或屋檐等处。日暮飞出，捕食蚊蛾，鳴声唧唧。它排出的粪便，即称夜明砂，色黑褐，两端略尖，形似鼠粪。



1. 动物形状 2. 生药外形

产地：全省各地均产，以山区为多。

产季：一年四季均可收集，以春、冬季为适宜。

收集与加工：药用蝙蝠粪。由蝙蝠窝里将粪取出后，除去杂质，晒干即可。

规格质量：身干，黑褐色，粒不碎，无杂质者佳。

包装与保管：用麻袋包装，保管时宜放干燥通风处，防止受潮。

性能：性寒，味辛。活血、泄热。内服治夜盲症；外用治齿痛、耳漏等症。

刺 猬 皮

别名：猬皮、猬鼠皮。

来源与形态：系刺猬之皮。刺猬系动物类，雌雄双栖居地上穴角或草垛底下。日伏夜出，多在树林、墙根或菜园、瓜地等处，喜吃昆虫和瓜果。身长5分至1尺，嘴尖吻形似鼠。足、尾均短，体侧及体背生有灰褐色的硬刺，惟腹生有软毛。遇敌卷体如卵形。

产地：全省各地均产。


产季：以秋季为多。

捕捉与加工：药用其皮。捕捉后，将刺猬吊起，把四腿割掉，用刀由头部至腹部开口，向下扯皮即掉。然后将皮的四角用钉子钉在木板上，晒干即可。

规格质量：身干，无残肉、油质和腿及虫蛀。

包装与保管：用筐包装。宜放干燥处，夏日容易被虫蛀，最好用石灰埋藏。

性能：为收敛、止血药。内服治痔疾、肠出血、梦遗、滑精、妇人子宫出血等症。



1. 动物形状 2. 生药外形



阿 胶

来源与形态：阿胶系用驴皮煎熬而成，我省安国县已有数十年的加工习惯。它的主要原料：纯净黑驴皮去毛；辅助原料：冰糖、南酒、豆油、白矾。其制造过程：

一、浸皮：将驴皮浸入水中一昼夜，取出把毛刮掉，洗去泥垢，随之割成碎片；然后再浸入清水中两昼夜，反复冲洗

干淨，以備熬制。

二、化皮：將洗干淨的碎駱皮裝入化皮鍋內（添半鍋清水），用大火煮一晝夜。當駱皮成稀薄的膠汁時，可將其汁取出過濾，然後放入瓷缸內（水甕）加白矾面少許，攪拌均勻，使其沉淀。同時將鍋內尚未成汁者，仍加清水，煎熬一晝夜。



1. 駱皮 2. 阿膠

如此連續三、四次，一直到膠渣壓淨為止（渣子可作肥料）。

將數次沉淀的膠汁，輕輕地用勺掏到另一烤鍋內，以小火熬半日之久，將火去掉，在鍋內靜置沉淀一夜。次日取出清膠液，倒入另一個烤膠鍋內，再用小火或炭火煎熬一晝夜，即成老膠。這時加冰糖、南酒、豆油攪拌均勻，取出倒入模型內，然後將凝固后的老膠從膠模上取下，用刀切成薄片，（一般2至3分厚）。切好的膠片擺列在晾膠床上（單層），然後抬到干燥室內，候七、八成干時，即緊密的裝在圈膠箱里，經四、五天即進行包裝。不成塊狀的，加工為膠釘。

三、包裝：從圈膠箱里取出，再晾在膠床上，重入干燥室，干到十足，再進行包裝即可。

規格質量：色黑亮而透明，無腥臭，夏季不軟。

包裝與保管：用紙盒裝，外皮用木箱包裝。宜放干燥處，防止受潮。

性能：養血潤肺，息熱柔肝，祛痰利尿。為止血藥。治吐血、咳血，產前產後出血及虛勞咳嗽。

注：每百斤膠皮膠加冰糖5斤、南酒3斤、豆油2斤、白矾3兩。

狗 宝

來源與形態：狗宝生在癩狗腹中。狗多為家飼養，過去用之守門護院。性猛、好斗，視覺、聽覺、嗅覺很敏感，身長3至6尺不等。但狗宝為難得之物。

規格質量：個大，重2至6兩，堅實，呈卵圓形如白石略青色；外表多不光滑，剖開有明顯層次，中央有 hollow、含水，有腥臭味。

性能：味甘咸，性平，有小毒。主治噎食有特效。



1. 动物形状 2. 生药外形

紅 娘

别名：袴鷄。

来源与形态：屬卵生虫类。其形似斑毛，但头部和翅膀色黑，两眼圓小黑亮而突出。頸下全身色紅且显著，故称紅娘。大者身長5至6分，小者2至4分。多生于河边、川谷的臭椿树上。

主要产地：安国、青龙、兴隆、平泉和灤平县，以及承德市。

产季：在秋季捕捉。

捕捉与加工：药用其全身。用网罩捕捉后，曝日晒至足干

即可。

規格質量：整齐，色紅，身干，不霉。

包装与保管：用木箱包装，封閉严密。保管时防止受潮或虫蛀。

性能：味苦，有小毒。治心腹邪气、阴痿、遺精、腰痛下气等症。

虻 虫

土名：瞎虻虫、瞎螞蜂、蚱猛。


来源与形态：系节肢双翅类的昆虫，多栖息在牧场，吸牛馬血液。体长约5分，色灰黄，头部闊，眼大黑綠色，口吻粗。胸有足三对，胸背有数条微凹的縱痕，腹部微扁，有节七环，翅透明，能飞。

主要产地：黄驊、张北、围場、丰宁、隆化、玉田和易县。

产季：在夏季捕捉。

捕捉与加工：药用其全身。用蝇拍打或用捕网捉后，以线串起，晒干即可。

規格質量：身干不碎，色灰黄。



动物放大

包装与保管：用木箱包装，封閉严密。宜放干燥处（夏季可埋藏在石灰內带箱），以防虫蛀。

性能：味苦，性寒，有毒。逐瘀血、破血积。无瘀者禁忌，以免中毒。

馬 宝

别名：鮓管、石粪、馬粪石、赭丹。

来源与形态：馬为家畜飼养之类。馬宝是生在馬腹中，由于生病而生之結石。如有鉄片等物入肝胆之間，不能消化和排出，漸漸重迭生成石質非石的圓块状，大小不一，小如豆，大如卵状。表面灰色、褐色、黑色或白色不等，剖开有层迭渦紋，坚实。也有輕者，但內有褐色或黄色毛，称毛毳，而馬得此症日漸瘦弱致死，注意取其結石（即馬宝）供药用。

規格質量：身干，个大者达3斤左右，小者10两左右，多呈圓球形，灰白色或褐色，質坚如石非石。

性能：味甘咸，性平。治惊癇、毒疮特效。

注：类似此物的如羊、猪等畜均有，也供药用，应注意收集。

海 螺

别名：流螺、頂头螺。

土名：海窩窩。

来源与形态：系螺蚌类，生于浅海中的小动物，个大小不一。肉柔軟味鮮美，供菜食用。其外壳坚硬，螺旋形，色紅白或灰白，口闊，先端如鑽尖形。內面层呈瓷質，色黄有光泽而美观。

产地：全省沿海地区均产。


产季：在夏、秋两季收集。

收集与加工：药用其外坚壳。将其外壳收集后，洗净泥砂，晒干即可。

規格質量：个整齐，不碎，无泥砂。

包装与保管：用草袋包装。易于保管。

性能：味甘，性冷。入药取末配方治眼疾。



生药外形

海 螺 蛸

别名：墨鱼骨、乌贼甲、乌鱼。

土名：乌鲂骨。

来源与形态：系乌贼鱼之骨。乌贼鱼为软体动物，形呈囊状，色灰，下部丛集八短脚。体肉白色，囊中储有黑墨汁，逢敌即吐。乌贼骨色白，长椭圆形，一面硬质，一面质松软，即称海螺蛸。

产地：全省沿海地区均产。

产季：一年四季均可收集。


收集与加工：药用乌贼骨（即海螺蛸）。乌贼骨经过海潮的涨落，多漂浮在海岸，收集后晒干即可。

规格质量：身干，色白，无泥土。

包装与保管：用麻袋或筐包装。容易保管。

性能：味咸，性温。为通血脉、祛寒湿、温经、止血、止

帶藥。治血枯經閉、赤白漏下、肺結核、吐血、咳血、創傷等。



1. 动物形状 2. 生药外形

海 馬

别名：水馬。

土名：小海馬、海蛆。

来源与形态：屬魚蝦类，为硬骨魚的一种。体长1至2寸，头部弯曲，略似馬头，嘴細长约2分，下垂。腹部突出，尾細长，向內卷曲，全体有硬皮，成环节状，淡棕色而扁平。

主要产地：乐亭、昌黎和黄驊县，以及唐山、秦皇島市。

产季：以夏、秋两季生产为多。

收集与加工：药用其全身。多与海虾一起捞出，应注意将海馬拣出，晒干，用硫磺熏制。

规格质量：全身整齐，色灰白，身干，无霉。

包装与保管：用木箱包装，封闭严密。宜放干燥处保存。

性能：味甘，性温。治腹痛、妇人难产及血气痛。



动物形状（生药外形）

豹 骨

别名：失刺孙。

来源与形态：豹子是脊椎动物，其形似虎，头圆而短。瞳孔能随光而收放，毛短密生，色苍褐或赤褐，有光泽，并有暗

褐或黑褐色之斑点。在背与体旁之斑点，如蔷薇花或环形，大而明显；在肢部则减少。身长4尺许，四肢大，尾长，能攀树木。


主要产地：迁安、龙关、薊县、蔚县、张北、涞源、易县、阜平、平山、正定、平泉、青龙、围场和隆化县。

产季：豹子一年四季都可猎捉。打死后，将肉扒净，全架豹骨都可供药用，以脚骨为最好。

规格质量：全骨，无残肉，身干。

包装与保管：用麻袋包装。保存时防止受潮。

性能：味酸，性平。治腰腿疼痛等症。




生药外形

烏 鷄

来源与形态：系舌黑或骨烏之鷄，形状与家鷄相同，但烏鷄嘴黑、腿黑，羽毛卷形而純白。我省张家口和天津、安国、承德等地区，为供葯用，专门飼养。

飼养方法与家鷄相同。随葯用，随杀死（去腸子），多用作丸葯原料。

性能：味甘，性平。为滋养强壮葯。



动物形状

桑 嫫 蛸

别名：螳螂窠、刀螂窠、嫫蛸虫。

土名：刀螂子、老鵠苳臍。

来源与形态：系昆虫类螳螂之卵窠。秋季螳螂产卵在桑树枝或其他树枝上，也有产在石板上，經日久坚凝而成嫫蛸，似旧紙块。身長寸許，椭圆形，黑褐或黄褐色，有棱角，性极輕。剖开房内有长圆形黄褐色的卵子。

产地：全省各地均产，以山区产質为佳。


产季：在冬、春两季采收。

收集与加工：药用其全身（即桑螵蛸）。将其采摘后，随用蒸笼蒸透，晒足干即可。

规格质量：身轻，体软，色黄褐，无杂质，身干。

包装与保管：用筐或席包装。存放时防止受潮。


性能：味甘，性平。益肾固精。治遗精、夜尿、月经闭止等症。



1. 动物形状 2. 生药外形

蚕 沙 附：僵虫

来源与形态：蚕沙系桑蚕食桑叶排出之屎，呈黑色或灰绿色，长圆形。其蚕幼虫成熟期吐丝作茧，为纺织工业主要原料。我省山区多有养蚕习惯，药用其蚕屎（即蚕沙）和僵虫。僵虫是桑蚕被一种白色病菌而致死，我省没有培植习惯（白色病菌多用人工培植），故僵虫占极少数。



1. 动物形状 2. 僵蚕外形 3. 蚕沙外形

产地：全省山区均产。

产季：以春、夏两季为多。

收集与加工：将蚕粪收集起来，去淨杂质，晒干即可。僵虫病死后尚軟，經三、四日漸漸僵死，并有大量菌泡，收集起来晒干方可入药；否則不能入药。

規格質量：蚕沙小粒青綠色，身干，无土及无杂质；僵虫色白（主要是生有白色病菌），断面色黄亮，无茧絲。

包装与保管：均用麻袋包装。保存时宜放通风干燥处，防止受潮，并經常检查曝晒，以免发霉虫蛀。

性能：味甘辛，性温。祛风湿，有鎮靜、鎮痛之功。治头痛、子宫出血、吐泻失水以及半身不遂等症。僵虫治小兒之癱瘓、夜啼；老人中风，又治失音等症。

鹿 茸

附：鹿角、鹿筋、鹿鞭、鹿尾、野鹿胎

别名：鎮山威、斑龙角。

来源与形态：鹿屬鹿科，为偶蹄动物类，多群居在深山树林中，以树叶草籽为食料。鹿分馬鹿、梅花鹿两种。馬鹿身長8尺左右，梅花鹿身長4尺左右。都呈黄褐色，但梅花鹿脊背有白色斑点。雌鹿无角，作繁殖用；雄鹿有角，角由年齡而增加分枝数。夏季触树木而脫落。当初生的嫩角内含血液而柔軟，在未成骨質时砍掉或鋸掉即为鹿茸。鹿角、鹿筋、鹿鞭、鹿尾都可供药用。

产地：承德、保定和安国都有飼养；围場县也有猎取。

收集与加工：鹿茸：将茸鋸下后，以七厘散（中藥）敷在鹿的伤口，貼上油紙，外包棉花，放回鹿圈。然后将鹿茸的鋸口茸皮，用綫綑紧，縫成网状，再在茸根部釘上小釘。首先将全部茸用开水浇一次，約20分鐘，隨之用鷄蛋清和面把“虎口”糊上，即进行水炸。将茸浸在开水中約30分鐘，取出晾10




1. 动物形状 2. 生药外形

分鐘，依此反复放入、拿出四次，謂第一水加工过程。次日进行第二水（二次加工）約2小时，再过二日进行第三水約1至2小时。但水不宜过于沸騰，以免因血液流不淨，存有淤血，茸毛出現鼓包，可能崩裂，故有臭气。如水热度不够，茸尖部血液出不淨，又易出秃頂、圓头而內空。以上两种現象都能损坏茸的質量，所以必須适当掌握火候，根据茸的老嫩伸縮，决定

水的熱度和炸的時間長短。一般共需5至6小時。炸完後，吊在陰涼通風處陰干，經修整後即為茸的成品。

鹿筋：將鹿筋抽下後，去淨殘肉、蹄角，用水浸好、拉直，放在陰涼處干燥即可。



生藥外形：（馬鹿）1.鹿角 2.鹿茸 3.鹿筋 4.鹿鞭
5.鹿尾

鹿鞭：將鹿鞭帶辜丸取下，去淨殘肉及油質，用水浸軟、拉直，釘在木板上或系在竹弓上陰干。但夏季容易生蟲，須經常晾曬或以硫磺熏制。

規格質量：鹿茸身干，略帶金黃色，上部毛茸密生顯厚，而下部毛茸較稀者為佳；鹿角、鹿筋、鹿鞭、鹿尾或鹿胎以身干、不霉、無蟲蛀者為佳。

包裝與保管：鹿茸用木箱包裝。首先將茸用紙包好，箱內鋪軟草，在茸的間隙用紙塞緊，勿使搖動，以免損傷茸質，箱內再撒些樟腦粉，然後將箱封固嚴密。保存時宜放乾燥處，以防生蟲。其鹿筋等用筐或木箱包裝。宜放乾燥處，夏季需經常晾曬和熏制，防止受潮生蟲。

性能：鹿茸為補陽、益血藥，治遺精、盜汗及一切虛損；鹿筋為強筋、壯骨藥；鹿鞭為補腎、益精、活血、催乳藥；鹿尾為補氣、養血藥；鹿胎為婦女補氣、養血藥；鹿角為熬鹿角膠和鹿角霜之原料，其膠和霜治勞嗽、遺精、尿血、腫毒等症。

蛇 退 皮

別名：龍子衣、龍子皮、蛇皮。

土名：長蟲皮、龍衣、蛇脫。

來源與形態：蛇屬爬蟲類卵生動物。蛇脫之皮，皮膜如管狀，表面有鱗形的痕迹，銀灰色，有光澤，首尾全長數尺，略有皮質性。

產地：全省各地均產，以山區為多。

產季：春季脫皮。

收集與加工：藥用其皮。將蛇皮收集後，去淨泥土，晾干即可。

規格質量：管狀，身干，不碎，銀灰色，無泥土。

包裝與保管：用筐或麻袋包裝。夏季應經常晾曬或用硫磺熏制，以防發霉或蟲蛀。

性能：味咸甘，性平。为驱风、解毒药。



1. 动物形状 2. 生药外形

望月砂

别名：兔矢、兔葷、望月砂。

土名：兔粪。

来源与形态：兔属哺乳动物类，望月砂是兔之粪。色黄褐，圆球形，略扁，表面粗糙，有草质，气味恶臭。

产地：全省各地均产。

产季：在春、冬两季收集为好。

收集与加工：药用其粪（我省习惯用野兔粪）。野兔粪多产在田野和山崖，收集后去土和杂质，晒干即可。

规格质量：身干不碎，黄褐色，圆球形。

包装与保管：用麻袋包装。保存时防止受潮。

性能：味辛，性平。治目中浮翳、疳疮、痔瘕、杀虫、解毒等症。



1. 动物形状 2. 生药外形

紫何車

别名：胞衣、胎衣、混沌衣。

土名：小孩胎包。

来源与形态：紫何車就是小孩初生的胎包。其色有紅、白、紫，但这与血液多少有关。药用紅紫者为最好。干燥后呈圓形或橢圓形，質較坚硬难碎，而色也变为赤褐色，味气腥。

产地：全省各地均产。

收集与加工：药用胎兒之胎包。将胎包收集起来（可与妇产医院联系），趁鮮，用竹尖扎眼，使胎包瘀血流尽，然后用水冲洗几次，再将胎包撑圓（竹皮或柳条均可），挂在通风处阴干即可。

規格質量：身干，質坚硬，不霉，紫褐色或黄白色。

包装与保管：用木箱包装，箱內垫紙，封閉严密。宜放干燥通风处，防止受潮或虫蛀；夏季宜冷藏。

性能：味甘咸，性溫。治神經衰弱、阳萎、不孕、肺結核等症。

蛤 壳

别名：海蛤壳。

土名：蛤蜊皮。

来源与形态：属蚌壳类，为海蛤之贝壳。其壳呈扇形，个大2至3寸，外面黄褐色，略有高迭的轮纹；内面色白。如将壳煨成粉末，又称蛤粉。

产地：我省沿海地区均产。


产季：在夏、秋两季捕捉。

收集与加工：用扒网捕捉后，剖开，其肉鲜美供菜食，将外壳收集起来晒干供药用。

规格质量：不碎，无沙泥，身干。

包装与保管：用草袋包装。容易保管。

性能：味苦咸，性寒。为清热、利湿、化痰药。



生药形状

斑 毛

别名：斑蝥、斑蚝、龙蚝。

土名：花斑毛。

来源与形态：属甲翼昆虫类。多栖息在大豆叶或其他植物的茎叶上，身长4至6分、宽2分许，密生黑绒毛，有节。头部略圆呈三角形，眼大凸出，有细角一对。胸部有足三对及翅



1. 动物形状 2. 生药外形

两对，分甲翅和内翅。甲翅色黑，上
有三条较宽呈淡棕
黄色或金黄色的条
纹，并有黑色软毛。

产地：全省各
地均产。

产季：在秋季
捕捉。

捕捉与加工：
药用其全身。捕捉
时多在清晨趁有露
水时用竹枷捕捉，
再用开水烫死，晒
干即可。斑毛有毒，
捕捉时应注意。

规格质量：身干不碎，黄褐或黑褐色。

包装与保管：用木箱包装。保管方法与虻虫相同。

性能：味辛，性寒，有毒。治疥癬、消瘰癧、利尿等症。


蜂 蜜 附：黄蜡

别名：岩蜜、赤蜜、崖蜂。

土名：蜜糖。

来源与形态：蜜蜂属膜翅类蜜蜂科昆虫。它吸收花蜜后经唾腺分泌液的作用，使其转化为蜂蜜。回窠后吐出积聚于蜂房内，当蜂房充满蜂蜜时，蜜蜂又分泌蜡质包围住。蜂蜜为淡黄或黄棕色稠厚液体，新鲜时半透明状，日久即呈颗粒混浊状，味极甜。

主要产地：薊县、龙关、兴隆、平泉、遵化、霸县、涿县、阜平、唐县、迁安、束鹿、新乐、元氏、邢台、涉县、大



1. 动物形状 2. 蜂蜜、蜂蜡

名和磁县，以及秦皇島、石家庄、保定、承德市。

产季：在春、秋两季采集。

采集与加工：分本蜂蜜与洋蜂蜜两种。本蜂蜜每年于芒种前后生产一次。将蜂坯(即巢础)取出后，盛于盆内，放鍋中用水熬，使其熔化，蜡与蜜分层，蜡上浮于表面，蜜沉于下面。然后将蜡輕輕倒出，再用木棍将蜜攪至清潤为止；洋蜂蜜在

春、秋两季均可生产，将蜂蜜装入分蜜机分出，不出蜡。

規格質量：一等（本蜂蜜）：色赤黄，粘稠度較大，用棍挑能拉長絲，水分少，放紙片上湿不透紙，味清香无雜質。

二等（春蜜，多为枣花、荆花蜜）：黄褐色，为浓稠液体，光亮細膩，桶底多析出顆粒状沉淀，味清香，无雜質。

三等（秋蜜，多为杂花蜜）：色黄白，質粗，稍有酸味，挑不成絲，冬季容易凝結。

包装与保管：用鉄桶或酒篋包装。保存时防热防潮，避免发酵变质。

性能：性平，味甘。能补中、益气、潤燥、滑腸，有鎮咳、通便之效。并能作糕点用。蜂蜡可作丸衣。

蜂 房

別名：蜂巢。

土名：螞蜂窩、紙蜂房。

来源与形态：螞蜂屬胡蜂科，为节足动物。多生在山野石木間或房檐間搭制，呈半圓球形，似倒置的蓮房（即蜂房），茶褐色，房內有时有幼蜂。

产地：全省各地均产。

产季：在春、冬两季采收。


收集与加工：药用其蜂窩。将蜂窩摘下后，倒出幼蜂和子卵，用鍋蒸一下，晒干即可。

規格質量：身干个大，不带蜂卵，无虫蛀者佳。

包装与保管：用筐或席包装。宜放通风干燥处，防止受潮或虫蛀。

性能：味甘，性平。內服治小兒惊癇抽搐等症；外敷諸疮、肿毒。

注：山区的土蜂房与蜂房大致相同，但質硬体重而扁大。我省不习惯药用。



1. 动物形状 2. 生药外形

雞內金 附：鳳凰衣

土名：雞肫皮、雞肚、雞針子。


来源与形态：雞內金是家养的雞肫內的黃皮。色金黃或略青黃色，有皺紋的皮膜，干燥后則坚硬而脆，形似兜狀。

鳳凰衣就是雞卵壳內的薄皮，色白。

产地：全省各地均产。

产季：一年四季都有。

收集与加工：药用鸡内金和凤凰衣。取鸡内金时，当将鸡杀死，取出胰内黄皮，洗净晒干即可；凤凰衣就是孵出鸡雏的蛋壳内的白皮膜，将其剥出晾干即可。



1. 动物形状 2. 鸡内金 (生药) 3. 凤凰衣 (生药)

規格質量：鷄內金身干不碎，色黃綠，无雜質；鳳凰衣身干黃白色，无硬壳。

包裝與保管：均用筐包裝，封閉嚴密。保存時防止受潮。

性能：味甘，性平。消水腫，治病疾，調理脾胃有效。鳳凰衣主治久嗽、氣結等症。

駱 三 件

別名：駱陰莖。

來源與形態：駱屬奇蹄科，脊椎動物，多為家畜飼養。其腎子(舉丸)和駱鞭(陰莖)，民間俗稱為駱三件，都供藥用。

產地：全省各地都有。

產季：一年四季均產。

收集與加工：當將駱殺死後，解剖摘下舉丸和陰莖，去掉殘肉、油質，曬干即可。

規格質量：身干，不帶殘肉，不霉爛。

包裝與保管：用木箱或筐包裝。夏季容易發霉或蟲蛀，宜儲藏干燥通風處，或用石灰埋藏。

性能：味甘，性溫。為強陰壯筋，用作滋補強壯藥。

蜘蛛

別名：網虫、扁珠。

來源與形態：屬節肢動物，體形呈圓或橢圓以及長形。全體分頭、胸、腹三部。有雌雄兩種，形狀大致相同，但雄者末端膨大，多栖居在樹間、房檐下和屋角等處。肚門前有瘤狀突起之物，由此抽絲制網，以捕食昆蟲。

產地：全省各地均產。


產季：在秋季捕捉。

捕捉與加工：藥用蜘蛛全身。將其捕捉後用開水燙死，曬干即可。

規格質量：身干，個大整齊，不霉。

包装与保管：用席包装。保存时防止虫蛀。

性能：性微寒，有小毒。为解毒药。治疝气、恶疮等症。



1. 动物形状 2. 生活情形

蝾 牛

别名：山蝾、里牛。

来源与形态：属腹足类的软体动物，多生在潮湿阴凉处。春暖下雨后，则匍匐而出，爬在树木上，吃新叶；天晴则隐蔽在树叶下，状如扁螺，壳呈螺旋状，淡褐色，薄而易碎。头尖有眼，行走时出壳，并将壳拖行。如惊之则首尾均藏在壳中。

产地：全省各地均产。

产季：以夏季产量为多。

收集与加工：蝾牛全身供药用。将其捕捉后，用开水烫死，晒干即可。

规格质量：身干，整齐不碎，无泥土，不霉。

包装与保管：用筐包装。宜放干燥通风处保管。

性能：味咸，性寒。治小便不通、痔漏脱肛等症。



1. 动物形状 2. 生药外形

蝮 蛄

别名：蝮蛭、土狗。

土名：拉拉狗。

来源与形态：属蛭蟥科。蝮蛄为有害植物的昆虫，多栖居



动物形状

在枯死植物的根間。全身茶褐色，长1寸許，体圓长有粗毛，脚部显著。头部二角呈絲状，胸部有翅两对，前翅短。腹部有足三对，第一对的前足短而粗大；第二对細較长；第三对长大。腹部圓长而軟，尾端有尾毛，前足善于掘土，喜扑火光。

产地：- 全省各地均产。

产季：在春、秋两季产量为多。

收集与加工：药用蜈蚣全身。蜈蚣喜扑火光，故多用灯光照亮，当其飞集灯下进行捕捉，再用开水燙死，晒干即可。

規格質量：身干不碎，茶褐色，不霉。

包装与保管：- 用筐或木箱包装。存放干燥通风处，夏季須用硫磺熏制。

性能：味咸，性寒。通大便，治水肿、难产等症。

蟋 蟀

别名：促織、斗鷄。

土名：蚰蚰。

来源与形态：屬节肢动物昆虫类，多生在原野阴湿地方。体圓长形，黑褐色，头較大，眼黑，椭圆形，角深褐色，比体长，前胸长方形，有斑紋。翅两对，雄者翅长，两翅磨擦能发声，且善斗；雌者翅短，腹部較大，尾端皆有尾毛一对。雌者尾毛中間有一产卵管。

产地：全省各地均产。

产季：在夏、秋两季捕捉。



动物形状

捕捉与加工：

药用蟋蟀全身。将其捕捉后，用热水烫死，曝日晒干即可。

规格质量：身干不碎，无臭味者佳。

包装与保管：

用筐包装。保管时宜放干燥通风处，夏季应封闭严密，防止受潮、发霉或虫蛀。


性能：味辛咸，性温。治尿闭不通、小腹胀痛、水肿等症。

蝉 退

别名：蝉衣、蝉壳、蝉皮。

土名：螂螯皮。

来源与形态：系蝉脱之皮壳。蝉为化生虫类，体长头短，触角短，眼突出，胸背多斑纹，腹部分七节。雄者腹部有鸣器一对；雌者无，不能鸣，称为哑蝉。翅透明而有黑色的网纹，前翅比后翅大。前肢腿部粗大，下面有细锯齿。雌者在树上产卵，孵化为幼虫，下树而钻入土内，吸收树根的精液而发育。幼虫将要成虫时，即出土至树上，自背破裂而脱皮（即蝉退）。



1. 动物形状 2. 生药外形

干燥后呈茶褐色，薄而轻脆，粘有泥土。

主要产地：新乐、束鹿、平山、元氏、南宫、大名、曲周、邢台、内丘、玉田、遵化、薊县、昌黎、蔚县、涞源、易县、安国、青龙、兴隆、平泉和灤平县。

产季：在夏、秋两季收集。

收集与加工：将爬在树上的蝉蜕皮，用竹竿取下，去掉泥土即可。

规格质量：身干，茶褐色，不碎，无泥土者佳。

包装与保管：用箱或筐包装。保管时防止重压。

性能：味咸而甘，性寒。散风热，治小兒惊痢、夜啼等症。

蟹 壳 附：蟹爪

土名：螃蟹壳。

来源与形态：系蟹之骨壳。蟹栖居在水岸穴窟，头、胸、甲甚阔，腹甲扁平，屈折在胸部之下。雄者大而尖；雌者大而圆，内脏在背甲下。眼在背甲前缘深窝处，有脚爪五对，横行



动物形状

很快。

主要产地：靜海、霸县、滄县、邢台、內丘、薊县、玉田、宝坻、高阳和徐水县，以及天津、唐山、秦皇島市。

产季：以秋季为多。

收集与加工：药用多是河蟹壳及蟹爪，沿河农民都有捕捉习惯。将蟹壳和蟹爪收集后，晒干即可。

規格質量：壳和爪均为身干，不霉，不碎，无杂质。

包装与保管：壳和爪分別用席包装。宜放干燥处，防止受潮或虫蛀。

性能：壳治冻疮、漆疮、止腹痛、消积；蟹爪治产后血閉，为破胎胞、墜胎药。

蟾 酥

别名：蟾宝、月魂、月魄。

来源与形态：蟾屬蟾蜍科。蟾酥是疥蛤蟆眉間上疙瘩的白色毒液，干燥后成褐色餅块状胶質，透明。

主要产地：玉田、薊县、迁安、龙关和兴隆县，以及唐山、秦皇島、承德市。

产季：在春、秋两季生产。

收集与加工：药用蟾酥。以春季化冻至清明，霜降至封冻，在这段时间捕捉的疥蛤蟆毒液多，質量好。捕捉后装入筐內，集中加工。加工时左手攢住疥蛤蟆，右手持竹夹或銅夹子将眉上疙瘩里的白浆挤出（如乳汁状，但勿使血液流入酥液內，以免影响質量），放在瓷器中，凝結后用手搓，做成圓餅，晾晒即可。

規格質量：身干，透明光亮，呈黄褐色。

包装与保管：用木箱包装，內垫紙。保管时防止高温。

性能：味甘辛，性温，有毒。散风火，治发背、疔疮、疔毒等症。多外用。

注：鉴别蟾酥的方法有以下几种：

1. 煤油鉴定法: 取蟾酥一块, 放在煤油里, 加熟, 蟾酥即随煤油蒸发, 剩下的残渣即是杂质。

2. 热水流化法: 取蟾酥一块, 放入开水中, 约半小时后, 蟾酥块即分出乳状层、胶层、杂质层。

3. 唾液鉴别法: 将蟾酥打开, 断面抹上一层唾液, 很快即发生乳白色的沫; 发生越快、越多, 质越好, 含酥量也越高。

另外, 为了保护药源, 当捕捉取酥时, 应取挤蛤蟆一个眉上的疙瘩酥; 如取二个, 据民间传说即会死去, 影响药源。



2



1

1. 动物形状 2. 生药外形

鱧 魚 附：鱧魚血

別名：黃鱧、黃鮠、鱧魚。


土名：黃鱧魚。

来源与形态：屬水族动物，无鳞类，生在水岸泥窟中。形似蛇，細长而无鳞，赤褐或青黄色，长2至3尺，头部下有两个鰓孔，腹中有肺。其肉、血都供药用。

产地：我省沿河地区都产，惟巨鹿、高阳县有生产习惯。

性能：味甘，性大温。肉为祛风湿、补中益血、强壮药；血涂癬、治瘻症。

注：1. 鱧魚血由尾上取之。2. 伪品青鱧魚与鱧魚相似，但色青，不习惯作药用。



动物形状


鳖 甲 附： 鳖头

别名：上甲、孚乳甲、团鱼甲。

来源与形态：属水产类脊椎动物。鳖是生在陆地，居在水中，一般大者6至7寸，小者4至5寸。尾短头颈长，其脊背有坚硬的甲，呈椭圆形，黑褐色。腹部有黄色柔韧的皮，背部隆起，腹部平，边缘薄而锋利。其背甲和头都供药用。

产地：河水中为多。

产季：在春、夏、秋三季捕捉。



1. 动物形状 2. 生药外形

捕捉与加工：捕捉工具用鉄杈、魚簍。按季节在河沿岸寻找，如找到窩穴时，先用杈輕輕的趨，感到有軟硬时即是鰲。然后用杈捉入魚簍中，但不要用手捉，以免咬伤。其加工方法，先将鰲头剝下（但須設法讓其脖子伸长再剝）晒干，然后将鰲全身放入开水中，煮一小時左右，取出去掉殘肉，刮淨盖上的肉質，晒干即是鰲甲。

規格質量：鰲甲身干，不碎，无殘肉；鰲头身干，无虫蛀，不霉。

包装与保管：鰲甲用麻袋或箱包装。宜放干燥处。鰲头用麻袋或席包装。夏季容易被虫蛀，可用石灰埋藏，并注意晾晒。

性能：味咸，性平。鰲甲为补阴气、潜肝阳、除寒热药。治女子經血病等症；鰲头治小兒諸疾、妇女产后阴脫、下墜等症。

礦物類

代赭石


別名：煨赭石、釘頭代赭、赭石、土朱。

土名：紅石頭。

來源與形態：系赤鐵礦的礦石，為不規則的片狀或塊狀，質硬，色紅。表面帶有突起的圓泡釘；斷碴有明顯重迭層次。砸碎後即呈赤褐色粉末。

主要產地：龍關、青龍、邢台、正定、平山和元氏縣。

產季：一年四季均產。



生藥外形

采集与加工：开采后拣去杂石，将大块劈成片状或块状即可。

规格质量：赤红色，块不碎，带钉头，无杂石。

包装与保管：用草袋包装。易于保管，不怕日晒雨淋。

性能：性寒，味苦。平肝火，镇逆气。为镇呕、收敛、止血药。适用于胃病呕吐、胃出血、妇人子宫出血等症。


白石英 附：紫石英

别名：白石瑛、银华、广石。

来源与形态：系岩石属石英类的一种，无色透明，为斜方六面形及六面柱状形，有玻璃样光泽，断碴有脂光。其纯精品无色，谓白色英；如带色或夹杂物者，谓“紫石英”“赤石英”。


主要产地：张北、唐县、定县、青龙和正定县，以及秦皇岛市。

产季：一年四季均产。



矿物外形


规格质量：白石英无色透明，有玻璃光泽；紫石英带紫



色，为青紫或灰褐色透明体，有玻璃光泽。

包装与保管：用草袋包装。易于保管。

性能：味甘，性温。润肺、镇咳。治肺痿、肺痛、吐脓、吐血、咳逆上气等症。工业上用为制造玻璃原料。



自然铜

别名：石髓铅。

土名：接骨丹。

来源与形态：系矿石类金属，为铜的一种，非矿炼成，为八面之结晶体，故名“自然铜”。呈片状或块状，一般多为立

方块状，新出矿者，紅銅色，久則表面生彩色之斑紋。


主要产地：涿源、內丘和蔚县。

产季：一年四季均产，一般在采矿时采出。

規格質量：方形，色黃綠有光澤，无杂石。

包装与保管：用筐包装。容易保管。

性能：味辛，性平。散血、止痛、破积聚，能續筋骨，治折伤。



矿物形状

阳起石

别名：羊起石、白石、石生。

来源与形态：系矿石类，为束針状的石块。白色、灰色或淡綠色，发石膏的光澤，質柔軟易碎，作細絲状，偶有透明者。另有一种色深綠，俗称阴起石（尙无稽考），仅仅与阳起石的顏色深浅不同，而无阳起阴起之分。

主要产地：定县和正定县。

产季：一年四季均产。

采集与加工：阳起石多与苦灰石掺杂一起，采刨后，去掉杂石即可。

规格质量：色白，束针状，有石膏样光泽，质松软，撒于皮肤发刺痒，无杂石。

包装与保管：用木箱包装，内垫纸。宜放干燥处，防止受潮。

性能：性微温，味咸。能强阳事，疗阴痿，治崩漏。



芒 硝

别名：肖石、朴硝。


土名：皮硝。

来源与形态：系由卤土加工而成，为无色透明棱柱状晶体。久放空气中，失去其结晶水，即成白色粉末，名风化硝，能溶于水。

主要产地：高阳县。

产季：在春、秋、冬三季生产。

收集与加工：将卤地面的白霜扫一起，溶于水中，过滤后，将滤液加热蒸发浓缩，使其结晶析出，过滤。如结晶色不透明



可重新溶解、过滤，再蒸发。这样反复二至三次，即得很好的结晶品。

规格质量：无色透明结晶体，棱柱状，含结晶水而干燥，无土。

包装与保管：用麻袋包装。宜放干燥处，勿使受潮，怕曝晒。

性能：性寒，味苦。消积泻热，润燥。治便秘和消化不良症。虚人禁用。

花蕊石

别名：花乳石。

来源与形态：系矿石类，硫磺矿石中的石块。体重，质坚硬，大小形状不定，色白，有黄、绿、青的彩色斑纹。

主要产地：山区各县均有蕴藏，惟唐县有生产习惯。


产季：一年四季均可生产。

采集与加工：将开采的花蕊石，打去无蕊的杂石面即可。

规格质量：块大，色白，莹晶，有彩色斑纹。

包装与保管：用筐或草袋包装。容易保管。

性能：性平，味酸。化瘀、止血、止吐衄及金疮出血。



禹粮石

别名：禹余粮、白余粮、自然谷。


来源与形态：系褐铁矿，为黄褐色不规则形的圆块。大1至3寸，外壳厚1至2分，质松，碎之里面有赭褐色细末。

主要产地：唐县。

产季：一年四季均可生产。

采集与加工：用鎚刨出后，去掉杂石及泥土即可。

规格质量：整齐不碎，赭褐色，无杂石。



包装与保管：用麻袋或草袋包装。容易保管。

性能：性寒，无毒。清热止血。治赤白带下等症。

云母石

别名：云华、云珠、云英、云砂、磷石。

土名：云母、金銀晶石。

来源与形态：系岩石类，为斜方柱形的矿石。常有锐角，断面有明显的重迭层次，可剥离成薄片，透明有光泽。由于质地不同，又有金晶石与银晶石之分。色黄白质柔韧者为金晶石；无色透明有弹性者为银晶石。

主要产地：山区各县均有蕴藏，惟易县、涞源和唐县有生产习惯。

产季：一年四季均可生产。

采集与加工：用鎬将云母刨出后，除去杂石，将金晶石与银晶石分开即可。

规格质量：片大，能层层剥离，透明有光泽，无杂质及沙土。

包装与保管：用箱或筐包装。容易保管。

性能：性平，味甘。主治中风寒热，又为补中益气药。亦作工业原料。



滑 石

别名：液石、番石、脫石、冷石、尽石。

来源与形态：系单斜形的矿石。多数为纖維状、块状，或斜方柱状結晶体，色青白、黄白或銀灰，有脂肪状光澤，質柔軟光滑。

主要产地：定县、易县、蔚县和內丘县，以及石家庄市。


产季：一年四季均可生产。

采集与加工：将开采的滑石，拣去杂石，刮淨，然后用粉碎机粉碎，过罗后的細粉就是滑石粉。

規格質量：滑石色青白，无杂石块，質柔軟光滑；滑石粉粉細，色白，光滑无土。

包装与保管：滑石用筐装，滑石粉用布袋装。容易保管，但粉須防止雨淋。

性能：性寒，无毒。逐湿热、治泻痢、通淋閉、利小便，又治黄疸水肿。



活 磁 石

别名：慈石、玄石、处石、協鉄石、指南石。

土名：吸鉄石。

来源与形态：系矿石类磁鉄矿的石块。色黑，粒状或块

状，不透明，有金屬光澤，質致密而脆，有吸鉄的特性。

主要产地：龙关、邯鄲和邢台县，以及承德市。


产季：一年四季均可生产。

采集与加工：和采鉄矿相同。

規格質量：有吸鉄作用，色黑褐，有光澤，无杂石。

包装与保管：用麻袋或草袋包装。易于保管。

性能：味辛，性寒。补肾潜阳，納冲气，平喘气。治头暈耳鳴，消痈肿、鼠疮、癩癧等症。



礞石

别名：青礞石、煨礞石、金礞石、銀礞石。

来源与形态：系石类，为山石的一种，有青礞、金礞之分。青礞石为青褐色块状，質坚而細，体重，击碎断面有白星点；金礞石系青礞石煨炙而成，呈赤黄色，碎片或粒状，有金星点搶目，体輕質軟。

主要产地：山区各县均有蕴藏，惟唐县有生产习惯。


产季：一年四季均可生产。

采集与加工：用鎚将其刨出后，去土，拣去杂石，即得青礞石。或礞石。

規格質量：青礞石块整齐，断面有白星点；金礞石色赤有金星点搶目，体輕質松，两者均无杂石。

包装与保管：用麻袋包装。易于保管。


性能：性平，味甘。为泻痰热、破症积药。



中科院植物所图书馆



S0022918



66.91
312

2004年材料 2705

田景全 1959.9.7


朱成明 161.6.2

朱成明 1959.12.4

朱成明 91.12.4

66.91
312

2706



12
20

1

1

統一書號：T 14086·52
定 價：(8)1.37元